

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	(3)
Abstract.....	(5)
กิตติกรรมประกาศ.....	(7)
สารบัญ.....	(8)
รายการตาราง.....	(10)
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์การวิจัย.....	4
คำถามการวิจัย.....	5
กรอบแนวคิด.....	5
นิยามศัพท์.....	6
ขอบเขตการวิจัย.....	8
ความสำคัญของการวิจัย.....	8
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	9
ปัญหาสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์.....	9
วิธีการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์.....	21
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการสุขภาพแบบผสมผสาน.....	35
3 วิธีการวิจัย.....	39
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	39
เครื่องมือในการวิจัย.....	40
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ.....	42
การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล.....	43
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	45
4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล.....	46
	(8)

ผลการวิจัย.....	46
-----------------	----

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
การอภิปรายผล.....	59
5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	70
สรุปผลการวิจัย.....	70
ข้อจำกัดในการวิจัย.....	71
ข้อเสนอแนะ.....	71
บรรณานุกรม.....	74
ภาคผนวก.....	86
ก การพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย.....	87
ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	88
ค ตารางวิเคราะห์เพิ่มเติม.....	98
ง รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย.....	115
ประวัติผู้เขียน.....	116

รายการตาราง

ตาราง	หน้า
1 ความหมายของการเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณ.....	18
2 จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการประมาณจากประชากรโดยคิดเทียบร้อยละ 25 ของประชากร.....	40
3 จำนวน ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามข้อมูลทั่วไป.....	47
4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ระดับความรุนแรงของปัญหาสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ โดยรวมและรายด้าน.....	50
5 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก รายด้าน.....	51
6 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานตามปัญหาสุขภาพด้านร่างกายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก.....	55
7 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานตามปัญหาสุขภาพด้านจิตสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก.....	56
8 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานตามปัญหาสุขภาพด้านจิตวิญญาณของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก.....	57
9 จำนวน ร้อยละ วิธีการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานที่เลือกใช้บ่อยที่สุด ในการจัดการกับปัญหาสุขภาพ.....	58