ชื่อวิทยานิพนธ์ กุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ภายใต้ระบบการดูแล

อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในภาคใต้ตอนล่าง

ผู้เขียน นางณัฐชยา ซ้อนงำ

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)

ปีการศึกษา 2549

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ภายใต้ระบบการดูแลอย่างครบถ้วน และต่อเนื่องในภาคใต้ตอนล่าง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริการที่ได้รับ ระดับความรุนแรง และระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการกับคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ภายใต้ระบบการดูแลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้ ที่เข้ารับบริการ จำนวน 130 ราย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2548 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านคุณ ภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีพัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก (WHOQOL – HIV) และข้อมูลการ บริการที่ได้รับจากการดูแลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ของคอนบาค ได้ค่าความ เที่ยงคุณภาพชีวิต เท่ากับ 0.81 และบริการที่ได้รับเท่ากับ 0.83 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

- 1. กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง($\bar{\mathbf{x}}$ = 426.51, SD = 40.70) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีคุณภาพชีวิตทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยก เว้นด้านความเป็นอิสระของบุคคลอยู่ในระดับมาก ($\bar{\mathbf{x}}$ = 60.94, SD = 8.29)
- 2. กลุ่มตัวอย่างได้รับบริการ โดยรวม ($\overline{\mathbf{x}}=39.85,\,\mathrm{SD}=6.96$) และบริการที่ได้ รับรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านได้แก่ บริการด้านร่างกาย ($\overline{\mathbf{x}}=22.61,\,\mathrm{SD}=4.04$) ด้านจิตใจ ($\overline{\mathbf{x}}=10.03,\,\mathrm{SD}=2.59$) ด้านสังคม/ด้านเศรษฐกิจ/การคุ้มครองสิทธิ์ ($\overline{\mathbf{x}}=7.22,\,\mathrm{SD}=2.21$)
- 3. เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ถึงบริการที่ได้รับ ระดับความรุนแรงของโรค ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการกับคุณภาพชีวิตพบว่า บริการที่กลุ่มตัวอย่างได้รับเป็นตัวแปรเดียวที่มี ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.34, p < 0.01)</p>

ผลการศึกษาครั้งนี้เสนอแนะ ได้ว่าการจัดบริการ ให้ผู้รับบริการ ได้รับบริการดูแล อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอช ไอวีและผู้ป่วยเอดส์ **Thesis Title** Quality of Life among HIV Infected and AIDS Patients under Comprehensive

and Continuum Care in Lower Southern Region

Author Mrs. Natchaya Sonkhum

Major Program Nursing Science (Adult Nursing)

Academic Year 2006

ABSTRACT

The purposes of this descriptive research were to study the quality of life of HIV infected and AIDS patients under the Comprehensive and Continuum Care program (CCC program) in the Lower Southern Region and to examine the relationships between the service received, level of severity, duration of participation in the project and the quality of life. One hundred and thirty HIV infected and AIDS patients under the CCC program in Lower Southern Region from 7 community hospitals were purposively selected during April to November 2005. The questionnaire consisted of 3 parts, including demographic data, WHOQOL- HIV and the services received. The content validity of this questionnaire was verified by five experts and tested for reliability using Cronbach's alpha coefficient, yielding 0.81 and 0.83 respectively. The major results of the study were as follows:

- 1. The overall quality of life of subject was at a medium level (\bar{x} = 426.51, SD = 40.70). Considering each dimension, it was found that the QOL in every dimension was at a medium level except that of the independence dimension which was at high level. (\bar{x} = 60.94, SD= 8.29)
- 2. The overall services received of the subject was at a high level ($\bar{\mathbf{x}} = 39.85$, SD = 6.96) and received service in every aspect was at a high level, including service in physical aspect ($\bar{\mathbf{x}} = 22.61$, SD = 4.04), mental aspect ($\bar{\mathbf{x}} = 10.03$, SD = 2.59), and social/economic/rights protection aspect ($\bar{\mathbf{x}} = 7.22$, SD = 2.21).
- 3. Regarding the relationship between received service level, severity level and quality of life, it was found that service received had a significant positive correlation with quality of life (r = 0.34, p < 0.01).

The findings of this study suggest that providing service under the Comprehensive and Continuum Care Program could assist or promote the quality of life of HIV infected and AIDS patients.