

บทที่ 4

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาระดับบริการที่ได้รับ ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ภายใต้ระบบการดูแลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริการที่ได้รับ ระดับความรุนแรงของโรค และระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการกับคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าร่วมโครงการดูแลครบถ้วนและต่อเนื่องในภาคใต้ตอนล่าง ผลการวิจัยนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยายดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปและบริการที่ได้รับ
2. คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบริการที่ได้รับ ระดับความรุนแรงของโรค ระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการกับคุณภาพชีวิต

1. ข้อมูลทั่วไปและบริการที่ได้รับ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ภายใต้ระบบการดูแลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ที่รับบริการในโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 130 ราย เป็นเพศชาย (ร้อยละ 45.38) น้อยกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 55.62) อายุ 31 – 40 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 53.08) โดยมีอายุเฉลี่ย 33.75 ปี มีสถานภาพสมรสมากที่สุด (ร้อยละ 47.69) รองลงมาคือหม้าย/หย่า/แยก (ร้อยละ 34.62) โดยจบการศึกษา ระดับประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 58.46) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 28.46) และนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.38) กลุ่มตัวอย่างมีรายได้มาจากการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 90) ทุกรายได้ให้ข้อมูลเมื่อเจ็บป่วย จะเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล โดยรับทราบข้อมูลในการรับบริการจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมากที่สุด (ร้อยละ 93.08) ซึ่งระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการภายใต้ระบบการดูแลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง อยู่ในช่วง 12 – 23 เดือน (ร้อยละ 50.77) และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือชุมชนที่จัดโดยโรงพยาบาล (ร้อยละ 86.92) การประเมินความรุนแรงของโรคในปัจจุบันโดยตนเองอยู่ในระดับ 1 (ร้อยละ 63.85) ในสัดส่วนใกล้เคียงกันกับการประเมินความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งพบว่าอยู่ในระดับ 1 (ร้อยละ 50) นอกจากนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิด

เผยสถานะของการติดเชื้อให้ผู้อื่นทราบ (ร้อยละ 93.08) ซึ่งทุกรายจะเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่ทราบ (ร้อยละ 100) รองลงมาจะเปิดเผยกับเพื่อนหรือชุมชน (ร้อยละ 75.38) ในการตัดสินใจเข้าเข้ารับบริการในโรงพยาบาลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการเจ็บป่วย (ร้อยละ 87.69) รองลงมาได้รับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนชักชวนให้เข้ารับบริการ (ร้อยละ 80) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีอุปสรรคในการเดินทางมารับบริการ (ร้อยละ 92.31) ขณะเดียวกันได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว (ร้อยละ 66.92) ในเรื่องการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย (ร้อยละ 38.46) เป็นกำลังใจ เอาใจใส่จากครอบครัว (ร้อยละ 13.08) การกินอยู่ร่วมกัน (ร้อยละ 5.38) จากหน่วยงานของรัฐ (ร้อยละ 10) กลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับการสนับสนุน/ช่วยเหลือของครอบครัว ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการเงินเนื่องจากได้แยกครอบครัว (ร้อยละ 33.08) และไม่มี ความยากลำบากในการเข้าถึงบริการ (ร้อยละ 98.46) โดยระบุว่าจะมาใช้บริการตามนัดเดือนละครั้ง เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.92) รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับยาต้านไวรัส (ร้อยละ 86.92) ดังตาราง 4

ตาราง 4

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามข้อมูลทั่วไป ($n=130$ คน)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	59	45.38
หญิง	71	55.62
อายุ (ปี) ($\bar{x} = 33.7$, $SD = 6.56$), (range= 17-60)		
น้อยกว่า 20 ปี	1	0.77
21-30 ปี	44	33.85
31-40 ปี	39	53.08
41-50 ปี	14	10.77
มากกว่า 50 ปี	2	1.54
สถานภาพสมรส		
โสด	23	17.69
คู่	62	47.69

หม้าย/หย่า/แยก	45	34.62
----------------	----	-------

ตาราง 4

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=130 คน)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้เรียน	7	5.38
ประถมศึกษา	76	58.46
มัธยมศึกษา	37	28.46
อาชีวศึกษา	8	6.15
ปริญญาตรี/สูงกว่า	2	1.54
ศาสนา		
พุทธ	124	95.38
คริสต์	2	1.54
อิสลาม	4	3.08
แหล่งที่มาของรายได้		
การประกอบอาชีพ	117	90.00
จากสงเคราะห์	13	13.00
สถานที่ไปรับบริการเมื่อเจ็บป่วย		
โรงพยาบาล	130	100.00
สถานีนอนมัย	28	21.54
คลินิก	2	1.54
อื่น ๆ ระบุ	2	1.54
แหล่งข้อมูลที่ได้รับทราบการบริการสำหรับผู้คิดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (ตอบได้หลายข้อ)		
เจ้าหน้าที่ของสถานบริการ	121	93.08
ผู้ให้ข้อมูลในชุมชน	7	5.38
ญาติ	6	4.62

เพื่อน	5	19.23
สื่อต่าง ๆ	50	38.46
อื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ	13	10.00

ตาราง 4

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจำแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=130 คน)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ถึงปัจจุบัน		
น้อยกว่า 12 เดือน	12	9.23
12 เดือน – 23 เดือน	66	50.77
24 เดือน – 35 เดือน	50	38.50
36 เดือนขึ้นไป	2	1.54
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือชุมชน		
เข้าร่วม	117	90.00
ไม่ได้เข้าร่วม	13	10.00
ระดับความรุนแรงของโรคในปัจจุบัน (การประเมินตนเอง)		
ระดับ 1	83	63.85
ระดับ 2	33	25.38
ระดับ 3	14	10.77
ระดับความรุนแรงของโรคในปัจจุบัน (การประเมินโดยเจ้าหน้าที่)		
ระดับ 1	65	50.00
ระดับ 2	44	33.85
ระดับ 3	21	16.15
การเปิดเผยสถานะของการติดเชื้อให้ผู้อื่นทราบ		
ไม่บอก	9	6.92
บอก	121	93.08
บุคคลในครอบครัว	87	66.92
เจ้าหน้าที่เท่านั้น	130	100.0