

## ภาคผนวก ก.

## ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล

ตาราง 26 จำนวนและร้อยละของการปฏิบัติของพยาบาลในกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาล จำแนกเป็นรายด้าน และรายชื่อ

กิจกรรม	การปฏิบัติของพยาบาล		
	ไม่ได้ปฏิบัติ	เป็นบางครั้ง	เป็นประจำ
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)
<b>ด้านร่างกาย</b>			
1 การยึดท่อช่วยหายใจให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยพลาสติกหรือเชือก	-	-	35(100)
2 การเปลี่ยนพลาสติกหรือเชือกแวนละครั้งหรือเมื่อเปียกชื้น	-	9(25.7)	26(74.3)
3 การตรวจสอบท่อช่วยหายใจให้อยู่ในตำแหน่งเดิม	1(2.9)	2(5.7)	32(91.4)
4 การระมัดระวังท่อช่วยหายใจไม่ให้ดึงรั้งในขณะที่ดูดเสมหะ พลิกตัว ตะแคงตัวหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	1(2.9)	-	34(97.1)
5 การตรวจสอบกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจให้มีปริมาณลมไม่เกิน 5 มิลลิลิตรหรือความดันในกระเปาะลมไม่เกิน 25 มิลลิเมตรปรอท	7(20)	16(45.7)	12(34.3)
6 การตรวจเช็คและบันทึกข้อมูลการตั้งเครื่องช่วยหายใจให้ตรงตามแผนการรักษาอย่างน้อยแวนละครั้ง	-	10(28.6)	25(71.4)
7 การดูแลการทำงานของเครื่องช่วยหายใจให้สัมพันธ์กับการหายใจของผู้ป่วย	-	3(8.6)	32(91.4)
8 การดูแลไม่ให้มีการหลุด หัก พับงอของสายต่อเครื่องช่วยหายใจ	-	1(2.9)	34(97.1)
9 การดูแลกระบอกทำความชื้นให้มีน้ำอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดไว้	1(2.9)	2(5.7)	32(91.4)
10 การติดตามปริมาตรอากาศที่หายใจเข้าและออก 1 ครั้ง (tidal volume) ของผู้ป่วย	-	11(31.4)	24(68.6)
11 การฟังเสียงลมผ่านปอดทั้ง 2 ข้างและการสังเกตการขยายของทรวงอก อย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมงหรือภายหลังการให้การรักษาพยาบาล เช่น การดูดเสมหะ การจัดหรือเปลี่ยนท่าผู้ป่วย การทำความสะอาดภายในช่องปาก เป็นต้น	2(5.7)	24(68.6)	9(25.7)
12 การวัดและบันทึกสัญญาณชีพของผู้ป่วยอย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมงหรือตามสภาพความจำเป็นของผู้ป่วย	-	1(2.9)	34(97.1)
13 การดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจ อย่างน้อยทุก 1-2 ชั่วโมงหรือตามสภาพความจำเป็นของผู้ป่วย	-	1(2.9)	34(97.1)

ตาราง 26 (ต่อ)

กิจกรรม	การปฏิบัติของพยาบาล		
	ไม่ได้ปฏิบัติ	เป็นบางครั้ง	เป็นประจำ
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)
14 การใช้ออกซิเจน100%ต่อกับถุงลมช่วยหายใจบีบช่วยหายใจแก่ผู้ป่วยก่อน-ขณะ-หลังดูดเสมหะทุกครั้ง	1(2.9)	11(31.4)	23(65.7)
15 การเลือกใช้ขนาดของสายยางดูดเสมหะมีขนาดไม่เกิน1/2ของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อช่วยหายใจ	1(2.9)	1(2.9)	33(94.3)
16 การใช้เวลาดูดเสมหะแต่ละครั้งไม่นานเกิน 15 วินาที	-	1(2.9)	34(97.1)
17 การดูดเสมหะด้วยความนุ่มนวลและเบามือ	-	3(8.6)	32(91.4)
18 การเช็ดข้อต่อของท่อช่วยหายใจ ถุงลมช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจ ด้วย แอลกอฮอล์ 70 % ก่อนและหลังดูดเสมหะทุกครั้ง	-	6(17.1)	29(82.9)
19 การดูแลผู้ป่วยให้ได้รับอาหารเหลวทางสายยางอย่างถูกต้องครบถ้วนและตรงตามแผนการรักษา	-	1(2.9)	34(97.1)
20 การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามแผนการรักษา	-	3(8.6)	32(91.4)
21 การวัดและบันทึกปริมาณน้ำเข้าออกจากร่างกายผู้ป่วยทุก 8 ชั่วโมง	-	4(11.4)	31(88.6)
22 การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยนอนหลับอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปลุกผู้ป่วยขณะที่นอนหลับ	-	17(48.6)	18(51.4)
23 การส่งเสริมการนอนหลับของผู้ป่วยโดยการช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายหรือผ่อนคลาย เช่น การทำความสะอาดร่างกาย การเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่น การลดความเจ็บปวด การนวดหลัง การจัดท่านอนที่เหมาะสมหรือการจัดสิ่งแวดล้อมไม่ให้รบกวนผู้ป่วย เป็นต้น	-	14(40)	21(60)
24 การซักถามถึงความเพียงพอหรือความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยแต่ละคืน	1(2.9)	19(54.3)	15(42.9)
25 การดูแลหรือช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนไหวข้อและออกกำลังของกล้ามเนื้อในขณะนอนพักบนเตียง	1(2.9)	23(65.7)	11(31.4)
26 การดูแลหรือช่วยเหลือผู้ป่วยในการพลิกตะแคงตัวทุก1-2ชั่วโมง	-	10(28.6)	25(71.4)
27 การทำความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	-	3(8.6)	32(91.4)
28 การทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ป่วยอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งและทุกครั้งผู้ป่วยปัสสาวะหรืออุจจาระ	-	1(2.9)	34(97.1)
29 การช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยมีอาการท้องผูก เช่น การดูแลให้ได้รับยาระบาย การสวนอุจจาระ ตามแผนการรักษา เป็นต้น	-	7(20)	28(80)

ตาราง 26 (ต่อ)

กิจกรรม	การปฏิบัติของพยาบาล		
	ไม่ได้ปฏิบัติ	เป็นบางครั้ง	เป็นประจำ
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)
<b>ด้านจิตสังคม</b>			
30 การแนะนำตัวให้ผู้ป่วยทราบว่าเป็นพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยก่อนให้การพยาบาลในครั้งแรก	4(11.4)	24(68.6)	7(20)
31 การอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและการปฏิบัติตนขณะได้รับเครื่องช่วยหายใจ	-	8(22.9)	27(77.1)
32 การแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงผลการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	-	16(45.7)	19(54.3)
33 การใช้สรรพนามนำหน้าชื่อผู้ป่วยตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย	-	3(8.6)	32(91.4)
34 การแจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนทุกครั้งที่จะปฏิบัติกิจกรรมการรักษายาพยาบาล	-	9(25.7)	26(74.3)
35 การไม่เปิดเผยร่างกายของผู้ป่วยในขณะที่ให้การรักษาพยาบาลและอยู่กับผู้ป่วยทุกครั้งที่แพทย์ตรวจ	-	4(11.4)	31(88.6)
36 การไม่ผูกมัดผู้ป่วยในขณะที่มีญาติดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด	-	17(48.6)	18(51.4)
37 การให้เวลาแก่ผู้ป่วยในการบอกหรือระบายปัญหาความรู้สึกในใจหรือความต้องการการช่วยเหลือ	-	21(60)	14(40)
38 การช่วยเหลือผู้ป่วยในการหาวิธีการสื่อสารแทนการใช้เสียง เช่น การใช้ภาษาท่าทาง การเขียนโดยจัดให้มีดินสอหรือปากกา หรือการใช้แผ่นภาพที่มีข้อความประกอบ เป็นต้น	1(2.9)	15(42.9)	19(54.3)
39 การแจ้งหรือบอกให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับวัน เดือน ปี หรือเวลา	3(8.6)	23(65.7)	9(25.7)
40 การแสดงความเห็นอกเห็นใจพุดลอบใจ และสัมผัสตัวผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ผู้ป่วยรู้สึกไม่สุขสบาย	-	18(51.4)	17(48.6)
41 การเปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้บุคคลที่มีความสำคัญต่อผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย	1(2.9)	4(11.4)	30(85.7)
42 การให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยว่าแพทย์และพยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่จะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่	-	7(20)	28(80)
<b>ด้านจิตวิญญาณ</b>			
43 การให้กำลังใจผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย	-	8(22.9)	27(77.1)
44 การเปิดโอกาสให้ผู้พื่อนำสิ่งของที่ผู้ป่วยรักผูกพันและคุ้นเคยหรือของที่ใช้เป็นประจำมาไว้ใกล้ตัว	-	1(2.9)	34(97.1)
45 การยินยอมให้ผู้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อซึ่งไม่ขัดต่อการรักษาพยาบาล	-	1(2.9)	34(97.1)
46 การยินยอมให้ผู้พื่อนำศาสนวัตถุหรือสิ่งที่มีคุณค่าหรือเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวผู้ป่วยอยู่เสมอ	-	3(8.6)	32(91.4)

ตาราง 27 จำนวนและร้อยละของการปฏิบัติของพยาบาลในกิจกรรมการดูแลญาติตามการรับรู้ของพยาบาล จำแนกเป็นรายด้าน และรายข้อ

กิจกรรม	การปฏิบัติของพยาบาล		
	ไม่ได้ปฏิบัติ	เป็นบางครั้ง	เป็นประจำ
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)
<b>ด้านร่างกาย</b>			
1 การซักถามและให้ความสนใจในสุขภาพของญาติ	-	21(60)	14(40)
2 การสนับสนุนให้ญาติได้รับการพักผ่อนนอนหลับอย่างเหมาะสม ขณะให้การดูแลผู้ป่วย	-	9(25.7)	26(74.3)
3 การเปิดโอกาสให้ญาติได้รับการผ่อนคลาย เช่น การอ่านหนังสือ ฟังเพลง หรือ ดูโทรทัศน์ เป็นต้น	5(14.3)	15(42.9)	15(42.9)
<b>ด้านจิตสังคม</b>			
4 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วย เช่น อาการ ของโรค การวินิจฉัยโรค การพยากรณ์โรค เป็นต้น	-	8(22.9)	27(77.1)
5 การอธิบายให้ญาติเข้าใจถึงเหตุผลที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้เครื่อง ช่วยหายใจ	-	2(5.7)	33(94.3)
6 การอธิบายหรือแจ้งให้ญาติได้รับทราบถึงกิจกรรมการรักษา พยาบาลและเหตุผลในการทำกิจกรรมการรักษายาบาลที่ให้กับ ผู้ป่วย	-	5(14.3)	30(85.7)
7 การให้คำอธิบายแก่ญาติเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบ ของหอผู้ป่วยและของโรงพยาบาล	-	2(5.7)	33(94.3)
8 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ญาติควรปฏิบัติเมื่อให้การดูแล ผู้ป่วย	-	4(11.4)	31(88.6)
9 การเปิดโอกาสให้ญาติมีส่วนร่วมในการวางแผน การดูแล และ การตัดสินใจในการรักษายาบาลผู้ป่วย เช่น การทำความสะอาด ร่างกาย การให้อาหารและน้ำ การบีบนวด การออกกำลังกาย เป็นต้น	-	3(8.6)	32(91.4)
10 การอธิบายให้ญาติเข้าใจถึงวิธีการที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย	1(2.9)	11(31.4)	23(65.7)
11 การรับฟังญาติเมื่อญาติได้บอกถึงปัญหาหรือความต้องการการ ช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย	1(2.9)	4(11.4)	30(85.7)
12 การปลอบโยนและให้กำลังใจเมื่อญาติต้องเผชิญกับปัญหาในการ ดูแลผู้ป่วยและช่วยเหลือญาติในการตัดสินใจ	1(2.9)	9(25.7)	25(71.4)
13 การให้ความมั่นใจแก่ญาติว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด	-	6(17.1)	29(82.9)
<b>ด้านจิตวิญญาณ</b>			
14 การเปิดโอกาสหรืออนุญาตให้ญาติได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความ เชื่อหรือพิธีทางศาสนาซึ่งไม่ขัดต่อการรักษายาบาล	1(2.9)	2(5.7)	32(91.4)
15 การเปิดโอกาสหรืออนุญาตให้ญาตินำวัตถุหรือสิ่งยึดเหนี่ยวทาง จิตใจไว้กับตัวผู้ป่วยขณะอยู่ในหอผู้ป่วย	1(2.9)	4(11.4)	30(85.7)

ตาราง 27 (ต่อ)

กิจกรรม	การปฏิบัติของพยาบาล		
	ไม่ได้ปฏิบัติ	เป็นบางครั้ง	เป็นประจำ
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)
16 การให้กำลังใจแก่ญาติเมื่อญาติสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	1(2.9)	8(22.9)	26(74.3)
17 การพูดคุยกับญาติเมื่อผู้ป่วยมีอาการทรุดลงหรืออาจถึงแก่กรรม	1(2.9)	2(5.7)	32(91.4)

ตาราง 28 จำนวนและร้อยละของการปฏิบัติของพยาบาลในกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของญาติ จำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ

กิจกรรม	การปฏิบัติของพยาบาล		
	ไม่ได้ปฏิบัติ	เป็นบางครั้ง	เป็นประจำ
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)
<b>ด้านร่างกาย</b>			
1 การยึดท่อช่วยหายใจให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยพลาสติกหรือเชือก	-	2(5.7)	33(94.3)
2 การเปลี่ยนพลาสติกหรือเชือกเวรละครั้งหรือเมื่อเปียกขึ้น	-	10(28.6)	25(71.4)
3 การตรวจสอบท่อช่วยหายใจให้อยู่ในตำแหน่งเดิม	-	1(2.9)	34(97.1)
4 การระมัดระวังท่อช่วยหายใจไม่ให้ดึงรั้งในขณะดูดเสมหะ พลิกตัว ตะแคงตัวหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	-	-	35(100)
5 การดูแลไม่ให้มีการหลุด หัก พังของสายต่อเครื่องช่วยหายใจ	-	2(5.7)	33(94.3)
6 การดูแลกระบอกทำความชื้นให้มีน้ำอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดไว้	-	8(22.9)	27(77.1)
7 การวัดและบันทึกสัญญาณชีพของผู้ป่วยอย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมงหรือตามสภาพความจำเป็นของผู้ป่วย	-	-	35(100)
8 การดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจ อย่างน้อยทุก 1-2 ชั่วโมงหรือตามสภาพความจำเป็นของผู้ป่วย	-	1(2.9)	34(97.1)
9 การใช้ออกซิเจน100%ต่อกับตุ่มลมช่วยหายใจบีบช่วยหายใจแก่ผู้ป่วยก่อน -ขณะ - หลังดูดเสมหะทุกครั้ง	-	6(17.1)	29(82.9)
10 การดูดเสมหะด้วยความนุ่มนวลและเบามือ	-	23(65.7)	12(34.3)
11 การเช็ดข้อต่อของท่อช่วยหายใจ ตุ้มลมช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจด้วยแอลกอฮอล์ 70 % ก่อนและหลังดูดเสมหะทุกครั้ง	1(2.9)	8(22.9)	26(74.3)
12 การวัดและบันทึกปริมาณน้ำเข้า-ออกจากร่างกายผู้ป่วยทุก 8 ชั่วโมง	2(5.7)	3(8.6)	30(85.7)

ตาราง 28 (ต่อ)

กิจกรรม	การปฏิบัติของพยาบาล		
	ไม่ได้ปฏิบัติ	เป็นบางครั้ง	เป็นประจำ
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)
13 การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยนอนหลับอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปลุกผู้ป่วยขณะที่นอนหลับ	-	19(54.3)	16(45.7)
14 การส่งเสริมการนอนหลับของผู้ป่วยโดยการช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายหรือผ่อนคลาย เช่น การทำความสะอาดร่างกาย การเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่น การลดความเจ็บปวด การนวดหลัง การจัดท่านอนที่เหมาะสม หรือการจัดสิ่งแวดล้อมไม่ให้รบกวนผู้ป่วย เป็นต้น	-	4(11.4)	31(88.6)
15 การซักถามถึงความเพียงพอหรือความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยแต่ละคืน	3(8.6)	26(74.3)	6(17.1)
16 การดูแลหรือช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนไหวข้อและออกกำลังของกล้ามเนื้อในขณะนอนพักบนเตียง	1(2.9)	18(51.4)	16(45.7)
17 การดูแลหรือช่วยเหลือผู้ป่วยในการพลิกตะแคงตัวทุก 1-2 ชั่วโมง	-	6(17.1)	29(82.9)
18 การทำความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	-	2(5.7)	33(94.3)
19 การทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ป่วยอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งและทุกครั้งที่ผู้ป่วยปัสสาวะหรืออุจจาระ	-	2(5.7)	33(94.3)
20 การช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยมีอาการท้องผูก เช่น การดูแลให้ได้รับยาระบาย การสวนอุจจาระ ตามแผนการรักษา เป็นต้น	-	20(57.1)	15(42.9)
<b>ด้านจิตสังคม</b>			
21 การแนะนำตัวให้ผู้ป่วยทราบว่าเป็นพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยก่อนให้การพยาบาลในครั้งแรก	24(68.6)	9(25.7)	2(5.7)
22 การอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจวัตถุประสงค์และความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	2(5.7)	9(25.7)	24(68.6)
23 การแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงผลการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	1(2.9)	28(80)	6(17.1)
24 การใช้สรรพนามนำหน้าชื่อผู้ป่วยตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย	-	-	35(100)
25 การแจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนทุกครั้งที่จะปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล	1(2.9)	13(37.1)	21(60)
26 การไม่เปิดเผยร่างกายของผู้ป่วยในขณะให้การพยาบาลและอยู่กับผู้ป่วยทุกครั้งที่มีแพทย์ตรวจ	2(5.7)	3(8.6)	30(85.7)
27 การไม่ผูกมัดผู้ป่วยในขณะที่มีญาติดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด	-	22(62.9)	13(37.1)
28 การให้เวลาแก่ผู้ป่วยในการบอกหรือระบายปัญหาความรู้สึกในใจหรือความต้องการการช่วยเหลือ	-	12(34.3)	23(65.7)

ตาราง 28 (ต่อ)

กิจกรรม	การปฏิบัติของพยาบาล		
	ไม่ได้ปฏิบัติ	เป็นบางครั้ง	เป็นประจำ
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)
29 การช่วยเหลือผู้ป่วยในการหาวิธีการสื่อสารแทนการใช้เสียง เช่น การใช้ภาษาท่าทาง การเขียนโดยจัดให้มีดินสอหรือปากกา หรือการใช้แผ่นภาพที่มีข้อความประกอบ เป็นต้น	2(5.7)	25(71.4)	8(22.9)
30 การแจ้งหรือบอกให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับวัน เดือน ปี หรือเวลา	7(20)	26(74.3)	2(5.7)
31 การแสดงความเห็นอกเห็นใจพูดปลอบใจและสัมผัสตัวผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ป่วยรู้สึกไม่สุขสบาย	1(2.9)	13(37.1)	21(60)
32 การเปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้บุคคลที่มีความสำคัญต่อผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย	-	8(22.9)	27(77.1)
33 การให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยว่าแพทย์และพยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่จะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่	1(2.9)	15(42.9)	19(54.3)
<b>ด้านจิตวิญญาณ</b>			
34 การให้กำลังใจผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย	1(2.9)	4(11.4)	30(85.7)
35 การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยนำสิ่งของผู้ป่วยรักผูกพันและคุ้นเคยหรือของที่ใช้เป็นประจำมาไว้ใกล้ตัว	-	2(5.7)	33(94.3)
36 การยินยอมให้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อซึ่งไม่ขัดต่อการรักษาพยาบาล	1(2.9)	2(5.7)	32(91.4)
37 การยินยอมให้ผู้ป่วยนำศาสนวัตถุหรือสิ่งของผู้ป่วยเคารพบูชาหรือเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวผู้ป่วยอยู่เสมอ	-	2(5.7)	33(94.3)

ตาราง 29 จำนวนและร้อยละของการปฏิบัติของพยาบาลในกิจกรรมการดูแลญาติตามการรับรู้ของญาติ จำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ

กิจกรรม	การปฏิบัติของพยาบาล		
	ไม่ได้ปฏิบัติ	เป็นบางครั้ง	เป็นประจำ
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)
<b>ด้านร่างกาย</b>			
1 การซักถามและให้ความสนใจในสุขภาพของญาติ	5(14.3)	25(71.4)	5(14.3)
2 การสนับสนุนให้ญาติได้รับการพักผ่อนนอนหลับอย่างเหมาะสมขณะให้การดูแลผู้ป่วย	1(2.9)	13(37.1)	21(60.0)
3 การเปิดโอกาสให้ญาติได้รับการผ่อนคลาย เช่น การอ่านหนังสือ ฟังเพลง หรือ ดูโทรทัศน์ เป็นต้น	6(17.1)	18(51.4)	11(31.4)

ตาราง 29 (ต่อ)

กิจกรรม	การปฏิบัติของพยาบาล		
	ไม่ได้ปฏิบัติ	เป็นบางครั้ง	เป็นประจำ
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)
<b>ด้านจิตสังคม</b>			
4 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วย เช่น อาการของโรค การวินิจฉัยโรค การพยากรณ์โรค	2(5.7)	21(60)	12(34.3)
5 การอธิบายให้ญาติเข้าใจถึงเหตุผลที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	1(2.9)	1(2.9)	33(94.3)
6 การอธิบายหรือแจ้งให้ญาติได้รับทราบถึงกิจกรรมการรักษาพยาบาลและเหตุผลในการทำกิจกรรมการรักษาพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วย	1(2.9)	28(80)	6(17.1)
7 การให้คำอธิบายแก่ญาติเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบของหอผู้ป่วยและของโรงพยาบาล	1(2.9)	-	34(97.1)
8 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ญาติควรปฏิบัติเมื่อให้การดูแลผู้ป่วย	2(5.7)	3(8.6)	30(85.7)
9 การเปิดโอกาสให้ญาติมีส่วนร่วมในการวางแผน การดูแลและการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เช่นการทำควมสะอาดร่างกาย การให้อาหารและน้ำ การบีบนวด การออกกำลังกาย เป็นต้น	-	-	35(100)
10 การอธิบายให้ญาติเข้าใจถึงวิธีการที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย	3(8.6)	28(80)	4(11.4)
11 การรับฟังญาติเมื่อญาติได้บอกถึงปัญหาหรือความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย	-	8(22.9)	27(77.1)
12 การปลอบโยนและให้กำลังใจเมื่อญาติต้องเผชิญกับปัญหาในการดูแลผู้ป่วยและช่วยเหลือญาติในการตัดสินใจ	2(5.7)	13(37.1)	20(57.1)
13 การให้ความมั่นใจแก่ญาติว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด	2(5.7)	12(34.3)	21(60)
<b>ด้านจิตวิญญาณ</b>			
14 การเปิดโอกาสหรืออนุญาตให้ญาติได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อหรือพิธีทางศาสนาซึ่งไม่ขัดต่อการรักษาพยาบาล	-	1(2.9)	34(97.1)
15 การเปิดโอกาสหรืออนุญาตให้ญาตินำวัตถุหรือสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจไว้กับตัวผู้ป่วยขณะอยู่ในหอผู้ป่วย	-	8(22.9)	27(77.1)
16 การให้กำลังใจแก่ญาติเมื่อญาติสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	6(17.1)	18(51.4)	11(31.4)
17 การพูดคุยกับญาติเมื่อผู้ป่วยมีอาการทรุดลงหรืออาจถึงแก่กรรม	9(25.7)	17(48.6)	9(25.7)



ตาราง 30 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอันดับของคะแนนการปฏิบัติของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจตามการรับรู้  
ของพยาบาลและญาติ จำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ

กิจกรรม	ค่าเฉลี่ยอันดับของคะแนนการปฏิบัติ ตามการรับรู้		Z	P
	พยาบาล	ญาติ		
<b>กิจกรรมการดูแลผู้ป่วย</b>				
<b>ด้านร่างกาย</b>				
1 การยึดท่อช่วยหายใจให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วย พลาสติกหรือเชือก	36.50	34.50	-1.142	.154
2 การเปลี่ยนพลาสติกหรือเชือกเวอร์คัหรือเมื่อเปียกชื้น	33.00	38.00	-1.526	.127
3 การตรวจสอบท่อช่วยหายใจให้อยู่ในตำแหน่งเดิม	34.49	36.51	-1.037	.300
4 การระมัดระวังท่อช่วยหายใจไม่ให้ดึงรั้งในขณะดูดเสมหะ พลิกตัวตะแคงตัวหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	35.00	36.00	-1.000	.317
5 การดูแลไม่ให้มีการหลุด หัก พับของสายต่อเครื่องช่วย หายใจ	36.00	35.00	-.586	.558
6 การดูแลระบอบท่าความชื้นให้มีน้ำอยู่ในระดับมาตรฐาน ที่กำหนดไว้	37.89	33.11	-1.554	.120
7 การวัดและบันทึกสัญญาณชีพของผู้ป่วยอย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมงหรือตามสภาพความจำเป็นของผู้ป่วย	35.00	36.00	-1.000	.317
8 การดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจ อย่างน้อยทุก 1-2 ชั่วโมง หรือตามสภาพความจำเป็นของผู้ป่วย	35.50	35.50	.000	1.000
9 การใช้ออกซิเจน 100% ต่อกับถุงลมช่วยหายใจบีบช่วย หายใจแก่ผู้ป่วยก่อน - ขณะ - หลังดูดเสมหะทุกครั้ง	32.41	38.59	-1.672	.095
10 การดูดเสมหะด้วยความนุ่มนวลและเบามือ	45.50	25.50	-4.912*	.000
11 การเช็ดข้อต่อของท่อช่วยหายใจ ถุงลมช่วยหายใจและ เครื่องช่วยหายใจด้วยแอลกอฮอล์ 70 % ก่อนและหลังดูด เสมหะทุกครั้ง	37.09	33.91	-.916	.360
12 การวัดและบันทึกปริมาณน้ำเข้าออกจากร่างกายทุก 8 ชม	36.11	34.89	-.435	.644
13 การเปิดโอกาสให้ผู้ปวยนอนหลับอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปลุก ผู้ป่วยขณะที่นอนหลับ	36.50	34.50	-.475	.635
14 การส่งเสริมการนอนหลับของผู้ป่วยโดยการช่วยให้ผู้ป่วยได้ รับความสุขสบายหรือผ่อนคลาย เช่น การทำความสะอาด ร่างกาย การเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่น การลดความเจ็บปวด การ นวดหลัง การจัดท่านอนที่เหมาะสม หรือ การจัดสิ่งแวดล้อม ล้อมไม่ให้รบกวน ผู้ป่วยเป็นต้น	30.50	40.50	-2.715*	.007
15 การซักถามถึงความเพียงพอหรือความพึงพอใจในการนอน หลับของผู้ป่วยแต่ละคืน	40.44	30.56	-2.416*	.016

ตาราง 30 (ต่อ)

กิจกรรม	ค่าเฉลี่ยอันดับของคะแนนการปฏิบัติ ตามการรับรู้		Z	P
	พยาบาล	ญาติ		
16 การดูแลหรือช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนไหวข้อและออกกำลังของกล้ามเนื้อในขณะนอนพักบนเตียง	33.07	37.93	-1.159	.246
17 การดูแลหรือช่วยเหลือผู้ป่วยในการพลิกตะแคงตัวทุก1-2 ชั่วโมง	33.50	37.50	-1.130	.258
18 การทำความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	35.00	36.00	-.461	.645
19 การทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ป่วยอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งและทุกครั้งผู้ป่วยปัสสาวะหรืออุจจาระ	36.00	35.00	-.586	.558
20 การช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยมีอาการท้องผูก เช่นการดูแลให้ได้ รับยาระบาย การสวนอุจจาระ ตามแผนการรักษา เป็นต้น <b>ด้านจิตสังคม</b>	42.00	29.00	<b>-3.169*</b>	.002
21 การแนะนำตัวให้ผู้ป่วยทราบว่าเป็นพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย ก่อนให้การพยาบาลในครั้งแรก	45.71	25.29	<b>-4.611*</b>	.000
22 การอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจวัตถุประสงค์และความจำเป็นที่ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	37.23	33.77	-.918	.359
23 การแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงผลการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	42.23	28.77	<b>-3.292*</b>	.001
24 การใช้สรรพนามนำหน้าชื่อผู้ป่วยตามความเหมาะสมกับ ผู้ป่วยแต่ละราย	34.00	37.00	-1.758	.079
25 การแจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนทุกครั้งที่จะปฏิบัติกิจกรรมการ รักษาพยาบาล	31.00	40.00	<b>-3.191*</b>	.001
26 การไม่เปิดเผยร่างกายของผู้ป่วยในขณะที่ให้การรักษา พยาบาลและอยู่กับผู้ป่วยทุกครั้งแพทย์ตรวจ	36.11	34.89	-.435	.664
27 การไม่ผูกมัดผู้ป่วยในขณะที่มีญาติดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด	38.00	33.00	-1.194	.232
28 การให้เวลาแก่ผู้ป่วยในการบอกหรือระบายปัญหาความ รู้สึกในใจหรือความต้องการการช่วยเหลือ	31.00	40.00	<b>-2.139*</b>	.032
29 การช่วยเหลือผู้ป่วยในการหาวิธีการสื่อสารแทนการใช้เสียง เช่น การใช้ภาษาท่าทาง การเขียนโดยจัดให้มีดินสอหรือ ปากกา หรือการใช้แผ่นภาพที่มีข้อความประกอบ เป็นต้น	41.07	29.93	<b>-2.634*</b>	.008
30 การแจ้งหรือบอกให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับวันเดือนปีหรือเวลา	40.19	30.81	<b>-2.389*</b>	.017
31 การแสดงความเห็นอกเห็นใจ พึงดลอบใจ และสัมผัสตัว ผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ป่วยรู้สึกไม่สุขสบาย	33.76	37.24	-.826	.409
32 การเปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้บุคคลที่มีความสำคัญต่อ ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย	36.89	34.11	-.844	.398

ตาราง 30 (ต่อ)

กิจกรรม	ค่าเฉลี่ยอันดับของคะแนนการปฏิบัติ ตามการรับรู้		Z	P
	พยาบาล	ญาติ		
33 การให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยว่าแพทย์และพยาบาลตลอดจน เจ้าหน้าที่จะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ <b>ด้านจิตวิญญาณ</b>	40.10	30.90	-2.317*	.021
34 การให้กำลังใจผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย	34.11	36.89	-.844	.398
35 การเปิดโอกาสให้ผู้พว้นำสิ่งของที่ผู้ป่วยรักผูกพันและคุ้นเคยหรือของที่ใช้เป็นประจำมาไว้ใกล้ตัว	36.00	35.00	-.586	.558
36 การยินยอมให้ผู้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อซึ่งไม่ขัดต่อการรักษาพยาบาล	36.51	34.49	-1.037	.300
37 การยินยอมให้ผู้พว้นำศาสนวัตถุหรือสิ่งของผู้ป่วยเคารพบูชาหรือเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวผู้ป่วยอยู่เสมอ	35.00	36.00	-.461	.645
<b>กิจกรรมการดูแลญาติ</b>				
<b>ด้านร่างกาย</b>				
1 การซักถามและให้ความสนใจในสุขภาพของญาติ	41.80	29.20	-3.065*	.002
2 การสนับสนุนให้ญาติได้รับการพักผ่อนนอนหลับอย่างเหมาะสมขณะให้การดูแลผู้ป่วย	38.13	32.87	-1.324	.186
3 การเปิดโอกาสให้ญาติได้รับการผ่อนคลาย เช่น การอ่านหนังสือ ฟังเพลง หรือ ดูโทรทัศน์ เป็นต้น	37.50	33.50	-.897	.370
<b>ด้านจิตสังคม</b>				
4 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเช่น อาการของโรค การวินิจฉัยโรค การพยากรณ์โรค	43.23	27.77	-3.654*	.000
5 การอธิบายให้ญาติเข้าใจถึงเหตุผลที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	35.53	35.47	-.029	.977
6 การอธิบายหรือแจ้งให้ญาติได้รับทราบถึงกิจกรรมการ รักษาพยาบาลและเหตุผลในการทำกิจกรรมการรักษาพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วย	47.57	23.43	-5.695*	.000
7 การให้คำอธิบายแก่ญาติเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบของหอผู้ป่วยและของโรงพยาบาล	35.03	35.97	-.552	.581
8 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ญาติควรปฏิบัติเมื่อให้การดูแลผู้ป่วย	36.11	34.89	-.435	.664

ตาราง 30 (ต่อ)

กิจกรรม	ค่าเฉลี่ยอันดับของคะแนนการปฏิบัติ ตามการรับรู้		Z	P
	พยาบาล	ญาติ		
9 การเปิดโอกาสให้ญาติมีส่วนร่วมในการวางแผน การดูแล และการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เช่น การทำ ความสะอาดร่างกาย การให้อาหารและน้ำ การบีบนิ้ว การออกกำลังกาย เป็นต้น	34.00	37.00	-1.758	.079
10 การอธิบายให้ญาติเข้าใจถึงวิธีการที่จะติดต่อสื่อสารกับ ผู้ป่วย	45.07	25.93	-4.485*	.000
11 การรับฟังญาติเมื่อญาติได้บอกถึงปัญหาหรือความ ต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย	36.89	34.11	-.844	.398
12 การปลอบโยนและให้กำลังใจเมื่อญาติต้องเผชิญกับปัญหา ในการดูแลผู้ป่วยและช่วยเหลือญาติในการตัดสินใจ	38.07	32.93	-1.261	.207
13 การให้ความมั่นใจแก่ญาติว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด	39.67	31.33	-2.180*	.029
<b>การดูแลด้านจิตวิญญาณ</b>				
14 การเปิดโอกาสหรืออนุญาตให้ญาติได้ปฏิบัติกิจกรรมตาม ความเชื่อหรือพิธีทางศาสนาซึ่งไม่ขัดต่อการรักษาพยาบาล	34.49	36.51	-1.037	.300
15 การเปิดโอกาสหรืออนุญาตให้ญาตินิมนต์หรือสิ่งยึด เนี่ยวทางจิตใจไว้กับตัวผู้ป่วยขณะอยู่ในหอผู้ป่วย	36.89	34.11	-.844	.398
16 การให้กำลังใจแก่ญาติเมื่อญาติสามารถให้การดูแลผู้ป่วย ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	43.43	25.57	-3.644*	.000
17 การพูดคุยกับญาติเมื่อผู้ป่วยมีอาการทรุดลงหรืออาจถึงแก่ กรรม	47.01	23.99	-5.373*	.000

ตาราง 31 เปรียบเทียบลำดับของกิจกรรมการพยาบาลที่ได้รับการปฏิบัติเป็นประจำจากมากไปน้อยตามการรับรู้ของพยาบาล และญาติ ในกิจกรรมการดูแลผู้ป่วย จำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ

ลำดับ ที่	กิจกรรมที่ได้รับการปฏิบัติเป็นประจำ ตามการรับรู้ของพยาบาล	พยาบาล (ร้อยละ)	กิจกรรมที่ได้รับการปฏิบัติเป็นประจำ ตามการรับรู้ของญาติ	ญาติ (ร้อยละ)
<b>ด้านร่างกาย</b>				
1	การยึดท่อช่วยหายใจให้อยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสมด้วย พลาสเตอร์หรือเชือก	100.0	การระมัดระวังท่อช่วยหายใจไม่ให้ดึงรั้ง	100.0
2	การระมัดระวังท่อช่วยหายใจไม่ให้ดึงรั้ง	97.1	การวัดและบันทึกสัญญาณชีพของผู้ป่วย อย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง / ตามสภาพของผู้ป่วย	100.0
3	การดูแลไม่ให้เกิดการหลุดหักพังของสายต่อ เครื่องช่วยหายใจ	97.1	การตรวจสอบท่อช่วยหายใจให้อยู่ตำแหน่ง เดิม	97.1
4	การวัดและบันทึกสัญญาณชีพของผู้ป่วย อย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง / ตามสภาพของผู้ป่วย	97.1	การดูแลเสมหะในท่อช่วยหายใจอย่างน้อยทุก 1-2 ชั่วโมงหรือตามสภาพของผู้ป่วย	97.1
5	การดูแลเสมหะในท่อช่วยหายใจอย่างน้อยทุก 1-2 ชั่วโมง หรือตามสภาพของผู้ป่วย	97.1	การยึดท่อช่วยหายใจให้อยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสมด้วยพลาสเตอร์หรือเชือก	94.3
6	การทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์	97.1	การดูแลไม่ให้เกิดการหลุด หัก พังของสาย ต่อเครื่องช่วยหายใจ	94.3
7	การตรวจสอบท่อช่วยหายใจให้อยู่ตำแหน่ง เดิม	91.4	การทำความสะอาดร่างกายอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	94.3
8	การดูแลกระบอกทำความสะอาดขึ้นให้มีน้ำอยู่ใน ระดับมาตรฐานที่กำหนด	91.4	การทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	94.3
9	การดูแลเสมหะด้วยความนุ่มนวลและเบามือ	91.4	การส่งเสริมการนอนหลับของผู้ป่วย	88.6
10	การทำความสะอาดร่างกายอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	91.4	การวัดและบันทึกปริมาณน้ำเข้าและออกจาก ร่างกายทุก 8 ชั่วโมง	85.7
11	การวัดและบันทึกปริมาณน้ำเข้าและออกจาก ร่างกายทุก 8 ชั่วโมง	88.6	การใช้ออกซิเจน 100% ต่อกับถุงลมช่วย หายใจบีบช่วยหายใจก่อน-ขณะ-หลัง ดูด เสมหะ	82.9
12	การเช็ดข้อต่อท่อช่วยหายใจ-ถุงลมช่วย หายใจ-เครื่องช่วยหายใจ ก่อน-ขณะ-หลังดูด เสมหะทุกครั้ง	82.9	การดูแลหรือช่วยเหลือผู้ป่วยในการพลิก ตะแคงตัวทุก 1-2 ชั่วโมง	82.9
13	การช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยมีอาการท้องผูก	80.0	การดูแลกระบอกทำความสะอาดขึ้นให้มีน้ำอยู่ใน ระดับมาตรฐานที่กำหนด	77.1
14	การเปลี่ยนพลาสเตอร์หรือเชือกเวอร์ลจครั้ง หรือเมื่อเปียกชื้น	74.3	การเช็ดข้อต่อท่อช่วยหายใจ ถุงลมช่วย หายใจ และเครื่องช่วยหายใจก่อน-หลังดูด เสมหะ	74.3
15	การดูแลหรือช่วยเหลือในการพลิกตะแคงตัว ทุก 1-2 ชั่วโมง	71.4	การเปลี่ยนพลาสเตอร์หรือเชือก เวอร์ลจครั้ง หรือเมื่อเปียกชื้น	71.4

ตาราง 31 (ต่อ)

ลำดับ ที่	กิจกรรมที่ได้รับการปฏิบัติเป็นประจำ ตามการรับรู้ของพยาบาล	พยาบาล (ร้อยละ)	กิจกรรมที่ได้รับการปฏิบัติเป็นประจำ ตามการรับรู้ของญาติ	ญาติ (ร้อยละ)
16	การใช้ข้อออกซิเจน100%ต่อกับถุงลมช่วย หายใจบีบช่วยหายใจก่อน-ขณะ-หลังดูด เสมหะ	65.7	การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยนอนหลับอย่างต่อเนื่อง	45.7
17	การส่งเสริมการนอนหลับของผู้ป่วย	60.0	การดูแลหรือช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนไหวของข้อและออกกำลังของกล้ามเนื้อ	45.7
18	การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยนอนหลับอย่างต่อเนื่อง	51.4	การช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยมีอาการท้องผูก	42.9
19	การซักถามถึงความเพียงพอหรือความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วย	42.9	การดูแลเสมหะด้วยความนุ่มนวลและเบามือ	34.3
20	การดูแลในการเคลื่อนไหวของข้อและออก กำลังของกล้ามเนื้อ	31.4	การซักถามถึงความเพียงพอ/ความพึงพอใจ ในการนอนหลับแต่ละคืน	17.1
<b>ด้านจิตสังคม</b>				
1	การใช้สรรพนามนำหน้าชื่อผู้ป่วยตามความ เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย	91.4	การใช้สรรพนามนำหน้าชื่อผู้ป่วยตามความ เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย	100.0
2	การไม่เปิดเผยร่างกายของผู้ป่วยในขณะที่ให้ การรักษาพยาบาล	88.6	การไม่เปิดเผยร่างกายของผู้ป่วยในขณะที่ให้ การรักษาพยาบาล	85.7
3	การเปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้บุคคลที่มีความ สำคัญต่อผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแล ผู้ป่วย	85.7	การเปิดโอกาส / สนับสนุนให้บุคคลที่มีความ สำคัญต่อผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย	77.1
4	การให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยว่าแพทย์และ พยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่จะให้การดูแล ผู้ป่วยอย่างเต็มที่	80.0	การอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	68.6
5	การอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	77.1	การให้เวลาแก่ผู้ป่วยในการบอกหรือระบาย ปัญหาความรู้สึกในใจหรือความต้องการการ ช่วยเหลือ	65.7
6	การแจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนทุกครั้งที่จะปฏิบัติ การรักษาพยาบาล	74.3	การแจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนทุกครั้งที่จะปฏิบัติ การรักษาพยาบาล	60.0
7	การแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงผลการรักษา พยาบาลอย่างต่อเนื่อง	54.3	การแสดงความเห็นอกเห็นใจพูดปลอบใจและ สัมผัสตัวผู้ป่วย	60.0
8	การช่วยเหลือผู้ป่วยในการหาวิธีการสื่อสาร แทนการใช้เสียง	54.3	การให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยว่าแพทย์และ พยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่นๆจะให้การ ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่	54.3
9	การไม่ผูกมัดผู้ป่วยในขณะที่มีญาติดูแลอย่าง ใกล้ชิด	51.4	การไม่ผูกมัดผู้ป่วยในขณะที่มีญาติดูแลอย่าง ใกล้ชิด	37.1

ตาราง 31 (ต่อ)

ลำดับ ที่	กิจกรรมที่ได้รับการปฏิบัติเป็นประจำ ตามการรับรู้ของพยาบาล	พยาบาล (ร้อยละ)	กิจกรรมที่ได้รับการปฏิบัติเป็นประจำ ตามการรับรู้ของญาติ	ญาติ (ร้อยละ)
10	การแสดงความเห็นอกเห็นใจพูดปลอบใจและ สัมผัสตัวผู้ป่วย	48.6	การช่วยเหลือผู้ป่วยในการหาวิธีการสื่อสาร แทนการใช้เสียง	22.9
11	การให้เวลาแก่ผู้ป่วยในการบอกหรือระบาย ปัญหาความรู้สึกในใจหรือความต้องการการ ช่วยเหลือ	40.0	การแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงผลการรักษา พยาบาลอย่างต่อเนื่อง	17.1
12	การแจ้งหรือบอกให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี หรือเวลา	25.7	การแนะนำตัวให้ทราบว่าเป็นพยาบาลผู้ดูแล ผู้ป่วยก่อนให้การพยาบาลในครั้งแรก	5.7
13	การแนะนำตัวให้ทราบว่าเป็นพยาบาลผู้ดูแล ก่อนให้การพยาบาลในครั้งแรก ด้านจิตวิญญาณ	20.0	การแจ้งหรือบอกให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับวัน เดือน ปี หรือเวลา	5.7
1	การยินยอมให้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติกิจกรรมตาม ความเชื่อซึ่งไม่ขัดต่อการรักษาพยาบาล	97.1	การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยนำสิ่งของที่รักผูกพัน และคุ้นเคยมาไว้ใกล้ตัว	94.3
2	การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยนำสิ่งของที่รักผูกพัน และคุ้นเคยมาไว้ใกล้ตัว	97.1	การยินยอมให้ผู้ป่วยนำศาสนวัตถุหรือสิ่งที่ เคารพบูชาหรือเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัว ผู้ป่วยอยู่เสมอ	94.3
3	การยินยอมให้ผู้ป่วยนำศาสนวัตถุหรือสิ่งที่ เคารพบูชาหรือเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ติดตัว อยู่เสมอ	91.4	การยินยอมให้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติกิจกรรมตาม ความเชื่อซึ่งไม่ขัดต่อการรักษาพยาบาล	91.4
4	การให้กำลังใจเมื่อผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ ตามเป้าหมาย	77.1	การให้กำลังใจเมื่อผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ ตามเป้าหมาย	85.7

ตาราง 32 เปรียบเทียบลำดับของกิจกรรมการพยาบาลที่ได้รับการปฏิบัติเป็นประจำจากมากไปน้อยตามการรับรู้ของพยาบาลและ  
ญาติ ในกิจกรรมการดูแลญาติ จำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ

ลำดับ ที่	กิจกรรมที่ได้รับการปฏิบัติเป็นประจำ ตามการรับรู้ของพยาบาล	พยาบาล (ร้อยละ)	กิจกรรมที่ได้รับการปฏิบัติเป็นประจำ ตามการรับรู้ของญาติ	ญาติ (ร้อยละ)
<b>ด้านร่างกาย</b>				
1	การสนับสนุนให้ญาติได้รับการพักผ่อนนอน หลับอย่างเหมาะสม	74.3	การสนับสนุนให้ญาติได้รับการพักผ่อนนอน หลับอย่างเหมาะสม	60.0
2	การเปิดโอกาสให้ญาติได้รับการผ่อนคลาย	42.9	การเปิดโอกาสให้ญาติได้รับการผ่อนคลาย	31.4
3	การซักถามและให้ความสนใจในสุขภาพของ ญาติ	40.0	การซักถามและให้ความสนใจในสุขภาพของ ญาติ	14.3

ตาราง 32 (ต่อ)

ลำดับ ที่	กิจกรรมที่ได้รับการปฏิบัติเป็นประจำ ตามการรับรู้ของพยาบาล	พยาบาล (ร้อยละ)	กิจกรรมที่ได้รับการปฏิบัติเป็นประจำ ตามการรับรู้ของญาติ	ญาติ (ร้อยละ)
<b>ด้านจิตสังคม</b>				
1	การอธิบายให้ญาติเข้าใจถึงเหตุผลที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	94.3	การเปิดโอกาสให้ญาติมีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลและตัดสินใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย	100.0
2	การให้คำอธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมกฎระเบียบของหอผู้ป่วยและของโรงพยาบาล	94.3	การให้คำอธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมกฎระเบียบของหอผู้ป่วยและของโรงพยาบาล	97.1
3	การเปิดโอกาสให้ญาติมีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลและตัดสินใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย	91.4	การอธิบายให้ญาติเข้าใจถึงเหตุผลที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	94.3
4	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ญาติควรปฏิบัติเมื่อให้การดูแลผู้ป่วย	88.6	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ญาติควรปฏิบัติเมื่อให้การดูแลผู้ป่วย	85.7
5	การอธิบายให้ญาติทราบถึงกิจกรรมการรักษาพยาบาลและเหตุผลในการทำกิจกรรมการรักษาพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วย	85.7	การรับฟังญาติเมื่อญาติได้บอกถึงปัญหาหรือความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย	77.1
6	การรับฟังญาติเมื่อญาติได้บอกถึงปัญหาหรือความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย	85.7	การให้ความมั่นใจแก่ญาติว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด	60.0
7	การให้ความมั่นใจแก่ญาติว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด	82.9	การปลอบโยนและให้กำลังใจเมื่อญาติเผชิญกับปัญหาในการดูแลผู้ป่วย	57.1
8	การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วย	77.1	การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วย	34.3
9	การปลอบโยนและให้กำลังใจเมื่อญาติเผชิญกับปัญหาในการดูแลผู้ป่วย	71.4	การอธิบายให้ญาติทราบถึงกิจกรรมการรักษาพยาบาลและเหตุผลในการทำกิจกรรมกับผู้ป่วย	17.1
10	การอธิบายให้ญาติเข้าใจถึงวิธีการที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย	65.7	การอธิบายให้ญาติเข้าใจถึงวิธีการที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย	11.4
<b>ด้านจิตวิญญาณ</b>				
1	การพูดคุยกับญาติเมื่อผู้ป่วยมีอาการทรุดลงหรืออาจถึงแก่กรรม	91.4	การเปิดโอกาสหรืออนุญาตให้ญาติได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อหรือพิธีทางศาสนา	97.1
2	การเปิดโอกาส/อนุญาตให้ญาติได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อหรือพิธีทางศาสนา	91.4	การเปิดโอกาสหรืออนุญาตให้ญาตินำวัตถุหรือสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจไว้กับตัวผู้ป่วย	77.1
3	การเปิดโอกาส/อนุญาตให้ญาตินำวัตถุหรือสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจไว้กับตัวผู้ป่วย	85.7	การให้กำลังใจแก่ญาติเมื่อญาติสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	31.4
4	การให้กำลังใจแก่ญาติเมื่อญาติสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	74.3	การพูดคุยกับญาติเมื่อผู้ป่วยมีอาการทรุดลงหรืออาจถึงแก่กรรม	25.7