

ภาคผนวก

ภาคผนวกแสดงแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย

แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความชุกของฟันสึก

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง และกรุณาเติมข้อความที่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือเหมาะสมในช่องว่างที่เว้นไว้

Code

ชื่อ หมายเลขบัตร

เพศ ช. หญิง.

ที่อยู่

อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์

วันที่เกิด (วัน/เดือน/ปี) อายุปี เดือน

กีฬาที่เล่น

โรคทางระบบ

☛ ไล่เลื่อน(Hiatus Hernia) มี ไม่มี

☛ กระเพาะอักเสบ(Gastritis) มี ไม่มี

☛ การสูญเสียความรู้สึกลอยอยากอาหาร (Anorexia or Bulimia nervosa) มี ไม่มี

☛ โรคพิษสุราเรื้อรัง มี ไม่มี

☛ อื่นๆ

☛ ยาที่รับประทานเป็นประจำ

การตรวจหรือการสัมภาษณ์เกี่ยวกับระบบการบดเคี้ยวและการแปร่งฟัน

☛ นอนกัดฟัน (Bruxing) เคย ไม่เคย

☛ Grating,clicking,snapping TMJ.sound มี ไม่มี

☛ นิสัยเคี้ยวข้างเดียว มี ไม่มี

การตรวจในช่องปาก

ฟันบน

8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8
								ส่วนคอฟัน								
								ด้านแก้ม								
								ด้านบดเคี้ยว/ด้านตัด								
								ด้านลิ้น								
								ด้านลิ้น								
								ด้านบดเคี้ยว/ด้านตัด								
								ด้านแก้ม								
								ส่วนคอฟัน								

ฟันล่าง

K ลักษณะการสึกในช่องปาก

- การสึกจากการบดเคี้ยว(attrition)
- การสึก(abrasion)
- การกร่อน(erosion)
- แอฟแฟรคชัน(abfraction)

ระดับ	ผิวด้าน	ลักษณะ
0	ก/ล/บ/ต ค	ไม่มีการสูญเสียผิวเคลือบฟัน รูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง
1	ก/ล/บ/ต ค	มีการสูญเสียผิวเคลือบฟันเพียงเล็กน้อย มีการเสีรูปร่างเล็กน้อย
2	ก/ล/บ ต ค	มีการสูญเสียผิวเคลือบฟันจนถึงชั้นเนื้อฟันน้อยกว่า 1 ใน 3 ของเนื้อฟันทั้งหมด มีการสูญเสียเคลือบฟันโดยทะลุเนื้อฟันเล็กน้อย รอยโรคมีขนาดความลึกน้อยกว่า 1-2 มม.
3	ก/ล/บ ต ค	มีการสูญเสียผิวเคลือบฟันจนถึงชั้นเนื้อฟันมากกว่า 1 ใน 3 ของเนื้อฟันทั้งหมดแต่ ไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน สูญเสียผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันแต่ไม่ทะลุโพรงประสาทฟันหรือ เนื้อฟันลำดับ สอง(secondary dentin) รอยโรคลึก 1-2 มม.
4	ก/ล/บ ต ค	มีการสูญเสียผิวเคลือบฟัน เนื้อฟัน ถูกลามจนถึงโพรงประสาทฟัน ทะลุโพรงประสาทฟัน หรือทะลุ เนื้อฟันลำดับสอง รอยโรคลึกมากกว่า 2 มม. หรือทะลุโพรงประสาทฟันหรือทะลุเนื้อฟันลำดับสอง