

paddock /แพดค์-เดค/ n (Ani.Hus) ที่ดินแปลงช่อยแต่ละแปลงในฟาร์ม เช่น แปลงหญ้าขนาด

10-15 ไร่ Cows in the paddock can graze on green grass and enjoy their exercise.

palatable /แพล-ลิก-เทอะ-เบิล/ adj (Ani.Hus) น่ากิน เอร์ดอร์อย palatability

/แพล-ลิก-เทอะ-บลิ-ลิ-ที/ หรือ palatableness /แพล-ลิก-เทอะ-เบิล-เนช/ n

ความน่ากินของอาหารหรือความเอร์ดอร์อย Carcass grades are based upon the quality and palatability of the meat.

palpation /แพล-เพ-ເພີມ/ n (Ani.Hus) การคลำ การตรวจโดยใช้วิธีสัมผัสตัวยมือ เช่นการ

ให้มือล้วงเข้าทางทวารของวัวเพื่อตรวจการตั้งครรภ์ Rectal palpation is a good method for pregnancy test. palpate /แพล-ເພກ/ vt คลำ ตรวจตัวยมือ

pancreas /แพง-ເຄຣຍຊ/ n (Ani.Hus) ตับอ่อน ซึ่งเป็นตับที่อยู่ติดกับลำไส้เล็กตอนด้าน เป็นที่ขับนำ

ยื่นและสร้างนิโนนอิงซูลิน The liver and pancreas contribute secretions and enzymes for digestion.

parakeratosis /แพ-ເຮອະ-ເຄ-ເຮອະ-ໄກ-ຊີ້/ n (Ani.Hus) โรคผิวหนังกระด้างที่ทำให้

ผิวนั้งหนาขึ้น มีชั้นแผลมากและดัน High levels of calcium and possibly phosphorus bring on parakeratosis.

paralysis /พะ-โล-แล-ล็อก-ชิซ-/ (pl paralyses /พะ-โล-แล-ล็อก-ชิซ-/) n (Ani.Hus)

อัมพาต อาการเป็นโรคอัมพาต ซึ่งเกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท 1 After experiencing three or four months of a deficient ration, paralysis will set in. 2 Paralysis and respiratory difficulty in breathing is a sign of deviation from normal health.

paratyphoid /แพ-เรอะ-ไก-ฟอย-/ n (Ani.Hus) พาราไทฟอย คือ โรคที่เกิดจากแบคทีเรียพมามากในสุกรและไก่ ทำให้มีอาการท้องร่วง Good hatchery sanitation and elimination of infected adults are ways to control paratyphoid infections.

parturition /พา-ทิ-ริ-เดิน-/ n (Ani.Hus) การคลอด Signs that are visible within a week of parturition is a swelling and reddening of the vulva and a relaxation of the pelvis.

pastern /แพ-เทอน-/ n (Ani.Hus) หัวเท้า ซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่ระหว่างกีบ (เล็บ) กับหัวเข็ง หัวขา A good hog should have straight and strong pasterns when it stands.

pasteurization /พา-เชอ-ไร-ชี-เดิน-/ n (Ani.Hus) การพาสเจอร์ไรซ์ การผ่าเชื้อในอาหารหรือน้ำนม โดยทำให้มีอุณหภูมิ 60 - 65 °C นาน 30 นาที และทำให้เย็นลงโดยเร็ว The principle of pasteurization is to keep milk at a high temperature for some time to kill harmful bacteria. **pasteurize** /พา-เชอ-ไร-/ v ผ่าเชื้อ

pasture /พาเช-เชอะ/ n (Ani.Hus) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ Good pasture should be a mixture of grasses and legumes.

pathogen /แพธ-เทอะ-เจอน/ n (Ani.Hus) ตัวก่อโรค เชื้อโรค ซึ่งได้แก่พากเบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส หรืออื่น ๆ For certain disease control, the pathogen must be destroyed.

paunch /พอนซ์/ n (Ani.Hus) กระเพาะของสัตว์ ซึ่งมีลักษณะเป็นโพรงใหญ่ เช่น กระเพาะที่หันออกวัว The rumen paunch occupies most of the area to the left of the centre line.

pedigree /เพดิ-เดอะ-เกรี/ n (Ani.Hus) พันธุประวัติ ซึ่งบันทึกรายละเอียดของสัตว์แต่ละตัว โดย ข้อมูลง่ายถึงฟองแม่และบรรพบุรุษประมาณสี่ถึงห้าช่วง The best use of pedigree information is as a basis for selecting young animals.

pellagra /เพอะ-แอล-เกรอะ/ n (Ani.Hus) โรคผิวหนังตกกระ โรคที่เกิดจากภารชาต ไตามินในอาชีว (niacin) ทำให้ผิวนังอักเสบ ระบบย่อยอาหารพิการ และเกี่ยวโยงไปถึง ระบบประสาทด้วย Pellagra in pigs is a sign of a deficiency of niacin.

pellet /เพล-ลิต/ n (Ani.Hus) อาหารอัดเม็ด หรืออาหารเม็ด Animals like to consume pellets rather than mash.

penis /ปี-นิซ/ n (Ani.Hus) ลิ้งค์ อวัยวะเพศของสัตว์ตัวผู้ ซึ่งเป็นส่วนที่จะปลดปล่อยเมล็ดสemen ให้เข้าไป ในอวัยวะเพศของตัวเมีย The seminal fluid is ejaculated through the penis into the reproductive tract of the female.

peristalsis /เพริส-ทอล-ซิส/ n (Ani.Hus) การบีบตัวเป็นระยะ Food is moved forward through the action of peristalsis.

perosis /เพร-ไรซ-ชิส/ n (Ani.Hus) โรคเอ็นเคลื่อนในสัตว์ปีก เนื่องจากขาดธาตุแมงกานีส ทำให้ห้อเข่าดอง เดินไม่ได้ Poultry are susceptible to perosis when they lack manganese in the diet.

pinkeye /พิง-ไอย/ n (Ani.Hus) โรคตาแดงในสัตว์ฟากแพะ แกะ และโค ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ทำให้มีอาการตาแดง มีขี้ตาและน้ำตามาก All cattle are susceptible to pinkeye.

pituitary gland /พิ-ทิว-ເອອະ-ເທະ-ຮີ-ແກລນໍ/ n (Ani.Hus) ต่อมใต้สมองเบื้องต่อม หรือไม่สำคัญที่สุดของร่างกาย ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนແປດถึงเก้าชนิด เพื่อการเจริญเติบโต การเผาผลาญอาหาร การดำรงชีพและการสืบพันธุ์ The pituitary gland produces 8 - 9 important hormones including luteinizing hormone.

placenta /ເພລອະ-ເຫັນ-ເກອະ/ n (Ani.Hus) รก เป็นอวัยวะที่หุ้มตัวลูกสัตว์อ่อนในครรภ์ When a cow fails to carry its foetus to full term , the calf may die but the cow has a retained placenta.

plasma /ພລອຊ-ເນອະ/ n (Ani.Hus) พลasmA หมายถึงของเหลวหรือน้ำในเลือด ที่ได้จากการใส่สารป้องกันการแข็งตัวของเลือดลงไป แล้ววางให้มีดเลือดแตกตะกอน ส่วนที่เป็นของเหลวข้างบน เรียกว่าพลasma Secretions from the uterine glands and blood plasma are important foods for the foetus.

pneumonia /นีว-ไน-เนีย/ n (Ani.Hus) โรคปอดบวม คือ โรคที่ทำให้ผนังของถุงลมอักเสบ
ฝนตก Heavy rain and wind can induce pig pneumonia.

poll /โพล/ n (Ani.Hus) พัฒนาชนิดหนึ่ง กระเพาะ หรือหน้าผาก ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่าง
เข้าทั้งสองข้าง The red poll tends to have a large barrel and is highly
fleshed in the loin and hindquarter.

pork /พโคร/ n (Ani.Hus) เนื้อสุกร หรือวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสุกร Pork from sows is
marketed mainly for human consumption.

postmortem /โพส-มอร์-เต็ม/ n (Ani.Hus) การเปิดตรวจชาก หรือการพิสูจน์ชากของสัตว์
ที่ตาย Veterinarians do the postmortem after death.

postpartum /โพส-พา-เต็ม/ adj n (Ani.Hus) ช่วงหลังคลอด ภาวะหลังคลอด
Postpartum examination of the dam should be carried out regularly.

poultry /โพล-ทรี/ n (Ani.Hus) สัตว์ปีก หมายถึง สัตว์ตระกูลนก พวกเป็ด ไก่ ห่านและไก่งวง
The poultry industry has changed over the years.

precursor /พรี-เครอ-เชอเร/ n (Ani.Hus) สารต้นเหตุ หรือสารตัวการที่จะก่อให้เกิดสารตัวอื่น
1 Lack of vitamin A is a precursor of disease. 2 Carotene is a
precursor of vitamin A.

pregnancy /ເພົກແພນ-ັງ/ n (Ani.Hus) การอັນທົ່ງ ຜົກກາຣຕິ່ງຄຣກ໌ Vaccination can be done at any stage during pregnancy. pregnant /ເພົກ-ເນີ້ງ/ adj ມີທົ່ງ ຜົກກຳລັງຕິ່ງຄຣກ໌ Pregnant cows require lush green grass.

premix /ພຣີ-ມີດີ້/ n (Ani.Hus) ສາຮຜສມລວງໜ້າ ຫ້ວອາຫາຣ ຜົກສູຕອາຫາຣເຂັ້ມພັກເພື່ອສມໄວ້ລວງໜ້າ Premix supplements contain antibiotics, protein, vitamins and minerals.

prime /ໄຟ່/ adj (Ani.Hus) ຂັ້ນດີເລີຍ ຂັ້ນສູງສຸດໃນກະບວນເດືອກັນ Prime beef is an expensive meal in Bangkok.

progeny /ເພຣະ-ເຈອະ-ນີ/ n (Ani.Hus) ລູກຂອງສັງວົນ ລູກ ຈາ ພລານ ຈາ ຂອງສັງວົນ 1 When the bull is selected for breeding purpose , the performance of its progeny is measured. 2 Progeny testing and a strict culling programme ensure a selection of the best to be bred.

progesterone /ໂພຣ-ເຈຊີ-ເຖອະ-ໄຣນ/ n (Ani.Hus) ໂປຣເຈສເຕອໄຣນ ຢອർໂນນຂອງສັງວົນເນີຍທີ່ຂັ້ນຈາກຄອງປີສູລູເຕີຍມ (corpus luteum) ຜົກເຫຼັດສີເບີລືອງເນັຮັງໄໝ ມີໜັກທີ່ປ່ອງກັນມີໃຫ້ໄໝພອງໃໝ່ຕົກລົງມາແລະຊ້າຍໃນກາຣຕິ່ງທົ່ງ The corpus luteum produces a hormone called progesterone.

prolactin /ໂພຣ-ແລຄ-ທິນ/ n (Ani.Hus) ໂປຣແລດຕິນ ຢອർໂມນຈາກຕ່ອນໄຕສອງ ມີໜັກທີ່ກະຕຸນກາຣພື້ນໜ້າມ ແລະຄວາມຄຸມພຸດຕິກຣມຄວາມເບີແມ່ຂອງສັງວົນ If fertilization does occur, the corpus luteum retains its size under the influence of the anterior pituitary hormone prolactin.

prolapse /พรอ-แลพ/ n (Ani.Hus) การหลัก การเลื่อนถอยของอวัยวะจากตำแหน่งเดิม เช่น การมีมดลูกบลิ้นและหลักออกมาร้ากซ่องคลอดของสัตว์ The prolapse of the uterus is one reason for animal culling. prolapse /พรอ-แลพ/ v

prolific /เพรอะ-ลิ-ฟิค/ adj (Ani.Hus) ลูกดก 1 Landrace is noted for good feed conversion and prolific reproduction. 2 Swine are one of the most prolific animals.

prostate /พรอช-ชเตրท/ หรือ prostate gland /พรอช-ชเตรท-แกลน/ n (Ani.Hus) ต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นต่อมเดี่ยว ที่ตั้งและหุ้มอยู่รอบ ๆ ท่อปัสสาวะบริเวณกระโคน ทำหน้าที่ขับน้ำเหลืองตัวอสุจิ ซึ่งมีสารตุลสิ่งจะสืบตัว The Cowper's gland and the prostate gland are commonly called secondary sex glands.

proventriculus /พรอ-เวน-ทริ-คิว-เลอช/ n (Ani.Hus) กระเพาะจริงทองไว้ ชื่ออยู่ระหว่างกระเพาะผัก (crop) และกิน (gizzard) The gullet is a canal that leads to the crop and continues on to the proventriculus.

proximate analysis /พรอค-ชิ-เมก เออะ-แอล-ลิ-ชิซ/ n (Ani.Hus) การวิเคราะห์โดยประมาณ เพื่อหาค่าของน้ำ โปรตีนทดแทน ไขมัน เส้นใย และไนโตรเจนฟรี(เอนแทรนซ์) (แป้งและน้ำตาล) The main system used in a chemical analysis of feed nutrients is the Weende system of proximate analysis.

puberty /พิว-เบอ-ที/ n (Ani.Hus) ความเป็นหนุ่มเป็นสาว ซึ่งแสดงว่าสัตว์มีความพร้อมที่จะสืบพันธุ์ได้ The male and female reproductive systems do not become fully functional until puberty.

pullet /พูล-ลิต/ n (Ani.Hus) ไก่สาว ชิ้งมีอายุใกล้จะไข่ หรือเพิ่งเริ่มไข่ Pullets are reared throughout the year to replace old layers.

pullorum /เพลล-โล-เริม/ n (Ani.Hus) โรคซึ้งไข้ในไก่ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย pullorum (salmonella pullorum) ทำให้ไก่ท้องร่วงอย่างแรง โรคนี้ถ่ายทอดกันทางฟองไข่ หรือติดต่อกันระหว่างลูกไก่ Pullorum disease can be deadly to baby chicks.

pyrexia /ไฟ-เรค-เซีย/ n (Ani.Hus) อาการเป็นไข้ A common symptom of animal sickness is pyrexia.

quarantine /夸-เคว-เระ-ทีน/ n (Ani.Hus) การกักกันสัตว์ ด้านกักกันเพื่อตรวจสอบและป้องกันโรคสัตว์ Quarantine is a strategy of disease control by isolation.

quarter /คوار-เตอร์/ n (Ani.Hus) ที่สัก หรือส่วนหนึ่งของสัตว์ เช่นส่วนหน้าของสัตว์ (fore quarter) และส่วนท้ายของสัตว์ (hind quarter) Each quarter of the udder is milked out.

rabies /ರಾ-బೀಸ್/ n (Ani.Hus) โรคกลัวน้ำ โรคพิษสูนหมา Rabies is a viral disease which may affect most farm animals.

ram /ರಾಮ್/ n (Ani.Hus) แกะตัวผู้ The uterus consists of two horns which look like a ram's horn.

ranch /ರಾಂಚ್/ n (Ani.Hus) ทุ่งนา หรือดอกปศุสัตว์ King Ranch in Texas is the birth place of Santa Gertrudis cattle.

rancid /ರಾನ್-ಚಿಡ/ adj (Ani.Hus) ที่เหม็นหืน เกิดจากการที่ไขมันในอาหารถูกออกซิได้ Animal feed will become rancid if it is kept too long. **rancidity** /ರಾನ್-ಚಿಡ-ಡಿ-ಟಿ/ หรือ **rancidness** /ರಾನ್-ಚಿಡ-ನೆಸ್/ n อาการเหม็นหืน

ration /ರೆ-ಡಿಷನ್/ n (Ani.Hus) อาหารแต่ละวัน อาหารที่ให้สัตว์กินในช่วงเวลาหนึ่งวัน During the dry season , concentrate rations are fed to support animal growth and production.

rear /ರೆಯ್/ vt (Ani.Hus) เลี้ยงดู At present, many baby pigs are reared on slatted floor. n ส่วนท้ายของสัตว์ The rear of affected pigs becomes wet and stained.

rectum /ರೆಕ್ಟ-ಟೆಂಮ್/ n (Ani.Hus) ส่วนทวารหนัก ลำไส้ใหญ่ส่วนที่ติดกับทวารหนัก The rectum of a cow is the site of water absorption.

regurgitate /ริ-เกอ-จิว-เทท/ v (Ani.Hus) ขยี้อ่อนหรือสำรอกอาหารออกมารีบเคี้ยวใหม่ In the ruminant, the cud is regurgitated for chewing. **regurgitation** /ริ-เกอ-จิว-เทท-เดิน/ n การสำรอกอาหารออกมารีบเคี้ยวใหม่

relaxin /ริ-แลค-ชิน/ n (Ani.Hus) ฮอร์โมนรีแลกชินชี้งับจากการไข้เมดลูกและรังไข่ มีหน้าที่ช่วยในการขยายตัวของกระดูกเชิงกรานในระยะตั้งท้องและระยะคลอดลูก Relaxin will cause on expansion of pubic bones during parturition.

repeatability /รี-ฟี-เทอะ-บี-ลิ-ที/ n (Ani.Hus) อัตราซ้ำของลักษณะต่าง ๆ เช่นการผลิต การผลิตไใช้ของสัตว์ ซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถซ้ำแล้วซ้ำอีก ในเวลาหรือจำนวนไม่เลี้ยงกัน In animal breeding, selected traits should have high repeatability.

residue /เรซ-ชี-ดิว/ n (Ani.Hus) เศษเหลือ ของเหลือ หรือาก At present, many crop residues are used in livestock feeding.

respiration /เรซ-พิ-เร-เดิน/ n (Ani.Hus) การหายใจ การแลกเปลี่ยนระหว่างก้าชาร์บอนไดออกไซด์ กับก้าชออกซิเจน A good method to study nutritional requirements is to put the animal in a respiration chamber.

restraining /ริ-ชเตrn-นิง/ n (Ani.Hus) การบังคับสัตว์ การปฏิบัติกับสัตว์เพื่อให้อ่อนน้อมหรือควบคุมได้ Early restraining is accomplished by the use of ropes.

reticulum /เร-ติ-คิว-เลิม/ n (Ani.Hus) เรทิคิวลัม กระเพาะส่วนที่สองของลำไส้เดียวເອື້ອງ
ມືລັກພະຄລາຂໍຮັງຜົ່ງ The compound stomach is composed of the rumen, the
reticulum, the omasum and the abomasum.

rhinitis /ริ-ไน-ທີ່ສ/ n (Ani.Hus) ໄຣຄໄໂຮງຈຸນກັກເສບ ເຊື່ອບູໄໂຮງຈຸນກັກເສບ
Rhinitis does not cause many deaths.

rickets /ຣິ-ຄີກ/ n (Ani.Hus) ໄຣຄກະດູກອ່ອນທີ່ເກີດເພົາຮ່າສັດວິຕາມິນິດ ທີ່ອໜາດ
ຮາຕຸແຄລເຫັນແລະຝອສຳໂວຣ໌ It is difficult to cure an animal with advanced
rickets.

rigor mortis /ຮີ-ເກອະ ມອ-ທີ່ສ/ ທີ່ອ /ໄຮ-ເກອະ-ມອ-ທີ່ສ/ n (Ani.Hus) ແກ້ງຕ້າ ອາການ
ທີ່ໜ້າກສັດວິນີ້ງຕ້າວລັງຈາກຕາຍໃໝ່ ຈະ In sudden deaths, rigor mortis does not
always set in as quickly as normally expected.

roaster /ໄຣ່-ເກອະ/ n (Ani.Hus) ໄກເນື້ອຍ່າງ ໄກກະກອງອາຍຸນາກກວ່າປົກຕິສຳຫັນກຳເປັນ
ໄກຢ່າງ Roaster, an American class of chicken meat , is widely used at
banquets.

roughage /ຮັຟ-ຟິຈ/ n (Ani.Hus) ອາຫາຮ່າຍນ ທີ່ຈະເປັນອາຫາຮີ່ເຊື່ອໄຟມາກ ແລະ ໄກສະໜີ່ຍ່ອຍ
ໄດ້ຕໍ່າ ເຊັ່ນ ພາງຫ້າວ ຕັ້ນຫ້າວໄຟດ ຕັ້ນຄ້ວ່າແທ້ງ ໜູ້ສັດ ຄ້ວສັດ Good quality roughage is
necessary for milk production.

rumen /รู-เม็น/ n (Ani.Hus) รูเม็น กระเพาะที่หนังของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เป็นกระเพาะที่มีปริมาตรมากที่สุด ใช้สำหรับหมัก ย่อยอาหารชนิดต่าง ๆ โดยมีจุลทรรศน์เป็นตัวช่วย A calf does not have a functional rumen at birth.

ruminate /รู-มิ-เนท/ vi (Ani.Hus) เคี้ยวเอื้อง **ruminant** /รู-มิ-เนนท์/ n สัตว์เคี้ยวเอื้อง พวก วัว ควาย แพะ แกะ เป็นสัตว์ที่มีสักระเพาะ และกินพืชเป็นอาหารหลัก A calf is not a true ruminant at birth. **rumination** /รู-มิ-โน-เริน/ n การเคี้ยวเอื้อง คือ การที่สัตว์พวกวัว ควาย แพะ แกะ สำรองอาหารในกระเพาะออกมาเคี้ยวใหม่ The resting cow begins rumination by chewing the cud.

sausage /เซล-จิจ/ n (Ani.Hus) ไส้กรอก หรือกุนเชียง Ground meat mixed with seasoning is filled in tubing or dried intestines to make sausage.

scour /สคาว-เอก/ n (Ani.Hus) อาการท้องเสีย อาการขี้เหล หรือโรคขี้ขาว มักเป็นเก็บลูกสุกรอย่างถึงสามสี่เดือน เพราขาดธาตุเหล็ก ติดเชื้อ หรืออาหารไม่ดี The principle damage caused by scours is loss of water, sodium and potassium bicarbonate salt from the blood.

scrotum /สคร็อต-เทน/ n (Ani.Hus) ถุงอัณฑะ หนังหุ้มลูกอัณฑะ The scrotum is washed with an antiseptic solution before castration.

secretion /ซี-เคร-เติน/ n (Ani.Hus) การขับหลัง สิ่งที่ร่างกายหรือต่อมขับออกมามilk secretion is governed by hormone prolactin.

semen /ซี-เมิน/ n (Ani.Hus) น้ำเชื้อตัวผู้ ซึ่งมีทั้งน้ำหล่อลื่น อาหาร และตัวอสุจิ In artificial insemination, semen is collected by the use of an artificial vagina.

serum /ซี-เริม/ หรือ /ซี-ยี-เริม/ n (Ani.Hus) ชีรัม ของเหลวสีเหลืองที่แยกชั้นออกจาก
หลังจากที่ปลดอยู่ให้โลหิตتكلิ่ม หรือแข็งตัว Serum samples must be submitted for a final diagnosis.

sheath /ชีท/ n (Ani.Hus) หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศผู้ The bull should not have any imperfections in the sheath which would limit breeding.

silage /ไซ-ลิจ/ n (Ani.Hus) อาหารหมัก หรือหญ้าหมัก ที่ใช้เป็นอาหารขยายสำหรับสัตว์ เด็กๆ เอื้อง Silage and concentrates are generally fed to maintain animal condition during the last month of gestation.

sire /ไซ-ເອຈະ/ n (Ani.Hus) สัตว์พ่อพันธุ์ สัตว์ตัวผู้ที่ใช้กำพันธุ์ One method of sire selection is through performance testing.

sirloin /เซอร์-ล盎/⁴ n (Ani.Hus) เนื้อสัน เนื้อที่อยู่บริเวณโคนกระดูกสันหลัง ทั้งด้านนอก และด้านใน Sirloin is a popular and expensive type of beef.

skinning /สกิน-นิง/ n (Ani.Hus) การถอนหนัง The skinning process is completed by removing the hide on feet and head.

slaughter /ส์ล็อก-เทอะ/ n (Ani.Hus) การฆ่าสัตว์ การฆ่าช้างและ โรงฆ่าสัตว์ The

basic categories in types of animal are breeding and slaughter classes.

v ฆ่าช้างและเพื่อใช้เนื้อเป็นอาหาร cows going away to slaughter

snout /ชนาท/ n (Ani.Hus) จมูกสักร เป็นกล้ามเนื้อแพ็งใช้สำหรับดูดินหรือดูดน้ำเพื่อหาอาหาร

The snout is used to dig the ground and separate food.

sow /សោវ/ n (Ani.Hus) មេស្តករ ស្តករមេដឹងទី The tamworth sow is an excellent mother.

spay /สเปย์/ v (Ani.Hus) ผ่าตัดเอารังไข่ออก Female animals are castrated by spaying.

sphincter /สฟิงค์-เทอ-ร์/ n (Ani.Hus) กล้ามเนื้อหุ้ด กล้ามเนื้อที่บังคับการปิด เปิดของรูหรือช่องเปิดต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื้อที่กวาร เป็นต้น Milk is prevented from leaking from the teat cavity by the action of a sphincter muscle.

spleen /สปเลน/ n (‘Ani.Hus) ม้าม คือ อวัยวะของระบบหมาดเหลืองที่ใหญ่ที่สุด มีหน้าที่กำจัดเนื้อเดี้ดและคงที่เม็ดเลือด A mass of diseased tissue may be found in many organs of birds, such as the heart, spleen and kidney.

stag /สแตก/ n (Ani.Hus) พ่อครัว สัตว์ตัวผู้ ไก่ตัวผู้อายุประมาณ 1 ปี (ยังไม่ต่อน)

A stag can be used for breeding purposes if separated from other males.

(ตรงข้ามกับ dam และ doe)

stall /สตอล/ n (Ani.Hus) คอกสัตว์ ช่อง หรือที่สำหรับให้เลี้ยงสัตว์ Young pigs are given small amounts of creep feed in the farrowing stall at seven to ten days of age.

steer /สเตียร์/ n (Ani.Hus) โคตอน หรือโคชน ซึ่งนิยมตองลูกโคตัวผู้ แล้วนำมานำขึ้นให้อ้วน ก่อนส่งตลาด Handling the steer is the final stage in estimating carcass traits and grades.

sterility /สเตรลิ-ตี-ตี้/ n (Ani.Hus) อาการเป็นแม่น ความไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้ Brucellosis infections can result in sterility in bulls and abortion in cows.

steroid /สเตอ-รอยด์/ n (Ani.Hus) สเตอโรยด์ เป็นสารประกอบที่มีชาตุคาร์บอนจับกันเป็นวง ซึ่งเป็นเอนไซม์ของพากสเตอโรล (sterol) ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง เช่น คอเลสเตอโรล สารสเตอโรยด์เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนเหล่ายชนิด Treatment with steroid therapy and antihistamine injections were attempted.

stillbirth /สติล-เบิร์ท/ n (Ani.Hus) ลูกสัตว์ที่ตายในท้อง ลูกสัตว์ที่ออกมากลางตาย Stillbirth is a clinical sign of disease of adult swine.

strain /สเตรน/ n (Ani.Hus) สายพันธุ์ หรือสายเลือดของสัตว์ There are two strains of leghorn chickens, black and white leghorn.

straw /สเตรอะ/ n (Ani.Hus) ฟางข้าวชนิดต่าง ๆ เช่นหญ้าแห้ง 1 One straw of semen is used per insemination. 2 Rice straw contains low protein and much fibre.

strip	/ชต.ริพ/	v (Ani.Hus) บีบ หรือรื้อออกให้หมด รีดนม	A cow must be thoroughly milked before it is stripped.	stripping	/ชต.ริป-พิง/ n
การบีบหรือรีดนมหายคุณภาพ เพื่อรีดนมให้หมดเกลี้ยง	In milking cows, proper sanitation must be ensured through to stripping.				

stud /สตั๊ด/ n (Ani.Hus) สัตว์ผู้เพี้ยนซึ่งสถานที่เลี้ยงสัตว์ทำพันธุ์ บางที่ใช้คู่กัน farm เป็น stud farm. There are a few stud farms in this country.

stunning /สตั่น-นิŋ/ adj (Ani.Hus) ทำให้สลบ หรือทำให้หมดสติ เช่น การดีทันหรือยิงสตั่น ให้หมดสติก่อนจะเข้าอัดכו Most stunning techniques use captive bullets.

suckle /สัค-เคล/ v (Ani.Hus) “ให้ลูกกินนม” It is unusual for dairy cows to suckle their calves for more than one week. vi คลุน นม วัยรุ่น Older calves,

suckling /สัก-คลิง/ n ลูกสัตว์ที่กำลังดูดนม adj ที่ดูดนม Anemia occurs in pigs during the suckling period.

superovulation /ซู-เพอ-เอกะ-วิ-เล-ดัฟ/ n (Ani.Hus) การตกไข่เกินปกติ การ
ที่มีไข่ตกหลายใน ตามปกติจะมีการใช้ฮอร์โมนบางชนิดเพื่อกระตุ้น และเร่งให้ไข่ตกจากรังไข่
หลая ๆ ใน เพื่อเพิ่มจำนวนของสัตว์พันธุ์ Superovulation is an induced
increase of ova by the use of sex hormones.

supplement /สูป-เพลิ-เมิน/ n (Ani.Hus) อาหารเสริม หรือแหล่งของอาหารเสริม

Fish meal is a good source of protein supplement.

sweat /ซูแบท/ n (Ani.Hus) เหงื่อ ขับเหงื่อ หรือเหงื่อออ ก When temperature rises, the animal sweats to maintain its normal temperature.

swine /ชวีน/ n (pl swine) (Ani.Hus) สุกร ส่วนใหญ่จะใช้ในภาษาเชิง และเป็นคำศัพท์ทางวิชาการ 1 Swine or pigs are one of the major sources of meat in China. 2 Swine breeding can also be carried out through artificial insemination.

symptom /ซิม-เติม/ n (Ani.Hus) อาการของโรค ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงอาการให้เห็นได้ด้วยตา ก็ริยาท่าทาง หรืออุณหภูมิของร่างกาย The most obvious deficiency symptom of calcium is rickets.

syndrome /ซิน-ไดรอม/ n (Ani.Hus) ลักษณะอาการเฉพาะของโรค ซึ่งจะจำเพาะเฉพาะจังหวัด โรคหนึ่ง ๆ Salt deficiency syndrome is shown by poor appetite.

synovitis /ซิโน-ไน-ไก-ทิซ/ n (Ani.Hus) อาการอักเสบของเยื่อหุ้มบริเวณข้อต่อต่าง ๆ Poultry diseases that may cause significant losses are fowl pox, infectious synovitis, and New Castle disease.

tallow /แทล-โล/ n (Ani.Hus) ไขมันดิบ ไขมันจากสัตว์ Tallow is a product of fat that can be used in candle making.

tandem /แทน-เดิม/ adj (Ani.Hus) ที่ลະลักษณะ เช่น การคัดเลือกสัตว์ที่ลະลักษณะ (tandem selection) Three common systems of selection follow tandem selection.

tankage /แทง-ดิจ/ n (Ani.Hus) เลือดผง เลือดป่น และวัสดุเศษเหลือต่าง ๆ จากโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งทำน้ำดื่มไว้ใช้เป็นมีดี หรืออาหารสัตว์ A mixture of soybean meal, tankage and dried milk can provide a high quality supplement premix.

tanning /แทน-นิ่ง/ n, adj (Ani.Hus) การฟอกหนัง In tanning, the heavy hides are soaked for several weeks in tanning solution.

tattoo /แท็ท-ทู/ หรือ /เก็ท-ทู/ n (Ani.Hus) การลัก การทำเครื่องหมายบนตัวสัตว์ เช่น การลักหมาในหู เป็นต้น Vaccinated heifers receive a tattoo in the ear with the date of vaccination.

teat /ทีท/ n (Ani.Hus) หัวนม Milk is prevented from leaking from the teat cavity by the action of the sphincter muscle.

temperament /เทม-เพโคล-เรอ-เมร์ท์/ n (Ani.Hus) อารมณ์ นิสัย หรือลักษณะของสัตว์ ที่แสดงออกมา Good temperament is a distinguishing characteristic of this breed.

tenderloin /เทนเดอร์-ล็อย/ n (Ani.Hus) เนื้อสันใน ซึ่งเป็นเนื้อที่ติดกับกระดูกสันหลัง (ด้านใน) มีคุณภาพดีนุ่ม อร่อย Tenderloin (steak) is very expensive.

tetany /เทท-ເກອະ-นີ/ n (Ani.Hus) ບາດທະຍັກ ໄຣຄຄາງແຮ້ງ Grass tetany is indicated by a nervousness and twitching of the muscles.

thyroid /ໄກ-ຮອຍ/ n (Ani.Hus) ຕ່ອມໄກຮອຍດີ ຕັ້ງອຸໝູດ້ານພໍາຂອງຄວນສອງປຶກ ທຳຫັນໄກ໌ພລິຕ ຮອ້ໄນ້ໄກຮອຍໃຫ້ ເພື່ອຄວບຄຸມກາຣເພາຍລາງວາຫາຮາ ອຸໝູຫຼຸມ ແລະ ເຮັດກາຣຈົງເຕີບໂດຂອງຮ່າງກາຍ Goitre is an enlargement of the thyroid (gland) in the neck.

tick /ທີກ/ n (Ani.Hus) ເພີນ The use of back rubbers and spray keeps down the infestation of ticks , flies , etc.

transmission /ແກຣນທີ-ມີ-ເຕີນ/ n (Ani.Hus) ກາຣຄ່າຍກອດ ກາຣຍ້າຍຈາກທີ່ກີ່ນໄປອັກທີ່ກີ່ນ ເຊັ່ນ ກາຣຄ່າຍກອດຂອງໄຣດ ກາຣນໍາໄຣດ ເປັນເຕັນ The horizontal spread of lymphoid leukosis is a very slow form of transmission.

trichinosis /ທົຣີ-ເຄອະ-ໄນ-ຫີ້ບ/ n (Ani.Hus) ໄຣຄທົຣີໂນຫີ້ບ ຜົ່ງເກີດຈາກເຂົ້າ Trichinella spiralis ເປັນໄຣຄຂອງສັຕິງເລື້ອງລູກດ້ວຍເມ ຕິດຕ່ອົງຄົງຄັ້ງກິນເນັ້ນທີ່ໄປສຸກ ແລະ ມືພຍາມີ Pork should be properly cooked to prevent trichinosis.

trichomoniasis /ທົຣີ-ເຄອະ-ເນອະ-ໄນ-ເຂອະ-ຫີ້ບ/ n (Ani.Hus) ໄຣດີທີ່ເກີດຈາກເຂົ້າໄປຮັດຫັ້ວ (protozoa) ທຳໃຫ້ວ່າຍະເນສເນີຍ ເຊັ່ນ ປຶກມຸລູກອັກເສບ ແລະ ຂອງຄລອດມີຫອອງ ແລະ ທຳໃຫ້ສັຕິງລູກໄຕ Trichomoniasis is a venereal disease spread mechanically by the bull to the cow through normal mating.

trimming /ກຣິມ-ມິງ/ n (Ani.Hus) ກາຣຕກແຕ່ງສັຕິງ Carcass trimming is done before chilling and freezing.

tumour /ทົມ-ເມອະ/ (Am tumor) n (Ani.Hus) เนื้องอก อาการเกิดเนื้อร้ายในร่างกาย

Two tumour diseases , Marek's and lymphoid leukosis , represent the most critical problem in poultry production today.

twinning /ທົວນິຈ/ n (Ani.Hus) การเกิดลูกแฝด กรรมวิธีที่ทำให้เกิดลูกแฝด Induced twinning by some sex hormones will increase the incidence of twins.

typhoid /ໄກ-ຝອຍ໌/ n (Ani.Hus) ໄກໂອຍ໌ ໂຣຄກ້ອງຮ່າງ ລໍາໄສອັກເສນ ແລະ ກຳໄຫ້ຕົບໝາຍໃໝ່ ເກີດຈາກເຊື້ອຫາລຸ ໂມເນລ່າ (salmonella) Signs of fowl typhoid are quite similar to pullorum.

udder /ອັດ-ເຄອະ/ n (Ani.Hus) ເຕ້າແມ The udder increases in size during the interim between milkings.

ulcer /ອັລ-ເຊອະ/ n (Ani.Hus) ແລດຫຸມ ແລດອັກເສນກາຍໃນ ເຊັ່ນ ແລດຫຸມທີ່ກະເພາະແລະ ລໍາໄສ The hard swollen tongue may have ulcers along the edge.

ultrasonic /ອັລ-ເທຣອະ-ເຊົາ-ນິດ/ adj (Ani.Hus) ເລື່ອງສະກັອນເລີກ ເລື່ອງສະກັອນທີ່ເກີດຈາກຄວາມຄືສູງ ໃໃໝ່ໃນອຸປະກິດກວດການຕັ້ງຄරກໍ ຕຽບຄຸນກາພເນື້ອຂອງສັຫວົມຊີວິຕ An ultrasonic device may be used to determine loin-eye area in swine.

up-grading /ອັພ-ເກຣດ-ດິງ/ n (Ani.Hus) ກາຮຜົມຜັນເພື່ອຍກະດັບເລືອດ ເຊັ່ນ ກາຮໃຫ້ພ່ອພົມມື້ງຈາກຕ່າງປະເທດຜົມກັບແມ່ພິນເນື່ອ The technique of up-grading is necessary for tropical livestock improvement.

urine /ยูรีน/ n (Ani.Hus) น้ำสลาย Active organisms may be carried in the urine of infected swine.

uterus /ยูเตอรัส/ n (Ani.Hus) มดลูกของสัตว์ Blood and nerves to the uterus are carried through the supporting broad ligament.

vaccinate /แวกซิเนท/ v (Ani.Hus) ปลูกฟัน ฉีดยาให้ภูมิคุ้มโรคแก่สัตว์ Young birds were vaccinated against Newcastle disease. **vaccine** /แวกซีน/ n สารที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มโรคให้แก่สัตว์ **vaccination** /แวกซิเนชัน/ n การฉีดวัคซีน การปลูกฟัน การสร้างภูมิคุ้มโรคให้แก่สัตว์ Once an outbreak occurs, control is managed through vaccination.

vagina /วาจิโนะ/ n (Ani.Hus) ช่องคลอด An artificial vagina is used to collect semen from the sire.

vein /เวน/ n (Ani.Hus) หลอดเลือดดำ เส้นเลือดดำ Anemia makes the heart beat so hard that a jugular pulse can be seen at the jugular vein.

ventilate /เวนทิเลท/ v (Ani.Hus) ระบายอากาศ Swine houses need to be well ventilated. **ventilation** /เวนทิเลชัน/ n การระบายอากาศ การถ่ายเทอากาศ If the litter is packed wet or gives off a strong ammonia odour, there could be a ventilation problem.

vibriosis /ไบ-บริ-โอ-ซิส/ n (Ani.Hus) โรคไวนิริโอซิสซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทำให้อวัยวะ
เพศเมียอักเสบ และมีหนองอาจทำให้เก้งลูกได้ Vibriosis does not cause problems
in all areas.

villus /วิล-เลิช/ (pl villi) /วิล-ໄล/ n (Ani.Hus) อวัยวะดูดซึมอาหาร The
intestinal wall contains many villi for nutrient absorption.

virus /ไว-เริช/ n (Ani.Hus) เชื้อไวรัส Virus causes many diseases such as
foot-and-mouth disease, hog cholera and tumours.

vulva /วัล-เฟอะ/ n (Ani.Hus) ปากของคลอด Signs of very close parturition
are swelling of the teats and a mucous discharge from the vulva.

wallow /วอล-โล/ n ,v (Ani.Hus) หลุมโคลน หรือบลักก์ที่ใช้สุกรและการปือห้องลงนอนแพะ
ปลัก The swamp buffaloes are fond of wallowing in the mud.

waste /เวท/ n (Ani.Hus) เศษเหลือ ของเสีย วัสดุเศษเหลือต่าง ๆ Agricultural
wastes can be improved and used as animal feeds.

wean /วีน/ v (Ani.Hus) หย่าแม Traditionally , piglets are weaned at eight
weeks. weaning /วีน-นิง/ n การหย่าแม ซึ่งมีทั้งการหย่าแมตามธรรมชาติ และการ
บังคับให้หย่าแมเร็ว ๆ เช่นที่เงินเดือนในสุกร These heifers may be culled, based
on the weaning weight of their first calves.

weanling /วีน-ลิง/ n (Ani.Hus) ลูกสัตว์ที่เพิ่งหย่านม Weanling calves are good gainers because they are growing as well as fattening.

well-groomed /เวล-กรูม/ adj (Ani.Hus) ตัดขนเรียบ , สัตว์ที่ดูแลดี เรียบร้อย สวยงาม ก่อนลงแข่งขัน The dogs should be well-groomed before going to the show.

wether /เวท-เชอะ/ n (Ani.Hus) แกะตัวผู้ ลูกแกะตัวผู้ตอนก่อนที่จะมีอายุเป็นหนุ่ม Wethers are separated from the rest of the flock until they are big enough for the market.

whey /惠/ n (Ani.Hus) พางเนย หรือหางเนยแข็ง ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนจากกระบวนการกำเนยแข็ง Dried whey is a good source of protein for farm animals.

xanthophyll /แชน-เชอะ-ฟิล/ n (Ani.Hus) สารสีเหลืองพากแครอตีนอยด์ (carotenoid) พบในไข่ ใช้เพื่อตัวให้สีแก่ไข่แดง หรือสีเหลืองของหนังไก่ Xanthophyll is a feed additive used to improve egg yolk colour.

xerophthalmia /เซีย-เริฟ-แฟล-เมีย/ n (Ani.Hus) โรคตาไม่น้ำ ซึ่งเกิดจากการขาดวิตามินเอ อายุร่วม ทำให้ตาแห้ง เชื่อมติดและลูกตาติด This pig is deficient in vitamin A and has xerophthalmia.

yearling /เยีย-ลิง/ n (Ani.Hus) ลูกสัตว์ที่มีอายุประมาณหนึ่งปี adj ที่อายุหนึ่งปี Yearling cattle can be successfully kept in the pasture.

yoghurt (Turk) หรือ yoghourt หรือ yogurt /约-胡-เกิท/ n (Ani.Hus) แมเปรี้ยว
เมที่เกิดจากการใส่เชื้อจุลทรรศลงไปเพื่อทำเป็นแมเปรี้ยว Yoghurt was very popular
in India, but it is now available in many countries.

yolk /约-可/ n (Ani.Hus) ไข่นดง The funnel is responsible for picking up
the yolk after it has been ovulated.

zebu /芝-布/ n (Ani.Hus) วัวอินเดีย หรือ วัวแซก เป็นวัวที่มีความสามารถต้านทาน
หลังแคร่น The zebu is famous for heat tolerance and resistant to several
diseases.

zero-grazing /零-葛-景/ n (Ani.Hus) ไม่มีการแทะเล้ม คือ สวนที่ไม่ปล่อยให้สัตว์
ลงไบกินหญ้าในแม่ป่อง แต่จะต้องตัดหญ้านาให้สัตว์กิน A period of zero-grazing is
necessary to stimulate pasture growth and development.