

บทที่ 4

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การศึกษาการเตรียมน้ำมันพريอิมัลซิฟายด์จากโปรตีนถัวเหลืองไอก็อดร่าไลเสทเพื่อประยุกต์ใช้ในไส้กรอกอิมัลชัน มีการศึกษา 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การเตรียมโปรตีนถัวเหลืองไอก็อดร่าไลเสทจากเอนไซม์ป่าเป็น 2) การเตรียมน้ำมันพريอิมัลซิฟายด์จากโปรตีนถัวเหลืองไอก็อดร่าไลเสท และ 3) การประยุกต์ใช้น้ำมันพريอิมัลซิฟายด์ในไส้กรอกอิมัลชัน มีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้

4.1 การศึกษาการเตรียมโปรตีนถัวเหลืองไอก็อดร่าไลเสทด้วยเอนไซม์ป่าเป็น

ศึกษาผลของปริมาณเอนไซม์ร้อยละ 0.2, 0.4 และ 0.6 ของปริมาณโปรตีนถัวเหลืองเข้มข้น และ ระยะเวลาในการย่อยโปรตีนถัวเหลืองที่ 30, 40 และ 50 นาที เปรียบเทียบกับโปรตีนที่ไม่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ (ชุดควบคุม) โปรตีนถัวเหลืองเข้มข้นที่นำมาใช้ในการศึกษามีปริมาณโปรตีนและความชื้นร้อยละ 72.92 และ 5.14 ตามลำดับ โปรตีนถัวเหลืองไอก็อดร่าไลเสทที่เตรียมได้สำเร็จมีโครงสร้างที่มีความคงทนและมีความสามารถในการรักษาโครงสร้างที่ดี สามารถลดการแตกหักของโปรตีนที่พิเศษต่างๆ ในช่วงพีเอช 3-11 ส่วนที่ไม่สามารถดูดซึมน้ำที่ผิวน้ำของโปรตีน (surface hydrophobicity) และสมบัติการเป็นอิมัลซิฟายอิง (emulsifying properties) โดยวัดค่าดัชนีความสามารถในการเกิดอิมัลชัน (Emulsifying Activity Index, EAI) และดัชนีความคงตัวของอิมัลชัน (Emulsion Stability Index, ESI)

4.1.1 การละลายของโปรตีนถัวเหลืองในช่วงพีเอช 3-11

การวิเคราะห์สมบัติการละลายของโปรตีนที่พีเอช 3, 5, 7, 9 และ 11 ตามวิธีของ Wu *et al.* (1998) ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 6 จะเห็นว่าที่พีเอชเท่ากับ 3 และ 5 หรือ พีเอชใกล้เคียงค่าพีไอของโปรตีนถัวเหลือง (พีเอช 4.5) การละลายของโปรตีนถัวเหลืองที่ไม่ผ่านการย่อยหรือชุดควบคุมมีการละลายต่ำที่สุด และเมื่อมีการย่อยโปรตีนถัวเหลืองด้วยเอนไซม์เพิ่มขึ้นมีผลให้การละลายของโปรตีนเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากช่วงพีเอชใกล้เคียงค่าพีไอ โปรตีนถัวเหลืองปกติที่ไม่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์จะมีประจุรวมของโปรตีนเท่ากับศูนย์ จึงทำให้การละลายของโปรตีนต่ำส่วนโปรตีนที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ ทำให้เกิดการคลื่อออกของโมเลกุลโปรตีน หมุนเวียนที่มีข้าว

บางหมู่ที่ถูกฝังอยู่เกิดการคลื่อออก ผิวน้ำของโนเมเลกุล โปรดีนจึงแสดงหมู่อะมิโนที่มีข้ามมากขึ้น (Sikorski, 2001) ทำให้ค่าพีไอของโปรดีนเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่พีอีชประมาณพีไอ โปรดีนจึงมีการละลายมากกว่าโปรดีนปกติ เมื่อพีอีชเพิ่มขึ้น พบว่า การละลายของโปรดีนที่ไม่ผ่านการย่อย หรือชุดควบคุมมีการละลายมากกว่าโปรดีนถัวเหลือง ไฮโดรไลสต์ อาจเนื่องมาจากโปรดีนถัวเหลืองปกติมีส่วนที่มีประจุบันพื้นผิวของโปรดีนมากกว่าโปรดีนถัวเหลือง ไฮโดรไลสต์ เนื่องจากเมื่อโปรดีนผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ นอกจากจะเกิดหมู่อะมิโนที่มีประจุบันผิวของโปรดีน ยังเกิดหมู่อะมิโนที่ไม่มีประจุเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อเกิดหมู่ที่ไม่มีประจุมากขึ้นการละลายของโปรดีนจึงลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Tsumura et al. (2005) ที่พบว่าเมื่อพีอีชใกล้เคียงค่าพีไอ (4.5) การละลายของโปรดีนถัวเหลืองที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ปานีค่ามากกว่าชุดควบคุมหรือโปรดีนที่ไม่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ และเมื่อพีอีชเพิ่มขึ้น การละลายของโปรดีนที่ไม่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์สูงกว่าโปรดีนถัวเหลืองที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์

ตารางที่ 6 การละลายของโปรตีนถั่วเหลืองไฮโดรไลส์ที่พิbezแทกต่างกัน

pH	เวลาในการย่อย (นาที)	Control	การละลาย (%)		
			ปริมาณเอนไซม์		
			0.2% ของ SPC	0.4% ของ SPC	0.6% ของ SPC
3	30		17.12±0.40 ^w	23.72±0.57 ^r	21.26±0.13 st
	40	17.46±0.17 ^{vw}	20.1±0.36 ^{tu}	24.5±0.54 ^r	21.66±0.20 ^s
	50		18.71±0.28 ^{uv}	22.39±0.36 ^s	22.1±0.79 ^s
	30		13.72±0.12 ^y	19.28±0.43 ^u	19.77±0.14 ^u
	40	13.88±0.25 ^{xy}	15.07±0.35 ^{xy}	19.74±0.20 ^u	21.17±1.10 st
	50		15.15±0.37 ^x	19.01±0.98 ^u	23.85±0.12 ^r
	30		28.22±0.16 ^{no}	29.42±0.71 ^{mn}	26.03±0.35 ^q
	40	51.42±0.25 ^g	28.87±0.12 ^{mno}	30.07±0.39 ^m	26.45±0.40 ^{pq}
	50		28.48±0.31 ^{no}	28.97±0.08 ^{mno}	27.67±0.24 ^{op}
5	30		34.46±0.77 ^{jk}	32.97±0.13 ^l	36.82±0.69 ^h
	40	63.56±0.29 ^e	35.79±0.31 ^{hij}	34.38±0.37 ^k	36.43±0.58 ^h
	50		34.77±0.46 ^{ijk}	33.44±0.87 ^{kl}	36.04±0.33 ^{hi}
	30		63.88±0.70 ^e	63.37±0.69 ^e	67.3±0.98 ^c
11	40	143.01±2.18 ^a	66.16±0.86 ^{cd}	65.75±0.80 ^d	71.37±1.81 ^b
	50		65.54±1.81 ^d	61.85±0.73 ^f	72.13±2.85 ^b

a-y : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งและแนวโนนที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p<0.05$)

4.1.2 ส่วนที่ไม่ละลายน้ำที่ผิวน้ำของโปรตีน (surface hydrophobicity)

การวิเคราะห์ส่วนที่ไม่ละลายน้ำที่ผิวน้ำของโปรตีนตามวิธีของ Wu *et al.* (1998) ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 7 จะเห็นว่าโปรตีนที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ปานมีค่า surface hydrophobicity เพิ่มขึ้นจากโปรตีนที่ไม่ผ่านการย่อย (10.01) โดยโปรตีนที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ปานร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักของโปรตีนถ้วนเหลือเช่นเดิม เป็นเวลา 40 นาที มี degree of hydrolysis เท่ากับร้อยละ 7.25 มีค่า surface hydrophobicity สูงที่สุด (12.54) เนื่องจากในโมเลกุลของโปรตีนธรรมชาติจะมีกลุ่มกรดอะมิโนที่ไม่มีชี้ว้า (hydrophobic group) ฝังตัวอยู่ในโครงสร้างของโปรตีนที่พันอยู่และเมื่อโปรตีนถูกย่อยด้วยเอนไซม์บางส่วน ทำให้เกิดการคลื่อออกของโมเลกุลโปรตีนไม่ใช่แค่กลุ่มอะมิโนที่มีชี้ว้าเท่านั้น แต่จะเกิดการคลื่อออกของกลุ่มอะมิโนที่ไม่มีชี้ว้าด้วย ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสมบัติ hydrophobicity ที่ผิวน้ำของโปรตีน (Wu *et al.*, 1998) แต่เมื่อมีการย่อยโปรตีนมากขึ้นเรื่อยๆ พบร่วมกับ hydrophobicity ที่ผิวน้ำของโปรตีนลดลง เนื่องจากการย่อยด้วยเอนไซม์ที่มากขึ้น ทำให้เกิด peptide ที่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่ง peptide ที่มีขนาดเล็กกว่าจะมีสมบัติ hydrophobic น้อยกว่า peptide ที่มีขนาดใหญ่กว่า (Ortiz and Wagner, 2002) ซึ่งบ่งชี้ว่า สมบัติ hydrophobicity ที่ผิวน้ำของโปรตีนสามารถลดลงได้ ถ้ามีการย่อยด้วยเอนไซม์มากเกินไป ลดคลื่องกับผลการศึกษาของ Wu *et al.* (1998) ซึ่งศึกษาการย่อยโดยโปรตีนถ้วนเหลือด้วยเอนไซม์ปานเป็นเวลา 10, 30 และ 60 นาที พบร่วมกับการย่อยโดยโปรตีนถ้วนเพิ่มขึ้น แต่เมื่อย่อยโดยโปรตีนเป็นเวลา 60 นาที ทำให้ hydrophobicity ที่ผิวน้ำของโปรตีนถ้วนเหลือเพิ่มขึ้น แต่เมื่อย่อยโดยโปรตีนเป็นเวลา 60 นาที ทำให้ hydrophobicity ที่ผิวน้ำของโปรตีนลดลง

ตารางที่ 7 ส่วนที่ไม่ละลายนำ้ที่ผิวน้ำ (surface hydrophobicity, S_0) ของโปรตีนถั่วเหลืองที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ป่าเป่น

ปริมาณเอนไซม์	เวลาในการย่อย (นาที)	S_0
control		10.01 ± 0.58^b
0.2 % ของ SPC	30	10.29 ± 1.16^b
	40	12.54 ± 0.64^a
0.4 % ของ SPC	50	12.20 ± 0.63^a
	30	8.80 ± 0.18^c
0.6 % ของ SPC	40	8.27 ± 0.31^{cd}
	50	7.63 ± 0.15^{de}
0.8 % ของ SPC	30	7.32 ± 0.15^{de}
	40	6.72 ± 0.41^{ef}
	50	6.17 ± 0.27^f

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p<0.05$)

4.1.3 สมบัติการเป็นอิมัลซิฟายอิง (emulsifying properties)

การวิเคราะห์สมบัติการเป็นอิมัลซิฟายอิงของโปรตีนถั่วเหลืองไฮโครไอลເສຖ ໂດຍວັດຄ່າດັ່ງນີ້ຄວາມສາມາດໃນການເກີດອິມັລຊັນ (Emulsifying Activity Index, EAI) ແລະ ດັ່ງນີ້ຄວາມຄອງຕ້ວຂອງອິມັລຊັນ (Emulsion Stability Index, ESI) ດ້ວຍວິທີຂອງ Pearce and Kinsella (1979) ພັດກາຣທົດລອງຄ່າດັ່ງນີ້ຄວາມສາມາດໃນການເກີດອິມັລຊັນ ດັ່ງແສດງໃນตารางที่ 8 ພວຍວ່າ ດັ່ງນີ້ຄວາມສາມາດໃນການເກີດອິມັລຊັນຂອງโปรตੀນถั่วเหลืองທີ່ຜ່ານການຍ່ອຍດ້ວຍເອນໄຊມໍາປາເປັນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກໂປຣຕິນທີ່ໄມ່ຜ່ານການຍ່ອຍ (4.26 m^2/g) ໂດຍໂປຣຕິນທີ່ຜ່ານການຍ່ອຍດ້ວຍເອນໄຊມໍາປາເປັນຮ້ອຍລະ 0.2 ໂດຍນໍາຫຼັກຂອງໂປຣຕິນຄ້າດັ່ງເລື່ອນັ້ນ ເປັນເວລາ 40 ນາທີ ມີ degree of hydrolysis ເຖິງກັບຮ້ອຍລະ 7.25 ມີຄ່າດັ່ງນີ້ຄວາມສາມາດໃນການເກີດອິມັລຊັນສູງທີ່ສຸດ (4.95 m^2/g) ໂດຍເນື່ອມືກາຍ່ອຍໂປຣຕິນມາກຂຶ້ນເຮືອຍໆ ພວຍວ່າ ດັ່ງນີ້ຄວາມສາມາດໃນການເກີດອິມັລຊັນຂອງໂປຣຕິນມີຄ່າດັ່ງນີ້ ອາຈານເປັນພລຈາກເນື້ອໂປຣຕິນຄູກຍ່ອຍດ້ວຍເອນໄຊມໍາປາເປັນທີ່ເກີດກາຮັດລົງ ອາຈານເປັນພລຈາກເນື້ອໂປຣຕິນຄູກຍ່ອຍດ້ວຍເອນໄຊມໍາປາເປັນທີ່ເກີດກາຮັດລົງ ກຣດອະມິໂນທີ່ມີປະຈຸແລະໄມ່ມີປະຈຸທີ່ໜ່ອນອູ້ໃນໂຄຮງສ້າງຂອງໂປຣຕິນເກີດຂຶ້ນທີ່ຜົວຂອງໂປຣຕິນມາກຂຶ້ນທີ່ມີປະຈຸທີ່ໄດ້ນຳມັນໄດ້ນຳມັນ ຈຶ່ງທີ່ມີປະຈຸທີ່ໂປຣຕິນມີຄວາມສາມາດໃນການເກີດອິມັລຊັນນາງຂຶ້ນ ແຕ່ເນື່ອໂປຣຕິນມີ

การย่อยมากขึ้นเรื่อยๆ ความสามารถในการเกิดอิมัลชันของโปรตีนลดลง อาจเนื่องมาจาก เมื่อโปรตีนมีการย่อยมากขึ้นหรือมากเกินไป ทำให้โปรตีนถูกย่อยให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง เมื่อโปรตีนมีขนาดเล็กลง ทำให้โปรตีนแสดงความมีประจุมากขึ้นและส่งผลให้สมบัติส่วนที่ไม่มีประจุของโปรตีนลดลง โปรตีนจับน้ำมันได้น้อยลง โปรตีนจึงมีความสามารถในการเกิดอิมัลชันลดลง ผลของค่าดัชนีความสามารถในการเกิดอิมัลชันนี้สอดคล้องกับการทดลองของ Wu *et al.* (1998) ซึ่งได้ศึกษาความสามารถในการเกิดอิมัลชันของโปรตีนถ่วงเหลืองที่ผ่านการย่อยด้วยเย็น ไซม์ปานเปนที่เวลาต่างๆ พบร่วง โปรตีนที่ผ่านการย่อยด้วยเย็น ไซม์ปานร้อยละ 0.1 ของปริมาณโปรตีนถ่วงเหลือง มีค่าดัชนีความสามารถในการเกิดอิมัลชันเพิ่มขึ้นจากโปรตีนที่ไม่ผ่านการย่อย ($p<0.05$) และเมื่อโปรตีนมีการย่อยมากเกินไป จะทำให้ค่าดัชนีความสามารถในการเกิดอิมัลชันของโปรตีนมีค่าลดลง

ตารางที่ 8 ค่าดัชนีความสามารถในการเกิดอิมัลชัน (Emulsifying activity index, EAI) ของโปรตีนถ่วงเหลืองไซม์ปานและที่ผ่านการย่อยด้วยเย็น ไซม์ปานเปน

ปริมาณเย็น ไซม์	เวลาในการย่อย (นาที)	EAI (m^2/g)
control		4.26 ± 0.11^c
0.2 % ของ SPC	30	4.15 ± 0.16^c
	40	4.95 ± 0.04^a
	50	4.63 ± 0.06^b
0.4 % ของ SPC	30	2.37 ± 0.04^d
	40	2.19 ± 0.06^e
	50	2.05 ± 0.03^f
0.6 % ของ SPC	30	1.78 ± 0.03^g
	40	1.54 ± 0.02^h
	50	1.36 ± 0.01^i

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p<0.05$)

ส่วนผลการทดลองค่าดัชนีความคงตัวของอิมัลชันดังแสดงในตารางที่ 9 พบว่า การย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์ปานเป็นยิ่งมากขึ้น ทำให้ค่าดัชนีความคงตัวของอิมัลชันเพิ่มขึ้น อาจเนื่องจากเมื่อโปรตีนถูกย่อยมากขึ้น โปรตีนจะเกิดอิมัลชันได้น้อยลงแต่อิมัลชันที่เกิดมีความคงตัวมาก เมื่อเวลาผ่านไปจึงทำให้เกิดการแยกชั้นน้ำอยู่ ซึ่งมีค่าดัชนีความคงตัวของอิมัลชันสูง แต่เมื่อเทียบความสามารถในการเกิดอิมัลชันเมื่อเวลาผ่านไปเท่าๆกัน พบว่าความสามารถในการเกิดอิมัลชันของโปรตีนที่ถูกย่อยเพียงเล็กน้อยยังมีความสามารถในการเกิดอิมัลชันสูงกว่าโปรตีนที่ผ่านการย่อยในปริมาณมาก ผลของค่าดัชนีความคงตัวของอิมัลชันนี้มีความสอดคล้องกับรายงานของ Wu *et al.* (1996) คือ โปรตีนที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์มีค่าความคงตัวของอิมัลชันสูงกว่าโปรตีนที่ไม่ผ่านการย่อย แต่ความสามารถคงตัวของอิมัลชันของโปรตีนถ่วงเหลืองไฮโดรไลสेथที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์แต่ละระดับไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งมีความขัดแย้งกับผลการทดลองที่เกิดขึ้น คือ โปรตีนถ่วงเหลืองไฮโดรไลสेथที่ใช้เอนไซม์ และเวลาในการย่อยมากขึ้น ความคงตัวของอิมัลชันของโปรตีนถ่วงเหลืองไฮโดรไลส์จะเพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจาก การเตรียมตัวอย่าง โปรตีนถ่วงเหลืองไฮโดรไลส์ของ Wu *et al.* (1996) มีการปรับพีเอชเท่ากับ 10 และบ่มที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งเบร่ย่าที่ความเร็วรอบ 120 rpm เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนที่จะนำไปย่อยด้วยเอนไซม์ปานเป็น จึงทำให้โปรตีนเกิดการเสียสภาพและคลายเกลียวของโมเลกุล โปรตีน โปรตีนจึงเกิดการกระจายตัว ดี เมื่อนำมา>y ย่อยด้วยเอนไซม์ เอนไซม์จึงสามารถย่อยโปรตีนได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าที่ระดับการย่อยใดๆ ทำให้พื้นที่หรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของโปรตีนมีลักษณะเดียวกัน ความคงตัวของโปรตีนถ่วงเหลืองไฮโดรไลส์จึงมีค่าไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 9 ดัชนีความคงตัวของอิมลชัน (Emulsion Stability Index, ESI) ของซอฟต์โปรดีนไอก็อดร่า ไลส์ทที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ปานเปน

ปริมาณเอนไซม์	เวลาในการย่อย (นาที)	ESI (min)
control	0	17.99±0.26 ^g
	30	25.47±1.35 ^f
0.2 % of SPC	40	28.3±0.27 ^f
	50	34.27±0.98 ^e
0.4 % of SPC	30	48.66±4.80 ^d
	40	50.46±2.22 ^d
0.6 % of SPC	50	60.62±1.53 ^c
	30	79.17±1.69 ^b
0.8 % of SPC	40	80.77±2.12 ^b
	50	93.72±2.29 ^a

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p<0.05$)

ดังนั้น ชุดการทดลองที่เหมาะสมในการเตรียมโปรดีนถ้วนเหลืองไอก็อดร่า ไลส์ทเพื่อใช้ในการศึกษาการเตรียมน้ำมันพรีอิมลชิฟายด์ในขั้นตอนต่อไป คือ ชุดการทดลองที่มีการย่อยโปรดีนถ้วนเหลืองโดยไอนไซม์ปานเปนร้อยละ 0.2 โดยนำหนักของโปรดีนถ้วนเหลืองเข้มข้น ย่อยเป็นเวลา 40 นาที เนื่องจากชุดการทดลองดังกล่าวมีความสามารถในการเกิดอิมลชันสูงที่สุด ($p<0.05$) และมีความคงตัวมากกว่าชุดควบคุม ($p<0.05$)

4.2 การศึกษาการเตรียมน้ำมันพรีอิมลชิฟายด์โดยใช้โปรดีนถ้วนเหลืองไอก็อดร่า ไลส์ท

ศึกษาผลของปริมาณโปรดีนถ้วนเหลืองไอก็อดร่า ไลส์ทร้อยละ 3-5 โดยนำหนักปริมาณน้ำมันร้อยละ 50-58 โดยนำหนัก และปริมาณการจีแนร์ร้อยละ 0-2 โดยนำหนัก โดยวางแผนการทดลองแบบ central composite design (CCD) มีการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำมันพรีอิมลชิฟายด์ คือ ความสามารถในการทำให้เกิดอิมลชัน (emulsion capacity) และความคงตัวของอิมลชัน (emulsion stability) โดยวัดค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมา (total expressible fluid, TEF) และลักษณะเนื้อสัมผัส โดยวัดค่าความแข็ง (hardness) ด้วยเครื่อง Texture Analyzer


รายละเอียดของผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 10 พบว่าสัดส่วนที่เหมาะสมในการเตรียมน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ คือ ใช้โปรตีนถั่วเหลืองไอกโดยสารร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก ปริมาณน้ำมันร้อยละ 58 โดยน้ำหนัก และปริมาณคาร์บอนร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก เนื่องจากเป็นชุดการทดลองที่มีปริมาณน้ำมันสูงที่สุด ได้ค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมาเริ่มต้น 0 และค่าความแข็ง เท่ากับ 1.43 นิวตัน ซึ่งจากการทดลองเบื้องต้น พบว่า ในการเตรียมน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเตรียมไส้กรอกอิมัลชันต้องให้มีปริมาณน้ำมันสูงที่สุด เนื่องจากปริมาณน้ำมันในน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์มีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของไส้กรอก ถ้ามีปริมาณน้ำมันน้อยจะทำให้ไส้กรอกมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แห้ง กระด้าง จึงต้องเลือกชุดการทดลองที่มีปริมาณน้ำมันสูงที่สุดในการเตรียมน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์เพื่อใช้ในการเตรียมไส้กรอกอิมัลชัน

ตารางที่ 10 ผลของปริมาณโปรตีน ไขมัน และคาราจีแนน ต่อปริมาณของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมา (TEF) และค่าความแข็งของน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์

Design point	X1:protein (%)	X2:oil (%)	X3:carageenan (%)	Y1:TEF (%)	Y2:hardness (N)
1	4.6	56.4	1.6	0	1.45
2	4.6	56.4	0.4	1.31	1.43
3	4.6	51.6	1.6	0	1.43
4	4.6	51.6	0.4	1.22	1.44
5	3.4	56.4	1.6	0	1.43
6	3.4	56.4	0.4	3.37	1.43
7	3.4	51.6	1.6	0	1.40
8	3.4	51.6	0.4	3.92	1.42
9	5	54	1	0	1.43
10	3	54	1	1.98	1.42
11	4	58	1	0	1.43
12	4	50	1	1.00	1.44
13	4	54	2	0	1.42
14	4	54	0	6.34	0.91
15	4	54	1	0.98	1.41
16	4	54	1	0.98	1.42

4.2.1 ผลของปริมาณโปรตีนถ้วนเหลืองไอกอโรไลเสท ปริมาณน้ำมัน และปริมาณการเจียนต่อค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมา (total expressible fluid, TEF) ของน้ำมันพรีอิมลซิฟายด์


เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโปรตีนและปริมาณน้ำมันต่อค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมาดังแสดงในรูปที่ 9 พบว่า ที่ปริมาณน้ำมันระดับต่างๆ เมื่อโปรตีนเพิ่มขึ้นค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมามีค่าลดลง เนื่องจากเมื่อปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้น ทำให้มีการเพิ่มของหมู่ที่มีประจุและไม่มีประจุมากขึ้น โปรตีนจึงสามารถจับน้ำและน้ำมันได้มากขึ้น และทำให้เกิดโครงสร้างทางเคมีของเจลโปรตีนถ้วนเหลืองในโครงสร้างของน้ำมันพรีอิมลซิฟายด์เพิ่มมากขึ้น (Renkenma, 2001) จึงทำให้ค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมามีค่าเป็นส่วนของน้ำมันและน้ำมีค่าลดลง



รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีนและน้ำมันต่อค่า Total expressible fluid (TEF)


เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโปรตีนและปริมาณการเจียนต่อค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมาดังแสดงในรูปที่ 10 พบว่า เมื่อโปรตีนและการเจียนเพิ่มขึ้น ค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมามีค่าลดลง เนื่องจากเมื่อโปรตีนเพิ่มขึ้นทำให้มีหมู่ที่มีประจุและไม่มีประจุเพิ่มขึ้น จึงทำให้โปรตีนมีความสามารถในการจับน้ำและน้ำมันมากขึ้น ค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมามีค่าลดลง และเมื่อมีปริมาณการเจียนมากขึ้น การเจียนมีผลให้ความหนืดของ

อิมัลชันเพิ่มขึ้นทำให้ไปปัดขาวางการรวมตัวกันของเม็ดไขมัน และเนื่องจากการจีแนน มีโครงสร้างที่มีประจุ カラจีแนน จึงสามารถช่วยในการจับน้ำของระบบอิมัลชันได้ ทำให้อิมัลชันมีความคงตัวมากขึ้น ค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมายังมีค่าลดลง ซึ่งผลของการคงตัวของอิมัลชันเนื่องจากผลของการจีแนนสอดคล้องกับงานวิจัยของ Harnsilawat (2006) ที่รายงานว่า การเติมการจีแนนยิ่งมากขึ้นจะทำให้ระบบอิมัลชันมีความคงตัวมากขึ้น นอกจากนี้ カラจีแนนสามารถเกิดอันตรกิริยา กับโปรตีนได้ ทั้งนี้ขึ้นกับจำนวนและตำแหน่งของหมู่ชัลเฟต ปริมาณ 3,6-แอนไฮดรอ-กาแลคโตส และ isoelectric point ของโปรตีน ถ้าสารละลายโปรตีนมีค่าต่ำกว่าค่า isoelectric point มีผลทำให้โปรตีนมีประจุเป็นบวก ส่วนカラจีแนนไม่มีค่า isoelectric point และมีประจุเป็นลบ จึงทำให้สามารถเกิดอันตรกิริยาระหว่างกันได้เป็นโปรตีนカラจีแนท (protein carrageenate) (Baeza *et al.*, 2002) จึงทำให้ระบบอิมัลชันมีความคงตัวมากขึ้น



รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีนและการจีแนนต่อค่า Total expressible fluid (TEF)


เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำมันและปริมาณการเจลแคนด์ต่อค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมาดังแสดงในรูปที่ 11 พบว่า ที่ปริมาณน้ำมันระดับต่างๆ เมื่อปริมาณการเจลแคนด์เพิ่มขึ้น ค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมามีค่าลดลง เนื่องจากค่าเจลแคนด์มีผลให้ความหนืดของอิมัลชันเพิ่มขึ้นทำให้ไปขัดขวางการรวมตัวกันของเม็ดไขมัน และการเจลแคนด์สามารถช่วยในการจับน้ำของระบบอิมัลชันได้ เนื่องจากในโครงสร้างของการเจลแคนด์มีหมู่ชัลเฟตซึ่งเป็นหมู่ที่มีประจุลบ สามารถจับกับประจุบวกของน้ำได้ดี ซึ่งปริมาณหมู่ชัลเฟตจะเป็นอิทธิพลหลักในการจับน้ำของเจลแคนด์ นอกจากนี้ การเจลแคนด์มีหมู่ที่มีประจุบวกหลักๆ คือ โซเดียม โภแตสเซียม แคคลเซียม และแมกนีเซียม ซึ่งสามารถจับกับประจุลบของน้ำได้ ส่วนประจุอื่นๆ สามารถเกิดปฏิกิริยากับน้ำได้เป็นส่วนน้อย (Campo *et al.*, 2009) ดังนั้น อิมัลชันที่มีการเติมเจลแคนด์จึงมีความคงตัวมากขึ้น ส่งผลให้ค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมามีค่าลดลง



รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำมันและการเจลแคนด์ต่อค่า Total expressible fluid (TEF)


4.2.2 ผลของปริมาณโปรตีนถ่วงเหลืองไอกอโรไลสेथ ปริมาณน้ำมัน และปริมาณカラจีแนน ต่อค่าความแข็ง (hardness) ของน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโปรตีนและปริมาณน้ำมันต่อค่าความแข็งของน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ ดังแสดงในรูปที่ 12 พบว่า เมื่อโปรตีนน้อยกว่าหรือมากกว่าร้อยละ 4 และปริมาณน้ำมันน้อยกว่าหรือมากกว่าร้อยละ 54 ค่าความแข็งที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจากการลดลงในช่วงดังกล่าว มีการจีแนนผสมอยู่ด้วย จึงอาจจะเป็นผลจากカラจีแนนที่ทำให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น แต่ที่โปรตีนร้อยละ 4 มีบางชุดการทดลองที่ไม่ได้เติมカラจีแนนเมื่อประมาณผลแสดงเป็นภาพ response surface โดยโปรแกรม JMP จึงมีลักษณะที่มีค่าความแข็งต่ำ ทั้งนี้ เนื่องจาก การออกแบบการทดลองแบบ central composite design จากการทดลองของ Youssef and Barbut (2009) ได้ศึกษาผลของปริมาณโปรตีนต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เนื้ออิมัลชัน พบว่า เมื่อมีปริมาณโปรตีนมากขึ้นทำให้ค่าความแข็ง (hardness) ของผลิตภัณฑ์มากขึ้น เนื่องจากเมื่อโปรตีนมากขึ้น ปริมาณหมุ่ที่มีประจุและไม่มีประจุของโปรตีนมากขึ้น ทำให้โปรตีนสามารถจับน้ำและน้ำมันได้มาก และทำให้เกิดโครงสร้างร่างกายของเจล โปรตีนถ่วงเหลืองในโครงสร้างของอิมัลชันเพิ่มขึ้น อิมัลชันจึงมีความแข็งเพิ่มขึ้น




รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีนและน้ำมันต่อค่าความแข็ง (hardness)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ โปรตีนและปริมาณ卡拉จีแนนต่อค่าความแข็งของน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ ดังแสดงในรูปที่ 13 พนว่า ที่โปรตีนมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 4 และที่卡拉จีแนนประมาณร้อยละ 1 ค่าความแข็งมีค่ามากขึ้น เนื่องจากเมื่อ卡拉จีแนนเพิ่มขึ้นทำให้ความหนืดของอิมัลชันเพิ่มขึ้น ค่าความแข็งจึงมีค่าเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเติม卡拉จีแนนมากกว่า ร้อยละ 1 พนว่าค่าความแข็งมีค่าลดลง อาจเนื่องมาจากเมื่อมี卡拉จีแนนมากเกินไป ทำให้อิมัลชันที่ได้มีความแข็งมากจนเปราะแตกหักง่าย จึงทำให้ค่าความแข็งหรือแรงด้านของอิมัลชันที่ได้มีค่าลดลง ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับการทดลองของ Cierach *et al.* (2009) ซึ่งได้ศึกษาผลของการจีแนนในช่วงร้อยละ 0-0.7 ต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์อิมัลชัน พนว่าเมื่อเติม卡拉จีแนนยิ่งมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความแข็ง (hardness) มากขึ้น



รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ของปริมาณ โปรตีนและ卡拉จีแนนต่อค่าความแข็ง (hardness)

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำมันและปริมาณカラเจ็นน์ต่อค่าความแข็ง พบว่า ที่น้ำมันน้อยกว่าหรือมากกว่า 54 และที่カラเจ็นน์ประมาณร้อยละ 1 ค่าความแข็งมีค่ามากขึ้นดังแสดงในรูปที่ 14 ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับข้างต้น




รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำมันและการเจ็นน์ต่อค่าความแข็ง (hardness)


4.2.3 ผลของปริมาณโปรตีนถัวเหลืองไฮโดรไลเสท ปริมาณน้ำมัน และปริมาณカラเจ็นน์ต่อความคงตัวของอิมัลชัน โดยวัดจากของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมา (total expressible fluid, TEF) ของน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์

จากการวิเคราะห์ความคงตัวของอิมัลชันของน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์โดยการวิเคราะห์ปริมาณของเหลวทั้งหมดที่ออกมา (total expressible fluid, TEF) จากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่ระยะเวลา 0, 5, 10 และ 15 วันตามลำดับ โดยแสดงผลเป็นร้อยละของปริมาณของเหลวที่แยกตัวออกมาน้ำมันที่ตัวอย่างมีค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมามากสูงแสดงว่าตัวอย่างมีความคงตัวของอิมัลชันต่ำ ดังแสดงในตารางที่ 11 และรูปที่ 15-17 พบว่า ระยะเวลาและปริมาณของส่วนผสมส่งผลกระทบต่อความคงตัวของอิมัลชัน (emulsion stability) ซึ่งประเมินได้จากปริมาณของเหลวทั้งหมดที่


แยกออกมา (total expressible fluid, TEF) โดยพบว่า ระยะเวลาจะแปรผันตรงกับปริมาณของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมา คือ เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งนานขึ้น ค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมามีค่าสูงขึ้น แสดงว่าอิมลชันมีความคงตัวลดลง เนื่องจากหยดน้ำมันและน้ำที่กระจายตัวในระบบอิมลชันมีแรงดึงดูดระหว่างผิว ถ้าอิมลชันที่มีความคงตัวต่ำเมื่อเวลาผ่านไปทำให้หยดน้ำมันและน้ำเกิดการรวมตัวกันและแยกออกจากระบบอิมลชันยิ่งมากขึ้น (ปาริพัตร, 2545) จึงทำให้ของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมามีค่าสูงขึ้น ส่วนปริมาณโปรตีนและการเจลลนที่ใช้จะแปรผันกับปริมาณของเหลวที่แยกออกมาจากน้ำมันพร้อมอิมลชิฟายด์ โดยชุดการทดลองที่เหมาะสมในการเตรียมน้ำมันพร้อมอิมลชิฟายด์ คือ ใช้โปรตีนถ้วนหนึ่งไฮโดรไลสทร็อกซ์ 4 โดยน้ำหนัก ปริมาณน้ำมันร้อยละ 58 โดยน้ำหนัก และปริมาณการเจลลนร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก เนื่องจากเป็นชุดการทดลองที่มีปริมาณน้ำมันสูงที่สุด และมีความคงตัวสูง ซึ่งจะได้ค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมานานวันที่ 0, 5 และ 10 ร้อยละ 0 ส่วนวันที่ 15 ของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมาร้อยละ 0.71 ซึ่งเป็นค่าที่น้อยมาก ส่วนชุดการทดลองที่มีของเหลวแยกออกมามาก เนื้อ PEF มีลักษณะที่นิ่มเหลว มีความคงตัวต่ำ คือ PEF ที่เตรียมจากโปรตีนไฮโดรไลสทร์จากถ้วนหนึ่งร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก น้ำมันเมล็ดทานตะวันร้อยละ 54 โดยน้ำหนัก และไม่มีการเติมการเจลลน ซึ่งจะมีของเหลวแยกออกมานานวันที่ 0, 5, 10 และ 15 ร้อยละ 6.34, 7.00, 7.15 และ 7.17 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ



รูปที่ 15 ความถ้วนพันธุ์ของปริมาณโปรตีนกับน้ำมัน ปริมาณโปรตีนกับการเจลแลน และปริมาณน้ำมัน กับการเจลแลนต่อค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมา (total expressible fluid, TEF) ในวันที่ 5



รูปที่ 16 ความถ้วนพันธุ์ของปริมาณโปรตีนกับน้ำมัน ปริมาณโปรตีนกับการเจลเคน และปริมาณน้ำมันกับการเจลเคนต่อค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมา (total expressible fluid, TEF) ในวันที่ 10




รูปที่ 17 ความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีนกับน้ำมัน ปริมาณโปรตีนกับการเจลแลน และปริมาณน้ำมันกับการเจลแลนต่อค่าของเหลวทึบหมุดที่แยกออกมา (total expressible fluid, TEF) ในวันที่ 15

ตารางที่ 11 ผลของปริมาณโปรตีนไขมัน และคาราจีแวน ต่อปริมาณของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมา (TEF) ของน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์เมื่อเก็บเป็นเวลา 15 วัน

Design point	X1:protein (%)	X2:oil (%)	X3:carageenan (%)	Y1:TEF (%)			
	0 day	5 days	10 days	15 days			
1	4.6	56.4	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4.6	56.4	0.4	1.31	1.59	1.61	1.64
3	4.6	51.6	1.6	0.00	0.00	0.23	0.39
4	4.6	51.6	0.4	1.22	1.85	2.00	2.07
5	3.4	56.4	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3.4	56.4	0.4	3.37	3.59	3.95	3.87
7	3.4	51.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00
8	3.4	51.6	0.4	3.92	5.29	5.89	5.94
9	5	54	1	0.00	0.00	0.25	0.26
10	3	54	1	1.98	2.04	2.10	1.90
11	4	58	1	0.00	0.00	0.00	0.71
12	4	50	1	1.00	1.03	1.50	3.22
13	4	54	2	0.00	0.00	0.00	0.00
14	4	54	0	6.34	7.00	7.15	7.17
15	4	54	1	0.98	0.99	1.06	1.15
16	4	54	1	0.98	0.99	1.05	1.16

4.2.4 การกระจายตัวของไขมันในน้ำมันพิริอิมัลซิฟายด์ที่มีการปรับปรุงคุณภาพด้วยการจีแนนเปรียบเทียบกับน้ำมันพิริอิมัลซิฟายด์ที่ไม่มีการเติมสารจีแนน ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (scanning electron microscope, SEM)

เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของไขมันในน้ำมันพิริอิมัลซิฟายด์ที่มีปริมาณน้ำมันสูงที่สุดและมีการปรับปรุงคุณภาพด้วยการจีแนน ซึ่งเตรียมจาก โปรตีน:น้ำมัน:สารจีแนน เท่ากับ 4:58:1 เปรียบเทียบกับน้ำมันพิริอิมัลซิฟายด์ที่ไม่มีการเติมสารจีแนนซึ่งเตรียมจาก โปรตีน:น้ำมัน:สารจีแนน เท่ากับ 4:54:0 ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM) ที่กำลังขยาย 500 และ 2000 เท่า ดังแสดงในรูปที่ 18 พบว่า ห้องส่องรูปมีโปรตีนปกคลุมเม็ดไขมันอย่างทั่วถึง แต่น้ำมันพิริอิมัลซิฟายด์ที่มีการเติมสารจีแนนในภาพ 18 (A) มีขนาดเม็ดไขมันเล็กกว่าและกระจายตัวดีกว่าน้ำมันพิริอิมัลซิฟายด์ที่ไม่ได้เติมสารจีแนน (18(B)) เนื่องจากเมื่อมีการเติม สารจีแนน ทำให้ระบบอิมัลชันมีความหนืดเพิ่มขึ้น ซึ่งสารจีแนนจะไปขัดขวางการรวมตัวกันของเม็ดไขมัน ทำให้เม็ดไขมันมีขนาดเล็กและมีการกระจายตัวที่ดี ทำให้อิมัลชันมีความคงตัวดีขึ้นด้วย




รูปที่ 18 ภาพของน้ำมันพิริอิมัลซิฟายด์จากเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscopic, SEM) A: น้ำมันพิริอิมัลซิฟายด์ที่เติมสารจีแนน และ B: น้ำมันพิริอิมัลซิฟายด์ที่ไม่เติมสารจีแนน และ P, O และ C หมายถึง โปรตีน น้ำมัน และสารจีแนน ตามลำดับ

จากผลการทดลองข้างต้น แสดงให้เห็นว่า น้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่เตรียมจาก โปรตีน:น้ำมัน:คาราจีแนน เท่ากับ 4:58:1 มีความสามารถในการเกิดอิมัลชันสูง และสามารถที่จะ เกิดอิมัลชันได้อีก โดยสังเกตจากค่าความคงตัวของอิมัลชัน วัดจากปริมาณของเหลวทั้งหมดที่แยก ออกมาเมื่อเวลาผ่านไป 15 วัน มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.71 ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมาก สามารถที่จะเพิ่ม ปริมาณน้ำมันในระบบอิมัลชันได้อีก ดังนั้นจึงมีการศึกษาเบื้องต้นและได้เพิ่มปริมาณน้ำมัน เมล็ดทานตะวันในการเตรียมน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ โดยเพิ่มปริมาณน้ำมันจากร้อยละ 58 โดย น้ำหนัก เป็นร้อยละ 62 โดยน้ำหนัก ซึ่งสัดส่วนที่ใช้เตรียมน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ คือ โปรตีน:น้ำมัน: คาราจีแนน เท่ากับ 4:62:1 เหตุผลของการเพิ่มปริมาณน้ำมันเนื่องจาก ถ้าปริมาณน้ำมันในน้ำมันพรี อิมัลซิฟายด์มีน้อย เมื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการทำไส้กรอกอิมัลชัน เนื้อสัมผัสของไส้กรอกจะ แห้ง กระด้าง ซึ่งการเพิ่มปริมาณน้ำมันจะมีผลดีคือ ทำให้ไส้กรอกมีเนื้อสัมผัสที่ดี นุ่ม ไม่แห้ง และ ช่วยลดการสูญเสียน้ำหนักภายหลังการให้ความร้อน (cooking loss) (Muguerza *et al.*, 2002) วิเคราะห์ค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมาระหว่างค่าความแข็งเปรียบเทียบกับน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่ เตรียมจาก โปรตีน:น้ำมัน:คาราจีแนน เท่ากับ 4:58:1 พบว่า ค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมาระหว่าง ทั้งสองชุดการทดลองมีค่าเท่ากับร้อยละ 0 ส่วนค่าความแข็งของน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่มีปริมาณ น้ำมันมากกว่ามีค่าเท่ากับ 129.03 กรัม ซึ่งน้อยกว่า น้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่มีปริมาณน้ำมันน้อยกว่า (146.13 กรัม) ($p<0.05$) ดังแสดงในตารางที่ 12 แต่ในการพิจารณาเลือกน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์เพื่อใช้ ในไส้กรอกอิมัลชันจะพิจารณาค่าความคงตัวของอิมัลชันจากค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมารีบบ์ หลัก และเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของไขมันในน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่เตรียมจาก โปรตีน:น้ำมัน: คาราจีแนน เท่ากับ 4:58:1 และ โปรตีน:น้ำมัน:คาราจีแนน เท่ากับ 4:62:1 ด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒 ที่กำลังขยาย 500 และ 2000 เท่า ดังแสดงในรูปที่ 19 พบว่า ทั้งสองรูปมี โปรตีนปกคลุมเม็ดไขมันอย่างทั่วถึง และมีการกระจายตัวของเม็ดไขมันคิดเห็นกัน แสดงว่าทั้ง ส่องชุดการทดลองมีความคงตัวของอิมัลชันเหมือนกัน จึงทำให้ค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมามี ค่าไม่แตกต่างกัน แต่น้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่เตรียมจากน้ำมันร้อยละ 62 โดยน้ำหนัก จะมีขนาดของ เม็ดไขมันใหญ่กว่า น้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่เตรียมจากน้ำมันร้อยละ 58 โดยน้ำหนักเดือน้อย อาจ เนื่องจากปริมาณน้ำมันที่มากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาลักษณะปรากฏและเนื้อสัมผัสจากการสังเกต พบว่า ทั้งสองชุดการทดลองมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน จึงสามารถใช้น้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่เตรียม จาก โปรตีน:น้ำมัน: คาราจีแนน เท่ากับ 4:62:1 แทนน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่เตรียมจาก โปรตีน: น้ำมัน: คาราจีแนน เท่ากับ 4:58:1 ได้ ดังนั้นในการเตรียมไส้กรอกอิมัลชันในขั้นตอนต่อไปจึงใช้ น้ำมัน พรีอิมัลซิฟายด์ที่เตรียมจาก โปรตีน:น้ำมัน: คาราจีแนน เท่ากับ 4:62:1

ตารางที่ 12 ผลของปริมาณน้ำมันต่อค่าของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมา (TEF) และค่าความแข็ง (hardness) ของน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์^b

protein:oil:carageenan	TEF (%)	hardness (N)
4:58:1	0	1.43 ± 0.06^a
4:62:1	0	1.26 ± 0.05^b

a,b : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p<0.05$)



รูปที่ 19 ภาพของผลของน้ำมันต่อน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์จากเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒 (scanning electron microscopic, SEM) A: น้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่เตรียมจากน้ำมันร้อยละ 58 โดยน้ำหนัก และ B: น้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่เตรียมจากน้ำมันร้อยละ 62 โดยน้ำหนัก และ P, O และ C หมายถึง โปรตีน น้ำมัน และคาราจีแนน ตามลำดับ

4.3 ศึกษาการใช้น้ำมันพิรือมัลซิฟายด์ ในการผลิตไส้กรอกอิมัลชัน

ศึกษาการผลิตไส้กรอกอิมัลชันเนื้อไก่โดยใช้น้ำมันพิรือมัลซิฟายด์เปรียบเทียบกับไขมันชนิดอื่นๆ คือ หนังไก่ และน้ำมันเมล็ดคอคอกทานตะวัน ซึ่งมีการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพของไส้กรอกอิมัลชัน คือ ความคงตัวของอิมัลชัน (emulsion stability) โดยวัดจากปริมาณของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมา (total expressible fluid, TEF) ความสามารถในการอุ้มน้ำ (water holding capacity) การสูญเสียน้ำหนักภายหลังการให้ความร้อน (cooking loss) ลักษณะเนื้อสัมผัส ด้วยเครื่อง texture analyzer ประเมินในรูปแบบ Texture Profile Analysis การกระจายตัวของไขมันดัดแปลงในไส้กรอกอิมัลชันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (scanning electron microscope, SEM) วัดสี ด้วยเครื่องวัดสี (hunterlab chromometer) ปริมาณโปรตีน ด้วยวิธี Kjeldahl Method ปริมาณไขมัน ด้วย soxhlet และปริมาณความชื้น ด้วย Air Oven Method

4.3.1 ความคงตัวของอิมัลชัน (emulsion stability) ของไส้กรอกอิมัลชันโดยวัดจากปริมาณของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมา (total expressible fluid, TEF)

เมื่อวิเคราะห์ความคงตัวของอิมัลชันของไส้กรอกอิมัลชันจากปริมาณของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมา (TEF) หลังจากปั่นให้ว่าง ตามวิธีของ Lin and Huang (2003) ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 13 จะเห็นว่าไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันพิรือมัลซิฟายด์มีปริมาณของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมาน้อยที่สุด (TEF ร้อยละ 4.78) รองลงมาคือ ไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน (TEF ร้อยละ 6.79) และ ไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากหนังไก่ (TEF ร้อยละ 11.90) และแสดงว่าไส้กรอกอิมัลชันจาก PEF มีความคงตัวมากที่สุด รองลงมาคือ ไส้กรอกจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน และ ไส้กรอกจากหนังไก่มีความคงตัวน้อยที่สุด เนื่องจากไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพิรือมัลซิฟายด์มีส่วนผสมของซอยโปรดีนไฮโคล ไลเสท และการเจี๊ยแนน ซึ่งซอยโปรดีนไฮโคล ไลเสทมีสมบัติในการเป็นอิมัลซิฟายด์เร็วสูง จึงทำให้สามารถดูดซับน้ำและน้ำมันได้มาก ส่วนการเจี๊ยแนนมีผลทำให้ระบบอิมัลชันมีความหนืดเพิ่มขึ้น ทำให้ไปขัดขวางการรวมตัวของเม็ดไขมันในระบบอิมัลชัน จึงทำให้อิมัลชันมีความคงตัวมากขึ้น และการเจี๊ยแนนมีโครงสร้างที่เป็นประจุ สามารถจับกับโมเลกุลของน้ำได้ (Ayadi *et al.*, 2009) ทำให้ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพิรือมัลซิฟายด์มีความคงตัวสูง และมีของเหลวทั้งหมดที่แยกออกมาน้อยกว่าไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวันและไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากหนังไก่

4.3.2 ความสามารถในการอุ้มน้ำ (water holding capacity) ของไส้กรอกอิมัลชัน

จากการวิเคราะห์ความสามารถในการอุ้มน้ำ (water holding capacity) ตามวิธีของ Rawdkuen and Benjakul (2008) พบว่าไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์มีความสามารถในการอุ้มน้ำสูงที่สุด (ร้อยละ 92.10) รองลงมาคือ ไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมัน เมล็ดทานตะวัน (ร้อยละ 89.97) และไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากหนังไก่ (ร้อยละ 89.20) ดังแสดงในตารางที่ 13 เนื่องจากคาราจีแนนมีผลให้ค่าความสามารถในการอุ้มน้ำเพิ่มขึ้น โดยคาราจีแนนมีโครงสร้างที่สามารถจับกันแน่ได้ จึงทำให้ไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ซึ่งมีส่วนผสมของคาราจีแนนมีค่าความสามารถในการอุ้มน้ำเพิ่มขึ้น (Ayadi *et al.*, 2009) ผลการทดลอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Candogan and Kolsarici (2003) ซึ่งพบว่าคาราจีแนนมีผลทำให้ค่าความสามารถในการอุ้มน้ำของไส้กรอกอิมัลชันเพิ่มขึ้น

4.3.3 การสูญเสียน้ำหนักภายหลังการให้ความร้อน (cooking loss) ของไส้กรอกอิมัลชัน

จากการวิเคราะห์การสูญเสียน้ำหนักภายหลังการให้ความร้อน (cooking loss) โดยการต้มที่อุณหภูมิ 85°C เป็นเวลา 10 นาที ดัดแปลงจากวิธีของ Crehan and Hughes (2000) พบว่า ไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์สูญเสียน้ำหนักภายหลังการให้ความร้อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 9.24) รองลงมาคือ ไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน (ร้อยละ 10.65) และไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากหนังไก่ (ร้อยละ 11.34) แต่ไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน และไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากหนังไก่สูญเสียน้ำหนักภายหลังการให้ความร้อนไม่แตกต่างกันทางสถิติ ($p > 0.05$) ดังแสดงในตารางที่ 13 อาจเนื่องมาจากไส้กรอก อิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์มีส่วนผสมของโปรตีนถ้วนเหลืองไฮโครไลส์ทะ และคาราจีแนนในส่วนประกอบของน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ ซึ่งโปรตีนถ้วนเหลืองไฮโครไลส์ทะทำหน้าที่เป็นสารอิมัลซิฟายด์เอกสารและสารช่วยในการยึดเกาะ (binder) ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก และการเติมคาราจีแนนจะช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมัลชัน ซึ่งทำให้ไส้กรอกอิมัลชันสามารถทนกับความร้อนได้มากขึ้น โดยสังเกตได้จากการแหล่งที่แยกออกมาระหว่างให้ความร้อนน้อยกว่าไส้กรอกที่ไม่มีส่วนผสมของคาราจีแนน ดังนั้นไส้กรอกที่มีส่วนผสมของคาราจีแนนมีค่าการสูญเสียน้ำหนักภายหลังการให้ความร้อน (Cierach *et al.*, 2009) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Candogan and Kolsarici (2003) ซึ่งได้ศึกษาผลของการจีแนนต่อลักษณะของไส้กรอกไขมันตำแหน่งว่า ไส้กรอกที่เติมคาราจีแนนมีค่าการสูญเสียน้ำหนักภายหลังการให้ความร้อนน้อยกว่าไส้กรอกที่ไม่มีการเติมคาราจีแนน โดยปริมาณคาราจีแนนจะแปรผันกับค่าการสูญเสียน้ำหนักภายหลังการให้ความร้อน

ตารางที่ 13 สมบัติทางกายภาพของไส้กรอกอิมลัชัน

	TEF (%)	WHC (%)	cooking loss (%)
O	11.56 ± 0.38^b	89.97 ± 0.44^b	10.65 ± 0.97^a
P	3.74 ± 0.35^c	92.10 ± 0.33^a	9.24 ± 0.94^b
CS	18.90 ± 0.54^a	89.20 ± 0.29^c	11.34 ± 1.04^a

O, P, CS : ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน (oil) ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมลัชชิฟายด์ (pre-emulsified fat) และ ไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่ (chicken skin) ตามลำดับ

a-c : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p<0.05$)

4.3.4 การวัดสี ด้วยเครื่องวัดสี (Hunterlab chromometer) ของไส้กรอกอิมลัชัน

จากการวิเคราะห์แบบ CIE (L^* , a^* และ b^*) ด้วยเครื่องวัดสี (Hunterlab chromometer) ของไส้กรอกอิมลัชัน โดยแสดงผลเป็นค่าความเป็นสีแดง (a^*) ค่าความเป็นสีเหลือง (b^*) และค่าความสว่าง (L^*) ตามวิธีของ Kayaard and Gok (2003) ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 14 พบว่า ชนิดของไขมันที่ใช้ในการผลิต ไส้กรอกมีผลต่อค่าสี a^* , b^* และ L^* อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p\leq 0.05$) โดยไส้กรอกอิมลัชันที่เตรียมจากหนังไก่ จะให้ค่าสี a^* ต่ำที่สุด และ b^* สูงที่สุด คือ 1.66 และ 17.17 ตามลำดับ ในขณะที่ไส้กรอกอิมลัชันที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมลัชชิฟายด์และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ให้ค่าสี a^* และ b^* ไม่แตกต่างกัน ($p>0.05$) และ เมื่อพิจารณาค่าความสว่าง L^* พบว่า ไส้กรอกที่เตรียมจากไขมันทั้งสามชนิดมีค่าความสว่างที่แตกต่างกัน ($p\leq 0.05$) โดยไส้กรอกอิมลัชันที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวันมีค่าความสว่าง L^* สูงที่สุด รองลงมาคือ ไส้กรอกอิมลัชันที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมลัชชิฟายด์ และหนังไก่ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 87.78, 87.20 และ 80.03 ตามลำดับ และคงว่าไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่จะมีลักษณะสีที่คล้ำกว่าไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมลัชชิฟายด์และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน อาจเนื่องมาจากไขมันที่ใช้เตรียมไส้กรอกมีสีที่แตกต่างกัน โดยน้ำมันเมล็ดทานตะวันมีสีเหลืองใส น้ำมันพรีอิมลัชชิฟายด์มีสีขาว ส่วนหนังไก่จะมีสีเหลืองที่เข้มและคล้ำ ซึ่งสารที่ให้สีเหลืองในหนังไก่คือ พิกเม้นต์ Lutein และสารกลุ่มแครอทีโนออยด์ (carotenoid) เกิดจากการที่ไก่ได้รับอาหารที่มีสีเหลือง จึงส่งผลให้สีของไส้กรอกมีลักษณะที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 14 ลักษณะสีของไส้กรอกอิมัลชัน

	color		
	L*	a*	b*
O	87.78 ± 0.18 ^a	1.84 ± 0.08 ^a	12.52 ± 0.34 ^b
P	87.20 ± 0.15 ^b	1.88 ± 0.06 ^a	12.60 ± 0.21 ^b
CS	80.03 ± 0.30 ^c	1.66 ± 0.10 ^b	17.17 ± 0.18 ^a

O, P, CS : ไส้กรอกไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพร็อปิลชิฟายด์ และไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่ ตามลำดับ

a-c : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p<0.05$)

4.3.5 วิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสของไส้กรอกอิมัลชัน โดยวิธี Texture Profile Analysis

การวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสของไส้กรอกอิมัลชัน ด้วยเครื่อง Texture analyzer ประเมินในรูปแบบ Texture Profile Analysis (TPA) ตามวิธีของ Pietrasik and Duda (2000) ซึ่งวัดเนื้อสัมผัสภายในของไส้กรอก ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 15 พ布ว่า ค่าความแข็งของไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากหนังไก่จะให้ความแข็งมากที่สุด (2.94 N) ซึ่งแตกต่างจากไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพร็อปิลชิฟายด์และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ($p<0.05$) ส่วนไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพร็อปิลชิฟายด์ (2.68 N) และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน (2.71 N) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($p>0.05$) ค่าความสามารถในการเกาะรวมตัว (cohesiveness) ของไส้กรอก พ布ว่า ไส้กรอกอิมัลชันที่สามชุดการทดลองมีค่าความสามารถในการเกาะรวมตัวแตกต่างทางสถิติ ($p<0.05$) โดยไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่มีค่าความสามารถในการเกาะรวมตัวของไส้กรอกสูงที่สุด (1.41) รองลงมา คือไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพร็อปิลชิฟายด์ (1.03) และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน (0.86) ส่วนค่า springiness พ布ว่า ไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่มีค่าสูงที่สุด เนื่องจากหนังไก่มีองค์ประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทำให้ไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่จึงมีความละเอียดต่ำ เมื่อวัดลักษณะเนื้อสัมผัส ด้วยเครื่อง Texture analyzer ค่าที่ได้อาจเป็นส่วนของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของหนังไก่ จึงทำให้ค่าที่ได้มีค่าสูงกว่า ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพร็อปิลชิฟายด์และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน

ตารางที่ 15 ลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Profile Analysis, TPA) ของไส้กรอกอิมัลชัน

	hardness (N)	cohesiveness	springiness
O	2.71 ± 0.06^b	0.86 ± 0.05^c	1.25 ± 0.02^c
P	2.68 ± 0.11^b	1.03 ± 0.07^b	1.36 ± 0.06^b
CS	2.94 ± 0.15^a	1.41 ± 0.08^a	1.51 ± 0.07^a

O, P, CS : ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเม็ดทานตะวัน ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ และไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่ ตามลำดับ


a-c : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p<0.05$)

4.3.6 การเปรียบเทียบโครงสร้างระดับจุลภาคของไส้กรอกอิมัลชันที่ใช้ไขมันชนิดต่างๆ

การศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาคของไส้กรอกอิมัลชันที่ผลิตจากไขมัน 3 ชนิด คือ น้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ น้ำมันเม็ดทานตะวัน และหนังไก่ บนคละเอี้ยด จากเครื่องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning Electron Microscope, SEM) ที่กำลังขยาย 500, 2000 และ 6000 เท่า (รูปที่ 20) พบร่วมกันที่แสดงตำแหน่งของไขมัน 2 ลักษณะ คือ รูทรงกลมที่แสดงตำแหน่งของฟิล์มโปรตีนที่เคลือบห่อหุ้มเม็ดไขมัน คล้ายกับในงานวิจัยไส้กรอกอิมัลชันของ Jiménez-Colmenero *et al.* (2010) และ Cáceres *et al.* (2008) และพบลักษณะเม็ดไขมันเป็นทรงกลมสัมภากต ได้ชัดเจนใน รูปที่ 20 A, B และ C เช่นเดียวกับที่สังเกตได้ในงานวิจัยของ Ayo *et al.* (2008)

การเปรียบเทียบรูปแบบของเม็ดไขมันในไส้กรอกอิมัลชันที่ใช้น้ำมันเม็ดทานตะวัน (รูปที่ 20A) และ PEF (รูปที่ 20B) พบร่วมกับไส้กรอกที่ใช้น้ำมันเม็ดทานตะวันจะมีเม็ดไขมันขนาดใหญ่ประมาณ 20-30 ไมโครเมตร กระจายทั่วไป ในขณะที่ไส้กรอกที่ใช้ PEF จะมีขนาดเม็ดไขมันที่เล็กกว่า (ขนาดไม่เกิน 10 ไมโครเมตร) เนื่องจาก PEF ที่ใช้ในการผลิตไส้กรอกมีส่วนผสมของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากถั่วเหลืองและการเจียนน้ำนมซึ่งโปรตีนถั่วเหลืองจะทำหน้าที่เป็นอิมัลซิฟายเออร์ในระบบอิมัลชัน ทำให้อิมัลชันมีความคงตัวและสามารถเจียนมีผลทำให้ระบบอิมัลชันมีความหนืดเพิ่มขึ้น จะไปขัดขวางการรวมตัวกันของเม็ดไขมัน ทำให้เม็ดไขมันมีขนาดเล็กและมีการกระจายตัวที่ดี นอกจากนี้ยังทำให้ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมัลชันมีความคงตัวดีขึ้น ด้วย ส่วนไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่ไม่สามารถมองเห็นเม็ดไขมันเป็นรูปทรงกลม เนื่องจากเป็นไขมันที่ถูกปอกเปลือก ด้วยโครงสร้างของโปรตีน และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของหนังไก่ จึงทำให้ไม่เห็น

ลักษณะของเม็ดไขมันที่แยกออกมาก่อนย่างชั้นเงน (Andrés *et al.*, 2006) แต่ก็สามารถสังเกตุร่องกลมที่แสดงตำแหน่งของฟิล์มโปรตีนที่เคลือบห่อหุ้มเม็ดไขมันที่กำลังขยาย 2000 เท่า เมื่อพิจารณาลักษณะของไส้กรอกอิมัลชันพบว่า ไส้กรอกอิมัลชันที่ผลิตจากหนังไก่มีเนื้อสัมผัสดีกว่าน้ำมันหมาบและมีความคงตัวดีกว่าไส้กรอกที่ได้จากน้ำมันเมล็ดทานตะวันและ PEF สังเกตได้จากหลังกระบวนการผลิต ไส้กรอกที่ผลิตจากหนังไก่มีของเหลวแยกออกจากมากกว่าไส้กรอกที่ผลิตจากน้ำมันเมล็ดทานตะวันและ PEF



รูปที่ 20 ภาพของไส้กรอกจากเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องการดู (Scanning electron microscopic, SEM) A: ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน B: ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ และ C: ไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่

4.3.7 การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของไส้กรอกอิมัลชัน

การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ด้วยวิธี Kjeldahl Method ปริมาณไขมัน ด้วย soxhlet และปริมาณความชื้นด้วย Air Oven Method (AOAC, 2000) พบว่า ไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่มีปริมาณโปรตีนต่อน้ำหนักเปียกสูงที่สุด (ร้อยละ 14.09) รองลงมาคือ ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ (ร้อยละ 12.30) และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน (ร้อยละ 11.36) ดังแสดงในตารางที่ 16 เนื่องจากหนังไก่มีองค์ประกอบของโปรตีนและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน จึงทำให้ไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่มีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด ส่วนไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์มีโปรตีนถ้วนหนึ่ง เป็นองค์ประกอบในน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์จึงมีปริมาณโปรตีนมากกว่าไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ปริมาณไขมันพบว่าไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวันมีปริมาณไขมันต่อน้ำหนักเปียกสูงที่สุด (ร้อยละ 16.08) รองลงมาคือ ไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่ (ร้อยละ 8.49) และน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ (ร้อยละ 6.17) ดังแสดงในตารางที่ 16 สาเหตุที่ไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์มีปริมาณไขมันต่ำที่สุด เนื่องจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์มีองค์ประกอบของโปรตีนถ้วนหนึ่งและน้ำออยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์มีปริมาณไขมันต่ำที่สุด ส่วนไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่มีปริมาณไขมันต่ำกว่าไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน เนื่องจากในหนังไก่มีองค์ประกอบของโปรตีนและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอยู่ จึงทำให้ไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่มีปริมาณไขมันต่ำกว่าไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ส่วนปริมาณความชื้น พบว่าไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่มีปริมาณความชื้นสูงที่สุด (ร้อยละ 70.23) รองลงมาคือ ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ (ร้อยละ 67.40) และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน (ร้อยละ 57.30) ดังแสดงในตารางที่ 16 เนื่องจากไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่มีน้ำที่แทรกอยู่ในโครงสร้างของโปรตีนและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของหนังไก่ ส่วนไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์มีน้ำเป็นองค์ประกอบในการเตรียมน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ ทำให้ไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่ และน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์มีความชื้นมากกว่าไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน

ตารางที่ 16 องค์ประกอบทางเคมีของไส้กรอกอิมัลชัน

	Protein (%wb)	Fat (%wb)	Moisture (%)
O	11.36 ± 0.20 ^c	16.08 ± 0.43 ^a	57.30 ± 0.10 ^c
P	12.30 ± 0.21 ^b	6.17 ± 0.22 ^c	67.40 ± 0.41 ^b
CS	14.09 ± 0.28 ^a	8.49 ± 0.34 ^b	70.23 ± 0.78 ^a

O, P, CS : ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพร็อปิลซิฟายด์ และไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่ ตามลำดับ

a-c : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p<0.05$)

4.3.8 การวิเคราะห์ผลทางประสาทสัมผัสโดยการให้คะแนนความแตกต่าง (scoring test)

จากการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาความแตกต่างของตัวอย่างด้านลักษณะปราการ กลิ่นถั่วเหลือง ความแห้ง ความเยื้อดหุ่น และความชุ่มฉ่ำของไส้กรอกอิมัลชัน โดยใช้ผู้ทดสอบจำนวน 20 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการให้คะแนนความแตกต่าง (scoring test) พบว่า ผู้ทดสอบจำนวน 16 คน ให้คะแนนเกี่ยวกับลักษณะปราการโดยสังเกตความเนียนและเอียดของไส้กรอกอิมัลชันของไส้กรอกอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน (3.68 คะแนน) และน้ำมันพร็อปิลซิฟายด์ (3.85 คะแนน) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ($p>0.05$) ซึ่งมีค่าสูงกว่าและแตกต่างจากไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่ (2.30 คะแนน) เนื่องจากไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่มีลักษณะหยาบเห็นเป็นชิ้น คะแนนด้านกลิ่นถั่วเหลือง พบว่า ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน (1.28 คะแนน) และหนังไก่ (1.10 คะแนน) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งอยู่ในระดับไม่มีกลิ่น แต่มีความแตกต่างกับไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพร็อปิลซิฟายด์ (1.60 คะแนน) ซึ่งมีค่าสูงกว่าไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวันและหนังไก่ แต่ยังอยู่ในระดับที่น้อยมากและขอมรับได้ เนื่องจากน้ำมันพร็อปิลซิฟายด์ที่ใช้เตรียมไส้กรอกอิมัลชันมีส่วนผสมของโปรตีนถั่วเหลืองไฮโดรไลส์ทอยด์ ซึ่งกลิ่นถั่วที่เกิดขึ้นในโปรตีนถั่วเหลืองเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันชนิดลิโนเลอิกและลิโนเลนิกที่เป็นองค์ประกอบในโปรตีนถั่วเหลือง ทำให้เกิดสารที่ทำให้เกิดกลิ่นถั่วและกลิ่นเหม็นเจียว คือ สารกลุ่ม aldehydes, ketones, furans และ alcohol ซึ่งสารกลุ่ม medium-chain aldehydes (pentanal, hexanal และ heptanal) เป็นสารองค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิดกลิ่นถั่วและกลิ่นเหม็นเจียวของโปรตีนถั่วเหลือง (Maheshwari *et al.*, 1995) เมื่อมีการย่อยโปรตีนถั่วเหลืองด้วย.enzyme ทำให้เกิดโมเลกุลของโปรตีนที่มีขนาดเล็กลง และอาจทำให้สารที่ทำให้เกิดกลิ่นถั่วและกลิ่นเหม็นเจียวของโปรตีนถั่วเหลืองบางส่วนถูกย่อยและระเหยออกจากโมเลกุล

ของโพรตีน จึงทำให้โพรตีนถั่วเหลืองไฮโดรไลเสทมิกลินถั่วเหลืองและกลินเหมือนเขียวลดลง นอกจานนี้การย่อยโพรตีนด้วยเยอนไซม์อาจทำให้ได้กรดอะมิโนบางตัวที่ทำให้เกิดกลินและรสชาติที่พิเศษไป เช่น รสขม เปรี้ยว หรือหวานนี้ จึงทำให้กลินและรสชาติเหล่านี้ไปกลบกลินถั่วและและกลินเหมือนเขียวของโพรตีนถั่วเหลืองได้ (Mine *et al.*, 2010) ลักษณะด้านความแข็งของไส้กรอกที่เตรียมจากไขมันทั้งสามชนิดไม่มีความแตกต่างกัน (2.25-2.40 คะแนน) ผู้ประเมินไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ แต่ผล TPA จากเครื่อง texture analyzer พบว่าไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่มีค่าความแข็งมากกว่าไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมัน พรีอิมัลซิฟายด์และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน แต่ค่าไม่ต่างกันมากนัก ส่วนค่าความยืดหยุ่นและความชุ่มฉ่ำ พบว่าไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมัน พรีอิมัลซิฟายด์ (3.70 และ 3.80 คะแนน) มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน (3.30 และ 3.15 คะแนน) และหนังไก่ (2.55 และ 2.65 คะแนน) ดังแสดงในตารางที่ 17 และรูปที่ 21 ซึ่งผลของค่าความยืดหยุ่นขัดแย้งกับผลของ TPA ที่พบว่าไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่มีค่าความยืดหยุ่นมากกว่าไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ส่วนคะแนนความชุ่มฉ่ำของไส้กรอกอิมัลชันมีความขัดแย้งกับปริมาณความชื้นของไส้กรอก อิมัลชัน ซึ่งพบว่าไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่มีความชื้นสูงที่สุด อาจเนื่องจากไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่มีลักษณะค่อนข้างหยาบ จึงทำให้ผู้ทดสอบชิมรู้สึกถึงความชุ่มฉ่ำน้ำอย่าง


ตารางที่ 17 คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนแบบ scoring test

ลักษณะปรากฏ (ความเนียนละเอียด)		กลินถั่วเหลือง	ความแข็ง	ความยืดหยุ่น	ความชุ่มฉ่ำ
O	3.68 ± 0.47^a	1.28 ± 0.51^b	2.35 ± 0.48	3.30 ± 0.46^b	3.15 ± 0.36^b
P	3.85 ± 0.36^a	1.60 ± 0.50^a	2.40 ± 0.50	3.70 ± 0.46^a	3.80 ± 0.40^a
CS	2.30 ± 0.46^b	1.10 ± 0.30^b	2.25 ± 0.44	2.55 ± 0.50^c	2.65 ± 0.48^c

O, P, CS : ไส้กรอกไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ และไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่ ตามลำดับ

a-c : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p < 0.05$)

Scoring test



รูปที่ 21 การประเมินทางประสาทสัมผัส (Scoring test) ของไส้กรอกอิมัลชัน ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน (—) ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ (....) และไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่ (- - -)

4.3.9 การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 7-points hedonic scale

จากการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคด้านลักษณะปราภณ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบโดยรวมของไส้กรอกอิมัลชัน โดยใช้ผู้ทดสอบจำนวน 40 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 7-points hedonic scale พนว่า ผู้ทดสอบประเมินให้ค่าคะแนนความชอบสำหรับคุณลักษณะด้านลักษณะปราภณ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบโดยรวมแตกต่างกัน ($p \leq 0.05$) โดยไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ ผู้ทดสอบให้ค่าคะแนนความชอบสูงที่สุด รองลงมาคือ ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน และไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่ ดังแสดงในตารางที่ 18 เนื่องจากไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่มีลักษณะปราภณค่อนข้างheavy แตกออกจากกันได้ง่าย และมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน และน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์

ตารางที่ 18 คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 7-point hedonic scale

ลักษณะปรากฏ	เนื้อสัมผัส	กลิ่นรส	ความชอบโดยรวม
O	5.60 ± 0.50^b	5.13 ± 0.69^b	4.95 ± 0.68^b
P	6.25 ± 0.54^a	5.93 ± 0.73^a	5.50 ± 0.51^a
CS	3.65 ± 0.48^c	4.33 ± 0.57^c	4.25 ± 0.59^c

O, P, CS : ไส้กรอกไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ไส้กรอกที่เตรียมจากน้ำมันพรีอิมัลชิฟายด์ และ ไส้กรอกที่เตรียมจากหนังไก่ ตามลำดับ

a-c : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p<0.05$)