

รายงานฉบับสมบูรณ์

การศึกษาความหลากหลายทางชนิดของ
มอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini
(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลง

(A Study on the Species Diversity of Ambrosia
Beetles in the Tribe Xyleborini (Coleoptera:
Curculionidae, Scolytinae) in Khao Loung National
Park)

นายวิสุทธิ สิทธิฉายา¹
รศ.ดร. สุรไกร เพิ่มคำ¹
นายชาญชัย จรเสมอ²

¹ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
² อุทยานแห่งชาติเขาลง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

สมอ
QL596.A6
ว63
2555



กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนส่วนใหญ่จากกองทุนวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบางส่วนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ซึ่งร่วมจัดตั้งโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ที่สนับสนุนโครงการวิจัยเลขที่ BRT R352088 "การศึกษาความหลากหลายทางชนิด และ พลวัตประชากรของมอดेमโบรเซีย (Ambrosia beetles) (Coleoptera: Curculionidae; Scolytinae, Platypodinae) ในระบบนิเวศสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวและเชิงผสมในพื้นที่ภาคใต้" โดยระหว่างดำเนินการวิจัยโครงการดังกล่าวในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลงวงคณะผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่างมอดेमโบรเซียในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลงวงควบคู่กันไปด้วย คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลงวงทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่าง คณะผู้วิจัยและผู้วิจัยหลักขอขอบพระคุณ Prof. Dr. Roger A. Beaver และภรรยา เป็นอย่างสูงที่อนุญาตและอำนวยความสะดวกและต้อนรับด้วยความอบอุ่นยิ่งในการเดินทางไปเปรียบเทียบตัวอย่างเพื่อยืนยันการจำแนกชนิดของผู้วิจัยหลักที่ Dr. Roger A. Beaver's Bark and Ambrosia beetles private collection อ.แมริม จ.เชียงใหม่ ตลอดจนคำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีประโยชน์ยิ่ง

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นศึกษาความหลากหลายทางชนิดและการเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดเผ่าพันธุ์ Xyleborini ในพื้นที่ป่าดิบชื้น พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลง จ. นครศรีธรรมราช โดยใช้กับดักชนิด ethanol baited traps ผลการศึกษาพบมอดทั้งสิ้นจำนวน 12,063 ตัว จำแนกเป็น 26 สกุล 74 ชนิด โดยมีมอดสี่ชนิดจัดเป็นชนิดเด่นได้แก่ *Arixyleborus rugosipes* Hopkins (24.60%) *Xyleborus perforans* (Wollaston) (19.75%) *Xylosandrus crassiusculus* (Motschulsky) (14.90%) และ *Leptoxyleborus concisus* (Blandford) (12.19%) โดยมีมอดสี่ชนิดมีจำนวนรวมกันคิดเป็น 71.43% (8,616 ตัว) ของมอดที่พบทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini ในพื้นที่ป่าดิบชื้นในพื้นที่ศึกษามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยมีมอดมีระดับประชากรสูงสุดในฤดูแล้งช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระหว่างฤดูฝนเดือนกรกฎาคม-กันยายนเมื่อปริมาณน้ำฝนลดลงระหว่างฤดู การเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดกลุ่มดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพภูมิอากาศโดยระดับประชากรของมอดสูงขึ้นเมื่อระดับอุณหภูมิสูงขึ้นและลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง ในขณะที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับการความชื้นสัมพัทธ์ การศึกษาความหลากหลายของมอดกลุ่มดังกล่าวด้วยกับดักชนิด ethanol baited Panel-trap (ePT) ชนิดดังกล่าวสามารถดักแมลงได้มากกว่าทั้งจำนวนชนิดและจำนวน (ตัว) ในแต่ละชนิดมากกว่ากับดัก ethanol baited Bottles-trap (eBT) นอกจากนี้กับดักชนิดนี้ยังสามารถดักจับแมลงได้ดีแม้ในช่วงที่ระดับประชากรของแมลงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการวางกับดักโดยใช้กับดักชนิด eBT พบว่าการวางกับดักแบบชนิดให้ประสิทธิภาพดีกว่าการวางแบบห่างเล็กน้อยโดยพบจำนวนและจำนวนในแต่ละชนิดมากกว่าการวางแบบห่างเล็กน้อย

Abstract

The present research was focused on species diversity and annual flight pattern of ambrosia beetles in the Tribe Xyleborini in tropical rainforest of Khao Laung National Park, Nakhon sri Thammarat Province. Ethanol baited traps were used and were effective studied for insect trapping. In total, 12,063 xyleborines individuals from 26 genera and 74 species were trapped. Of these, four xyleborin ambrosia beetles were defined as dominated species in the studied area. The species were *Arixyleborus rugosipes* Hopkins (24.60%) *Xyleborus perforans* (Wollaston) (19.75%) *Xylosandrus crassiusculus* (Motschulsky) (14.90%) and *Leptoxyleborus concisus* (Blandford) (12.19%). The accumulated number of these four species shared 71.43% (8,616 individuals) of all insects caught. The flight pattern of xyleborin ambrosia beetles in tropical rainforest was fluctuated seasonally and was correlated with climatic factors. The seasonal flight peak was first reacted in the dry season of the year, between Aprils and May with addition small increase-peak in the middle of rainy season between July and August, when the monthly rainfall was dropped. The abundance of xyleborin ambrosia beetles was changed in relation to temperature and relative humidity. The population was increased in correspondence with increasing of the temperature, whereas the population was dropped with the increasing of ambient relative humidity. The ethanol baited Panel-trap (ePT) was more effective than ethanol baited Bottle-trap (eBT), both in captured species number and species quantities. The ePT was also well functioned in beetles captured in the low abundance periods. Compare between trap setting types, high density trap setting was captured a bit more number of individual and species number than low density trap setting.

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	i
บทคัดย่อ	ii
Abstract	iii
1. หลักการและเหตุผล (ความสำคัญและที่มาของหัวข้อการวิจัย)	1
2. โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย	6
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	6
5. วิธีการวิจัย	7
5.1 พื้นที่ศึกษา	7
5.2 กักตักและรูปแบบการวางกับดัก	9
5.3 การศึกษาความหลากหลายทางชนิดและพลวัตประชากรของมอดเอบโรเซีย	11
5.4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกับดักและรูปแบบการวางกับดัก	12
6. ผลและอภิปรายผลการศึกษา	13
6.1 ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษา	13
6.2 ความหลากหลายของมอดเอบโรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini ในพื้นที่เขาหลวง	15
6.3 พลวัตประชากรของมอด xyleborine ambrosia beetles ในพื้นที่ป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาหลวง	22
6.4 ประสิทธิภาพของชนิดและรูปแบบการวางกับดักต่อการศึกษาความหลากหลายและติดตามประชากรของมอดเอบโรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini	27
6.4.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างกับดัก eBT และ ePT	27
6.4.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างรูปแบบการวางกับดักแบบขีด และแบบห่าง	31
7. สรุปผลการศึกษา	34
8. เอกสารอ้างอิง	36
ภาคผนวก	41

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ประวัติการศึกษาความหลากหลายทางชนิดของมอดในวงศ์ย่อย Scolytinae และวงศ์ย่อย Platypodinae วงศ์ Curculionidae ในประเทศไทย	5
ตารางที่ 2 จำนวน (ตัว) และเปอร์เซ็นต์ (%) ของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini (Coleoptera: Curculionidae) ที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาลงหวง ระหว่างเดือนมีนาคม 2553-มิถุนายน 2554	18

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ที่ตั้งของพื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาลง จ. นครศรีธรรมราช	7
ภาพที่ 2 สภาพสังคมพืชป่าดิบชื้นในพื้นที่ศึกษาป่าดิบชื้น พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลง	8
ภาพที่ 3 กับดักแบบที่ 1 ethanol baited Bottle trap (eBT),	9
ภาพที่ 4 กับดักแบบที่ 2 Ethanol-baited panel trap (ePT)	10
ภาพที่ 5 รูปแบบการวางกับดักที่ใช้ในการศึกษา	11
ภาพที่ 6 ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในพื้นที่ศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช	13
ภาพที่ 7 ระดับอุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$) และความชื้นสัมพัทธ์ (%) ได้เรือนยอด (under canopy) ของพื้นที่ศึกษา	14
ภาพที่ 8 สัดส่วนจำนวนชนิด (species) ในแต่ละสกุลของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini ที่พบในพื้นที่เขาลง	16
ภาพที่ 9 สัดส่วนของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini ชนิดที่พบมากในพื้นที่ศึกษา	16
ภาพที่ 10 จำนวนชนิดของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini แยกตามจำนวน (ตัว) ที่พบในพื้นที่ศึกษา	17
ภาพที่ 11 จำนวนชนิดของมอด Xyleborine ambrosia beetles ที่คาดว่าจะพบในพื้นที่ศึกษา	21
ภาพที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอด xyleborin ambrosia beetles และปัจจัยภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษา	23
ภาพที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภูมิอากาศกับระดับประชากรรวมรายเดือนของมอด xyleborin ambrosia beetles	26
ภาพที่ 14 Species accumulation curve และ total species richness ของมอด xyleborin ambrosia beetles ผลจากการเปรียบเทียบระหว่างชนิดกับดัก	29
ภาพที่ 15 Species accumulation curve และ Total species richness ของมอด xyleborin ambrosia beetles จากการเปรียบเทียบรูปแบบการวางกับดักแบบชิด (ระยะห่างระหว่างกับดัก 10 เมตร) และแบบห่าง (100 เมตร)	33

1. ความสำคัญและที่มาของหัวข้อการวิจัย

มอดเอมโบรเซีย (Ambrosia beetles) เป็นแมลงขนาดเล็ก (1-8 มิลลิเมตร) สมาชิกของวงศ์ย่อย Platypodinae และ เผ่าพันธุ์ Xyleborini ในวงศ์ย่อย Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) มอดในกลุ่มนี้จัดเป็นแมลงจำพวก Xylomycetophagous insect (กลุ่มแมลงที่กินราที่เจริญเติบโตในเนื้อไม้เป็นอาหาร) ทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการย่อยสลายในระบบนิเวศ เนื่องจากแมลงในกลุ่มนี้จะเข้าไปในเนื้อไม้ที่ตายใหม่ ๆ นำารวมทั้งจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ เข้าไปย่อยสลายเนื้อไม้ นอกจากมอดเอมโบรเซียจะทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายนลำดับต้นๆ ที่สำคัญในระบบนิเวศแล้ว ในปัจจุบันมอดในกลุ่มนี้ยังจัดเป็นแมลงศัตรูพืชที่ทวีความสำคัญมากขึ้นอีกด้วย มอดเอมโบรเซียจัดเป็นแมลงในกลุ่ม secondary insect pest มักเข้าทำลายพืชที่อยู่ภายใต้สภาวะเครียด จากปัจจัยกายภาพและชีวภาพ รวมทั้งโรคและแมลง ชอบเข้าทำลายต้นไม้ที่โทรมใกล้ตาย หรือต้นไม้ที่ตายใหม่ ๆ อย่างไรก็ตามในรอบสิบปีที่ผ่านมาพบว่ามอดในกลุ่มมอดเอมโบรเซียสามารถยกระดับการเข้าทำลายพืช โดยสามารถเข้าทำลายต้นไม้ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงได้ (primary insect pest) โดยพบการระบาดอย่างรุนแรงและเป็นสาเหตุการตายอย่างกว้างขวางในพืชเศรษฐกิจทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้นและไม้ป่าเศรษฐกิจ ทั้งจากแมลงต่างถิ่นและแมลงในแหล่งแพร่กระจายเดิม ตัวอย่างมอดเอมโบรเซียต่างถิ่นที่ระบาดรุนแรงเช่น มอด Redbay ambrosia beetles (*Xyleborus glabratus* Eichhoff) ระบาดรุนแรงเป็นสาเหตุการตายของไม้ยืนต้นในวงศ์ อโวคาโด (Lauraceae) ในสหรัฐอเมริกา (Fraedrich *et al.*, 2008; Grégoire *et al.*, 2003; Mayfield *et al.*, 2008) มอด Asian ambrosia beetles (*Xylosandrus crassiusculus* Motschulsky) เป็นแมลงศัตรูสำคัญและสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อพืชมากมายหลายชนิดรวมทั้ง พืช พดัม พลับ เชอร์รี่ และไม้ยืนต้นอื่นๆ ในหลายประเทศ (Kühnholz *et al.*, 2003) มอดเอมโบรเซียที่ระบาดอย่างรุนแรงในถิ่นแพร่กระจายเดิม ยกตัวอย่างเช่น *Platypus quercivorus* (Murayama) ระบาดอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุการตายของไม้โอ๊กชนิด *Quercus crispula* Blume ในตอนกลางของญี่ปุ่น (Kamata *et al.*, 2002; Kinuura and Kobayashi, 2005) เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของมอดเอมโบรเซียเช่นเดียวกันโดยพบมอด *Euplatypus parallelus* (Fabricius) (Platypodinae) ระบาดรุนแรงเป็นสาเหตุการตายของต้นประดู่บ้านในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและซีเชลล์ (Bamrungsri *et al.*, 2008; Boa and Kirkendall, 2004; Philip, 1999S; Sanderson *et al.*, 1997)

การศึกษาวิจัยแมลงในกลุ่มมอดเอมโบรเซียในประเทศไทยมีน้อยมาก ทั้งทางด้านความหลากหลายทางชนิด ชีววิทยา นิเวศวิทยาและการระบาด การศึกษาในครั้งนี้เป็นการสร้างข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญทั้งทางด้านความหลากหลายทางชนิด และการเปลี่ยนแปลงพลวัตประชากรของมอดเอมโบรเซียในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้ยังมีความสำคัญเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบอิทธิพลของลักษณะสังคมพืช และความ

หลากหลายของพืชในถิ่นที่อยู่อาศัย (Habitats) ต่อความหลากหลายและพลวัตประชากรของมอดในเผ่าพันธุ์ Xyleborini ในสังคมพืชต่างๆ ร่วมกับโครงการที่คณะผู้วิจัยกำลังดำเนินการคู่ขนานในขณะนี้ ได้แก่โครงการ “การศึกษาความหลากหลายทางชนิด และพลวัตประชากรของมอดเอมโบรเซีย (Ambrosia beetles) (Coleoptera: Curculionidae; Scolytinae, Platypodinae) ในระบบนิเวศสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวและเชิงผสมในพื้นที่ภาคใต้” (พื้นที่ อ. ช้างกลาง จ. นครศรีธรรมราช และ อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี)

ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้สามารถนำไปใช้ร่วมกับโครงการคู่ขนานดังกล่าวเพื่อศึกษาอิทธิพลของความซับซ้อนของสังคมพืช (ความหลากหลายของพืช) ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สังคมพืชไม้ผลยืนต้นเชิงเดี่ยว ไม้ผลยืนต้นเชิงผสม และสังคมป่าดิบชื้นในพื้นที่ ต่อความหลากหลายและพลวัตประชากรของมอดเอมโบรเซียในพื้นที่ได้มากขึ้น

2 ตรวจเอกสาร

การศึกษามอดेमโบรเซียในวงศ์ย่อย Scolytinae และ Platypodinae ในประเทศไทยมีไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และปาปัวนิวกินี การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาความหลากหลายทางชนิดของมอดมากกว่าการศึกษาด้านอื่นๆ เช่น ชีววิทยา การระบาด หรือการเป็นศัตรูพืช ในประเทศไทยมีรายงานอย่างเป็นทางการของมอดกลุ่มนี้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1967 และ 1970 โดยนักกีฏวิทยาชาวออสเตรียชื่อ Prof. Dr. Karl E. Schedl ซึ่งรายงานมอดในวงศ์ย่อย Scolytinae 2 ชนิด ที่ติดไปกับไม้ซุงส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น (Schedl, 1967; 1970) และรายงานเพิ่มเติมอีก 5 ชนิดในลักษณะเดียวกัน (Scolytinae 3 ชนิด Platypodinae 2 ชนิด) โดยนักกีฏวิทยาชาวอังกฤษชื่อ Browne ในปี ค.ศ. 1980 และ 1981 (Browne, 1980a,b,c; Browne, 1981) การศึกษาความหลากหลายของมอดเอ็มโบรเซียในประเทศไทยมีการดำเนินการอย่างจริงจัง โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ 2 ท่านได้แก่ F. G. Browne และ Roger A. Beaver ในปี ค.ศ. 1970-1975 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้รายงานมอดในวงศ์ย่อย Scolytinae จำนวน 70 ชนิด และวงศ์ย่อย Platypodinae 26 ชนิด จากพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย และรอบๆ เมืองเชียงใหม่ (Browne and Beaver, 1975) การศึกษาในระยะต่อมาส่วนใหญ่ทำโดย Dr. Roger A. Beaver หรือ นักวิจัยท่านอื่นๆ เป็นผู้สำรวจเก็บตัวอย่างแล้วส่งให้ Dr. Roger A. Beaver เป็นผู้จำแนกชนิด โดยในปี ค.ศ. 1990 Beaver รายงานมอดชนิดใหม่ (new species) ที่พบในประเทศไทย 3 ชนิด (Scolytinae 2 ชนิด Platypodinae 1 ชนิด) และ มอดที่พบรายงานในประเทศไทยเป็นครั้งแรกจำนวน 12 ชนิด (Scolytinae 11 ชนิด Platypodinae 1 ชนิด) จากพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนาซ่าง จังหวัดสงขลา (Beaver, 1990) ในปีเดียวกัน Murphy และ Meepol (1990) รายงานมอดเพิ่มเติม 2 ชนิดในวงศ์ย่อย Scolytinae และ 1 ชนิดในวงศ์ย่อย Platypodinae เข้าทำลายต้นไม้ในป่าชายเลนในจังหวัดระนอง ปี ค.ศ. 1999 Beaver รายงานมอด 21 ชนิดในวงศ์ย่อย Scolytinae และ 6 ชนิดในวงศ์ย่อย Platypodinae จากตัวอย่างที่เก็บจากจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตรัง และสงขลา (Beaver, 1999a,b) ในปี ค.ศ. 2006 Puranasakul ศึกษาความหลากหลายของมอดในกลุ่มนี้ในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย และรายงานมอดจำนวน 2 ชนิดในวงศ์ย่อย Platypodinae ที่เป็นชนิดที่ค้นพบใหม่ (new species) และรายงานมอดในวงศ์ย่อย Scolytinae จำนวน 9 ชนิด และ 4 ชนิดในวงศ์ย่อย Platypodinae ที่รายงานครั้งแรกในประเทศไทย (Puranasakul, 2006) ในปี ค.ศ. 2008 Cognato พบมอดชนิดใหม่จากประเทศไทย 1

ชนิด ได้แก่ *Orthotomicus chaokhao* Cognato (Cognato, 2008) และปี พ.ศ. 2550-2552 ผู้วิจัยและคณะรายงานมอดในวงศ์ย่อย Scolytinae ที่เข้าทำลายไม้ยางพาราแปรรูปในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ และมอดที่เข้าทำลายต้นมะม่วงและอบเชยในพื้นที่จังหวัดสงขลา และมอดทำลายไม้สักจากจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นรายงานใหม่ของไทยเพิ่มอีก 6 ชนิด (Sittichaya and Beaver, 2009; Kangkamanee *et al.*, 2010; ข้อมูลจากการสำรวจ) รวมรายงานมอดทั้งสองวงศ์ย่อยที่พบในประเทศไทยจำนวน 165 ชนิดแบ่งเป็น วงศ์ย่อย Scolytidae 121 ชนิด และ Platypodinae 44 ชนิด (ตารางที่ 1) จากผลการศึกษาของวันทนีย์แสดงให้เห็นว่ามอดในกลุ่มนี้มีการศึกษาน้อยมากแม้แต่ในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการศึกษามอดในกลุ่มนี้มากที่สุดยังพบมอดชนิดใหม่ถึง 2 ชนิด และพบมอดรายงานครั้งแรกของประเทศถึง 13 ชนิด

เช่นเดียวกับการศึกษาทางด้านความหลากหลาย การศึกษามอดเอมโบรเซียในแง่ของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทยก็มีเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกัน ศรุต (2538) รายงานการเข้าทำลาย ลักษณะทางชีววิทยาบางประการและการป้องกันและกำจัดของมอดเอมโบรเซียชนิด *Wallacella fornicatus* เข้าทำลายทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยพบว่ามอดระบาดควบคุมกับการระบาดของโรคราก-เน่าโคนเน่าของทุเรียน ชัยวัฒน์ (2538) รายงานว่ามอดชนิดนี้ระบาดตลอดปีในพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ และมอดชนิดนี้ไม่ได้เป็นพาหะของโรครากเน่า-โคนเน่า ในปี พ.ศ. 2544 จริยา และคณะ รายงานการระบาดของมอดเอมโบรเซียไม่ระบุชนิดในสกุล *Xylosandrus* ในสวนลำไยและลิ้นจี่ ในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่ามอดเข้าทำลายลำไย และลิ้นจี่ ในแปลงสำรวจบางแปลงมากถึง 91.43% จริยาและคณะ (2544) รายงานว่ามอดชนิดนี้เข้าทำลายลำไยได้ทุกระยะตั้งแต่ต้นกล้าในโรงเพาะชำจนถึงต้นที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ในกรณีที่ดินลำไยมีขนาดเล็กหรือมอดเข้าทำลายหนาแน่นจะทำให้เกิดอาการเหี่ยว และโทรมตายในที่สุด Euler และคณะ (2006) ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการเคลื่อนที่ของประชากรของแมลงรวมทั้งมอด *Wallacella fornicatus* แมลงศัตรูสำคัญของลำไยในสวนลำไยพื้นที่ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่พบว่าความหนาแน่นของมอดในพื้นที่ป่ารอบๆ แปลงลำไย และในแปลงลำไยมีค่าใกล้เคียงกัน และพื้นที่ป่าสามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำรองของมอด และแมลงดังกล่าวสามารถเข้ามาระบาดของในแปลงลำไยได้ ในปี พ.ศ. 2550-2551 วิสุทธิ์ และคณะ (ผลการสำรวจ) Sittichaya และ Beaver (2009) และ Kangkamanee และคณะ (2010) รายงานมอดในกลุ่มนี้ 18 ชนิดเข้าทำลายไม้ยางพาราบนลานไม้และไม้แปรรูปภายในโรงเลื่อยใน

พื้นที่ปลูกยางพาราเก่าภาคใต้และภาคตะวันออก และ ผู้วิจัย ได้รายงานมอดในกลุ่มนี้จำนวน 16 ชนิดที่เข้าทำลายมะม่วงและมะม่วงหิมพานต์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ตารางที่ 1 ประวัติการศึกษาค้นคว้าความหลากหลายทางชนิดของมอดในวงศ์ย่อย Scolytinae และ วงศ์ย่อย Platypodinae วงศ์ Curculionidae ในประเทศไทย

ปีที่ศึกษา (ค.ศ.)	ผู้วิจัย	พื้นที่ศึกษา	จำนวนแมลงรายงานใหม่		หมายเหตุ
			Scolytinae	Platypodinae	
1967 และ 1970	Schedl K. E.	รายงานมอดที่ติดไปกับ ไม้ที่ส่งออกไปยังประเทศ ญี่ปุ่น	2	-	Schedl, 1967 และ Schedl, 1970
1970-1975	Beaver R. A. และ Browne F. G.	คอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่ ใกล้เคียง	64	26	Browne and Beaver, 1975
1980-1981	Browne F. G.	รายงานมอดที่ติดกับไม้ ส่งออกไปยังญี่ปุ่น	3	2	Browne, 1980a, b, c Browne, 1981
1970-1986	Beaver R. A.	คอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่ ใกล้เคียง แม่ฮ่องสอน โตนาช้าง สงขลา	13	3	Beaver, 1990
1990	Murphy D.H. และ Meepol W.	ป่าชายเลน จ. ระนอง	2	1	Murphy and Meepol, 1990
1993-1996	Beaver R. A.	คอยอินทนนท์ เชียงใหม่ เขาช่อง ตวัง	21	6	Beaver, 1999a, b
2004-2005	Puranasakul, W.	คอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่	9	6	Puranasakul, 2006
2008	Cognato A. I.	-	1	-	Cognato, 2008
2006-2008	วิสุทธิ์ สิทธิฉายา Beaver R. A. ธีรพล มังฆมนี อรัญ งาม ผ่องใส สุรไกร เพิ่มคำ	โรงเลื่อยไม้ยางพารา 8 จังหวัดภาคใต้ และ 5 จังหวัดภาคตะวันออก แปลงมะม่วง จังหวัด สงขลา สวนปาล์ม กาญจนบุรี แปลงอบเชย สงขลา	6	-	Sittichaya and Beaver, 2009; Kangkamanee <i>et</i> <i>al.</i> , 2010
รวม			121	44	

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชนิดของมอดेमโบรเซีย (ambrosia beetles) เผ่าพันธุ์ Xyleborini (Curculionidae: Scolytinae) ในพื้นที่เขาหลวง
2. เพื่อศึกษาพลวัตประชากรของมอดเอ็มโบรเซียในระบบนิเวศป่าดิบชื้นในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
3. ทดสอบประสิทธิภาพของกับดักที่ใช้แอลกอฮอล์เป็นสารดึงดูด และรูปแบบการวางกับดัก ต่อจำนวนชนิดและปริมาณของมอดเอ็มโบรเซีย


4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สร้างข้อมูลพื้นฐานทางด้านความหลากหลายและพลวัตประชากรของมอดเอ็มโบรเซียในภาคใต้และประเทศไทย เพื่อใช้ในการอ้างอิงและจัดการแมลงศัตรูพืชในอนาคต
2. ใช้ตัวอย่างแมลงที่ยืนยันชนิดแล้วจากผลการศึกษาในครั้งนี้ สำหรับใช้ในการอ้างอิง และเปรียบเทียบในการจำแนกชนิดของแมลงกลุ่มนี้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
3. สามารถนำผลการศึกษาไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้

5 วิธีการวิจัย

5.1 พื้นที่ศึกษา


พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงมีพื้นที่ประมาณ 570 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่บนเทือกเขาหลวงระหว่างละติจูดที่ 8 องศา 22 ลิปดาถึง 8 องศา 45 ลิปดาเหนือและ ระหว่างลองจิจูดที่ 99 องศา 37 ลิปดาถึง 99 องศา 51 ลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ในท้องที่ อ.นบพิตำ อ. พิปูน อ.เมือง อ.พรมคีรี อ. ลานสกา อ. ช้างกลาง และ อ.ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนตอนกลาง วางตัวยาวในแนวเหนือใต้มีที่ราบระหว่างหุบเขาเล็กน้อย โดยตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ระดับ 100 เมตรถึง 1,835 เมตร (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 ที่ตั้งของพื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ. นครศรีธรรมราช จุดสีแดงแสดงตำแหน่งของพื้นที่เก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

พืชพรรณไม้ในพื้นที่เขาหลวงส่วนใหญ่เป็นสังคมป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest) และบนยอดเขาที่ความสูงมากกว่า 800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นป่าดิบเขา (Tropical Hill-Evergreen Forest) พันธุ์


พืชซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นพืชในวงศ์ Dipterocarpaceae ได้แก่ ไม้ในตระกูลยาง (*Dipterocarpus* spp.) ตะเคียนทอง (*Hopea odorata*) ไข่เหี้ยว (*Parashorea stellata*) ตะเคียนทราย (*Shorea gratissima*) สยาขาว (*S. leprosula*) กระบากดำ (*S. ferinosa*) กระบากขาว (*Anisoptera costata*) พันจ๋า (*Vatica cinerea*) เป็นต้น (ภาพที่ 2)




ภาพที่ 2 สภาพสังคมพืชป่าดิบชื้นในพื้นที่ศึกษาพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลง A สภาพทั่วไปมองจากด้านข้าง และ B สภาพของสังคมพืชชั้นล่างใต้เรือนยอด

5.2 กั๊บดักแลลรูปแบบการวางกั๊บดัก

ใช้กั๊บดักทึ่มีแอลกอฮอล์ 95% เป็นสารดึงดูดแมลง (ethanol baited trap) แลลใช้เอทิลินไกลคอลล (ethylene glycol) 30% เป็นสารป้องกันแมลงเน่าเปื้อย (preservative agent) ในการศึษาครั้งนี้ใช้กั๊บดัก 2 ชนิดดักด้วยกันได้แก่ กั๊บดักแบบที่ 1 ใช้ขวดน้ำดื่มไซขนาด 5 ลิตร มาดัดแปลงเพื่อใช้เป็นกั๊บดักตามภาพที่ 3 (ethanol baited bottle trap, eBT) แลลแบบที่ 2 กั๊บดัก Panel trap (ethanol baited panel trap, ePT) (ภาพที่ 4)




ภาพที่ 3 กั๊บดักแบบที่ 1 ethanol baited Bottle-trap (eBT), ใช้ขวดน้ำดื่มขนาด 5 ลิตร กั๊บดัก ประกอบด้วยหมายเลข 1 ขวดน้ำขนาด 5 ลิตรดัดตามภาพ หมายเลข 2 ภาชนะที่ใช้ใส่แอลกอฮอล์ 95% สำหรับดึงดูดแมลง หมายเลข 3 ภาชนะที่ใช้ในการเก็บแมลงที่มาติดกั๊บดัก



ภาพที่ 4 กักตักแบบที่ 2 Ethanol-baited panel trap (ePT) ใช้แอลกอฮอล์ 95% เป็นสารดึงดูดแมลง กับดักทำด้วย อคิลิลิกใส ประกอบด้วย แผ่นหลังคาขนาด 60x60 เซนติเมตร (หมายเลข 1) แผ่น fight barriers สองแผ่นขนาด 20x40 เซนติเมตร (หมายเลข 2) ขวดพลาสติกสี่ขาขนาด 250 ซีซี สำหรับใส่สารดึงดูดมอด (แอลกอฮอล์) กรวยเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณปากกรวย 20 เซนติเมตร (หมายเลข 4) และขวดเก็บแมลงที่มาติดกับดัก (หมายเลข 5) กักตักแขวนกับเสาเหล็กสูงจากพื้น 150 เซนติเมตร โดยวัดความสูงที่ส่วนบนสุดของขวดใส่สารดึงดูด (หมายเลข 6)

ทำการศึกษาโดยเก็บตัวอย่างบริเวณที่ทำการศึกษาแห่งชาติเขาหลวง (น้ำตกกะโรม) โดยใช้เส้นทางศึกษา 2 เส้นทาง ระยะห่างระหว่างเส้นทาง 500 เมตร เส้นทางศึกษาที่ 1 วางกับดัก Panel trap (ePT) จำนวน 5 กักตัก สูงจากพื้นดิน 1.5 เมตร ระยะห่างระหว่างกับดัก 200 เมตร เส้นทางศึกษาที่ 2 แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกวางกับดัก Bottle trap (eBT) จำนวน 10 กักตัก ติดตั้งกับดักสูงจากพื้น 1.5 เมตร (วัดความสูงจากพื้นจนถึงบริเวณบนสุดของขวดใส่สารดึงดูด) ระยะห่างระหว่างกับดัก 10 เมตร ส่วนที่ 2 วางกับดักชนิดเดียวกัน จำนวน 10 กักตัก ระยะห่างระหว่างกับดัก 100 เมตร (ภาพที่ 5)

เก็บแมลงที่มาติดกับดักทุกวันที่ 1 ของทุกๆ เดือนแยกแต่ละกับดัก ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 16 เดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2553 ถึง มิถุนายน 2554 (ภาพที่ 5)



ภาพที่ 5 รูปแบบการวางกับดักที่ใช้ในการศึกษา วางกับดักในเส้นทางศึกษา 2 เส้นทาง ระยะห่างระหว่างเส้นทาง 500 เมตร เส้นทางแรกวางกับดักชนิด ePT จำนวน 5 กับดัก ระยะห่างระหว่างกับดัก 200 เมตร เส้นทางที่ 2 แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกวางกับดัก eBT จำนวน 10 กับดักระยะห่างระหว่างกับดัก 10 เมตร ช่วงที่ 2 ทั้งระยะห่างจากกับดักสุดท้ายของช่วงแรก 100 เมตร วางกับดักจำนวน 10 กับดักระยะห่างระหว่างกับดัก 100 เมตร

5.3 การศึกษาความหลากหลายทางชนิดและพลวัตประชากรของมอดเอมโบรเซีย

นำตัวอย่างแมลงมาจำแนกชนิด และส่งตัวอย่างไปยืนยันการจำแนกชนิดโดย Dr. Roger Beaver (เชียงใหม่) ผู้เชี่ยวชาญการจำแนกชนิดของแมลงในกลุ่มนี้ นับจำนวนแมลงในแต่ละกับดักแยกเป็นรายเดือน นำข้อมูลจำนวนแมลงมาคำนวณความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้ดัชนีความหลากหลาย H' คำนวณด้วย Shannon-Wiener diversity index และ Fisher's alpha diversity index คำนวณจำนวนชนิดทั้งหมด (total species richness) ที่คาดว่าจะพบทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาด้วย Chao1- (abundance based) และ Chao2- (incidence based) species richness estimators โดยคำนวณดัชนีความหลากหลายและชนิดที่พบทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาด้วยโปรแกรม EstimateS (Colwell, 2005) นำข้อมูลจำนวนแมลงรวมทุกกับดักในแต่ละเดือนมาสร้างกราฟพลวัตประชากรของมอดเอมโบรเซียที่พบในพื้นที่ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนมอดต่อเดือนกับปัจจัยภูมิอากาศด้วย linear regression บันทึกข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ใต้เรือนยอด (under canopy climatic factors) ของพื้นที่ศึกษาตลอดระยะเวลาทำการวิจัยโดยใช้ เครื่องบันทึก Hobo pro v2 Temperature/Humidity data logger-U23,

Onset[®] Computer Corporation, MA. และใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด นครศรีธรรมราช

5.4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกับดักและรูปแบบการวางกับดัก


เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกับดักทั้งสองชนิด (eBT และ ePT) ในการศึกษาความหลากหลาย และติดตามประชากรของมอดแอมโบรเซียเฝ้าพันธุ์ Xyleborini โดยนำตัวอย่างแมลงที่ดักได้จากกับดักชนิด ePT 5 กับดัก และ จากกับดัก eBT กับดักที่ 11 13 15 17 และ 19 รวม 5 กับดัก มาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพระหว่างชนิดของกับดัก โดยนำค่าเฉลี่ยจำนวนมอดที่ดักจับได้ต่อกับดักในแต่ละเดือน ไปแปลงค่า (transform) ด้วย $\log(n+1)$ เพื่อให้มีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) และนำค่าที่ได้ ไปเปรียบเทียบ โดยใช้ *t*-test และ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกับดักทั้งสองชนิดในการศึกษาความ หลากหลายทางชนิดของมอด โดยนำข้อมูลชนิดและจำนวนในแต่ละชนิดไปวิเคราะห์ จำนวนชนิดที่พบต่อ ระยะเวลาในการศึกษา (computed species accumulation curve) โดยใช้ Mao Tau-function (analytical analog of randomized rarefaction procedure) เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มจำนวนชนิดที่พบ ต่อระยะเวลาในการศึกษาในกับดักแต่ละชนิด และคำนวณจำนวนชนิดที่คาดว่าจะพบทั้งหมดในพื้นที่ ศึกษา (total species richness) ด้วย Chao1- และ Chao2- estimators จากข้อมูลของกับดักทั้งสองชนิด และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับจำนวนชนิดที่พบจากการศึกษาทั้งหมดในครั้งนี้อยู่และข้อมูลจำนวน ชนิดของมอด xyleborine ambrosia beetles ในท้องถิ่น ในการวิเคราะห์ accumulation curve และ total species richness คำนวณโดยใช้โปรแกรม EstimateS (Colwell, 2005)

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการวางกับดักเพื่อใช้ในการศึกษาความหลากหลายและติดตาม ประชากรของมอด Xyleborin ambrosia beetles สองรูปแบบ (แบบชิด และแบบห่าง) โดยทำการวิเคราะห์ เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างชนิดของกับดัก นำข้อมูลไปแปลงค่าด้วย $\log(n+1)$ ก่อนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย *t*-test และคำนวณ species accumulation curve และ total species richness เพื่อเปรียบเทียบจำนวนชนิดที่พบจากการคำนวณ

6. ผลและอภิปรายผลการศึกษา


6.1 ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษา

ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ศึกษาภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกอบด้วยสองฤดูด้วยกันได้แก่ ฤดูฝนตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมกราคม และฤดูร้อนระหว่างกลางมกราคมถึงกลางเมษายน ลักษณะการกระจายของปริมาณน้ำฝนในพื้นที่แบ่งออกเป็นสองช่วงตามอิทธิพลของลมมรสุม ช่วงแรกตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึง กรกฎาคม ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงที่สองระหว่างเดือน ตุลาคม-มกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สลับด้วยเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยระหว่างกลางของช่วงฝนตกหนักทั้งสองช่วงในเดือนสิงหาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2549-2553) ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค่าเท่ากับ 1,558.26 มม อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาในการศึกษาวิจัยโครงการนี้ (มีนาคม 2553 ถึงมิถุนายน 2554) พื้นที่ภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ลานีญา (La Niña) ทำให้มีปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนมากผิดปกติ (1,043.3 มม ในเดือนพฤศจิกายน) มากกว่าค่าเฉลี่ยน้ำฝนในเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในฤดูฝน (300-400 มม) อย่างมาก รวมทั้งฝนหลงฤดูในช่วงต้นฤดูแล้ง (1,543.7 มม ในเดือนมีนาคม) ทำให้ในช่วงดำเนินการวิจัยมีช่วงฤดูแล้งเฉพาะต้นการทำวิจัย (เดือน มีนาคม-เมษายน 2553) เท่านั้น ในช่วงที่เหลือส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำฝนสูงถึงสูงมากผิดปกติ (ภาพที่ 6)



ภาพ 6 ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในพื้นที่ศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครศรีธรรมราช)

พื้นที่ภาคใต้ตั้งอยู่ในเขตโซนร้อน ถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองด้าน ทำให้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีอุณหภูมิ และระดับความชื้นสัมพัทธ์สูงตลอดทั้งปี และมีความแตกต่างระหว่างฤดู และระหว่างกลางวันและกลางคืนค่อนข้างต่ำ ในปี พ.ศ. 2553 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีมีค่าเท่ากับ 27.55 ± 1.20 องศาเซลเซียส สูงสุดในเดือนพฤษภาคม 29.65 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน 25.83 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 81.82 ± 4.05 เปอร์เซ็นต์ สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 90.43 เปอร์เซ็นต์ ต่ำสุดช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เฉลี่ย 77.68 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายใต้เรือนยอดไม้ (under canopy micro-climate) ในพื้นที่ศึกษาป่าดิบชื้นบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลวงมีความแตกต่างจากข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง โดยระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ใต้เรือนยอดของป่าดิบชื้นมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าพื้นที่โล่ง 2.23 ± 0.37 องศาเซลเซียส และ 8.07 ± 2.65 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (ตารางภาคผนวกที่ 1 และภาพที่ 7)




ภาพที่ 7 ระดับอุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$) และความชื้นสัมพัทธ์ (%) ใต้เรือนยอด (under canopy) ของพื้นที่ศึกษาป่าดิบชื้นอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เช่นเดียวกับปริมาณน้ำฝน การเปลี่ยนแปลงลักษณะอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ระหว่างการดำเนินการวิจัยมีความผิดปกติจากสภาพอากาศโดยเฉลี่ยในพื้นที่ภาคใต้ โดยระดับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนในช่วงฤดูร้อนปีที่สองมีค่าต่ำใกล้เคียงกับอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูฝน ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนมีค่าสูงมากทั้งฤดูฝนและฤดูร้อน โดยมีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนในฤดูร้อนมากกว่า 90% มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ปกติของฤดูฝนและความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงฤดูฝนมีค่าสูงมากผิดปกติและมีค่าสูงสุดระหว่างเดือน พฤศจิกายน-มกราคม 2554 ในระดับ 97-99 เปอร์เซ็นต์

6.2 ความหลากหลายของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini ในพื้นที่เขาหลวง


ผลการเก็บตัวอย่างพบมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini (xyleborine ambrosia beetles) จำนวนทั้งสิ้น 12,063 ตัว จำแนกเป็น 26 สกุล (Genera) 74 ชนิด (ตารางที่ 2) ในระดับสกุล (Genus) พบมอดเอมโบรเซียในสกุล *Arixyleborus* มากที่สุด จำนวน 8 ชนิด รองลงมาได้แก่ สกุล *Xylosandrus* 8 ชนิด สกุล *Ambrosiodmus* และ *Microperus* จำนวน 6 ชนิดตามลำดับ (ภาพที่ 8) ในระดับชนิดพบมอดเอมโบรเซีย 4 ชนิดที่จัดเป็นชนิดเด่น ได้แก่ *Arixyleborus rugosipes* Hopkins, *Xyleborus perforans* (Wollaston) *Xylosandrus crassiusculus* (Motschulsky) และ *Leptoxyleborus concisus* (Blanford) โดยมีสัดส่วนต่อจำนวนมอดทั้งหมดคิดเป็น 24.60% 19.75% 14.90% และ 12.19% ตามลำดับ โดยมอดชนิดเด่นทั้งสี่ชนิดมีจำนวนรวมกันคิดเป็น 71.43% (8,616 ตัว) ของมอดที่พบทั้งหมด มอดชนิดที่เหลือส่วนใหญ่มีจำนวนตัวรวมในแต่ละชนิดค่อนข้างน้อย โดยพบมอด 12 ชนิดที่มีจำนวนตัวรวมในแต่ละชนิดมากกว่า 100 ตัว สัดส่วนรวมของจำนวนมอดในกลุ่มนี้เท่ากับ 20.60% (2,485 ตัว) ของมอดที่พบทั้งหมด เมื่อรวมสัดส่วนมอดชนิดเด่น 4 ชนิดและมอดชนิดที่พบมากกว่า 100 ตัวต่อชนิดจำนวน 12 ชนิด พบว่ามีอัตราส่วนมากถึง 92.03% หรือจำนวนตัวรวม 11,101 ตัว จากจำนวนมอดที่พบทั้งหมด 12,063 ตัว มอดที่เหลือส่วนใหญ่จัดเป็นชนิดที่พบจำนวนน้อยโดย 20 ชนิด (27.03% ของชนิดที่พบ) มีจำนวนตัวที่พบน้อยกว่า 100 ตัว และ 38 ชนิด (51.35% ของชนิดที่พบ) มีจำนวนตัวที่พบน้อยกว่า 10 ตัว (ภาพที่ 9 และภาพที่ 10)



ภาพที่ 8 สัดส่วนจำนวนชนิด (species) ในแต่ละสกุลของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini ที่พบในพื้นที่เขาดหลวง



ภาพที่ 9 สัดส่วนของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini ชนิดที่พบมากในพื้นที่ศึกษาป่าดิบชื้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำรวจระหว่างเดือน มีนาคม 2553 – มิถุนายน 2554



ภาพที่ 10 จำนวนชนิดของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini แยกตามจำนวน (ตัว) ที่พบในพื้นที่ศึกษาบริเวณป่าดิบชื้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำรวจระหว่างเดือน มีนาคม 2553 – มิถุนายน 2554 จำแนกกลุ่มตามจำนวนตัวรวม

ตารางที่ 2 จำนวน (ตัว) และเปอร์เซ็นต์ (%) ของมอดเอบโรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini (Coleoptera: Curculionidae) ที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ระหว่างเดือน มีนาคม 2553-มิถุนายน 2554

No.	Species	จำนวน	%
1	<i>Arixyleborus rugosipes</i> Hopkins	2,967	24.60
2	<i>Xyleborus perforans</i> (Wollaston)	2,382	19.75
3	<i>Xylosandrus crassiusculus</i> (Motschulsky)	1,797	14.90
4	<i>Leptoxyleborus concisus</i> (Blandford)	1,470	12.19
5	<i>Xylosandrus mancus</i> (Blandford)	681	5.65
6	<i>Xyleborus affinis</i> Eichhoff	325	2.69
7	<i>Arixyleborus granulifer</i> (Eggers)	205	1.70
8	<i>Microperus</i> sp. 3	196	1.62
9	<i>Ambrosiodmus conspectus</i> (Schedl)	178	1.48
10	<i>Diuncus adossuarius</i> aff. (Schedl)	165	1.37
11	<i>Cyclorhipidion perpilosellum</i> (Schedl)	151	1.25
12	<i>Xyleborinus exiguus</i> (Walker)	150	1.24
13	<i>Debus emarginatus</i> (Eichhoff)	113	0.94
14	<i>Webbia duodecimspinitus</i> Schedl	113	0.94
15	<i>Arixyleborus suturalis</i> (Eggers)	105	0.87
16	<i>Xyleborinus andrewesi</i> (Blandford)	103	0.85
17	<i>Eccoopterus</i> sp3	91	0.75
18	<i>Eccoopterus spinosus</i> (Olivier)	74	0.61
19	<i>Xylosandrus morigerus</i> (Blandford)	74	0.61
20	<i>Cyclorhipidion pruinosum</i> (Blandford)	71	0.59
21	<i>Debus fallax</i> (Eichhoff)	69	0.57
22	<i>Ambrosiodmus asperatus</i> (Blandford)	64	0.53
23	<i>Arixyleborus puberulus</i> (Blandford)	56	0.46
24	<i>Diuncus quadrispinosulus</i> (Eggers)	56	0.46
25	<i>Diuncus ciliatoformis</i> (Schedl)	38	0.32
26	<i>Xylosandrus compactus</i> (Eichhoff)	37	0.31
27	<i>Xylosandrus</i> sp.	35	0.29


ตารางที่ 2 จำนวน (ตัว) และเปอร์เซ็นต์ (%) ของมอดेमโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini (Coleoptera: Curculionidae) ที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ระหว่างเดือน มีนาคม 2553-มิถุนายน 2554 (ต่อ)

No.	Species	จำนวน	%
28	<i>Xylosandrus morigerus</i> (Blandford)	33	0.27
29	<i>Arixyleborus scabripennis</i> (Blandford)	31	0.26
30	<i>Eccoptopterus limbus</i> Sampson	24	0.20
31	<i>Anisandrus hirtus</i> (Hagedorn)	23	0.19
32	<i>Streptocranus aff. capucinulus</i> (Schedl)	15	0.12
33	<i>Arixyleborus leprosulus</i> Schedl	13	0.11
34	<i>Xyleborinus perpusillus</i> (Eggers)	12	0.10
35	<i>Amasa schlichii</i> (Stebbing)	11	0.09
36	<i>Pseudowebbia trepanicauda</i> (Eggers)	10	0.08
37	<i>Debus pumilus</i> (Eggers)	8	0.07
38	<i>Microperus recidens</i> (Sampson)	8	0.07
39	<i>Ambrosiodmus</i> sp2	6	0.05
40	<i>Cryptoxyleborus stenographus</i> (Schedl)	6	0.05
41	<i>Euwallacea fornicates</i> (Eichhoff)	6	0.05
42	<i>Stictodex dimidiatus</i> (Eggers)	6	0.05
43	<i>Wallacellus similis</i> (Ferrari)	6	0.05
44	<i>Planiculus laevis</i> (Eggers)	5	0.04
45	<i>Truncaudum agnatum</i> (Eggers)	5	0.04
46	<i>Streptocranus bicuspis</i> Browne	5	0.04
47	<i>Xylosandrus subsimilis</i> (Eggers)	5	0.04
48	<i>Ancipitis punctatissimus</i> (Eichhoff)	4	0.03
49	<i>Coptodryas confusa</i> Hopkins	4	0.03
50	<i>Euwallacea interjectus</i> (Blandford)	4	0.03
51	<i>Euwallacea semirudis</i> (Blandford)	4	0.03
52	<i>Microperus nugax</i> (Schedl)	4	0.03
53	<i>Ambrosiodmus</i> sp. 1	3	0.02
54	<i>Ambrosiodmus lewisi</i> (Blandford)	3	0.02

ตารางที่ 3 จำนวน (ตัว) และเปอร์เซ็นต์ (%) ของมอดแอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini (Coleoptera: Curculionidae) ที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ระหว่างเดือน มีนาคม 2553-มิถุนายน 2554 (ต่อ)

No.	Species	จำนวน	%
55	<i>Arixyleborus mediosectus</i> (Eggers)	3	0.02
56	<i>Beaverium sundaensis</i> (Eggers)	3	0.02
57	<i>Microperus</i> sp. 2	3	0.02
58	<i>Ambrosiodmus rubricollis</i> (Eichhoff)	2	0.02
59	<i>Ancipitis puer</i> (Eggers)	2	0.02
60	<i>Cryptoxyleborus subnaevus</i> Browne	2	0.02
61	<i>Euwallacea</i> sp.	2	0.02
62	<i>Microperus diversicolor</i> (Eggers)	2	0.02
63	<i>Planiculus limatus</i> (Schedl)	2	0.02
64	<i>Xyleborus</i> aff. <i>pileatulus</i> Schedl	2	0.02
65	<i>Amasa</i> sp	1	0.01
66	<i>Arixyleborus malayensis</i> (Schedl)	1	0.01
67	<i>Cnestus murayamai</i> (Schedl)	1	0.01
68	<i>Euwallacea destruens</i> (Blandford)	1	0.01
69	<i>Fortiborus pseudopilifer</i> (Schedl)	1	0.01
70	<i>Microperus undulatus</i> (Sampson)	1	0.01
71	<i>Planiculus laevis</i> (Eggers)	1	0.01
72	<i>Xyleborinus artestriatus</i> (Eichhoff)	1	0.01
73	<i>Xyleborinus</i> nr. <i>exiguus</i> (Walker)	1	0.01
74	<i>Xyleborus metacuneolus</i> Eggers	1	0.01
รวม		12,063	100.00

เมื่อคำนวณจำนวนชนิดที่คาดว่าจะพบทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาด้วย Chao1 และ Chao2- species richness estimator พบว่าจำนวนชนิดที่คาดว่าจะพบทั้งหมดมีค่าเท่ากับ $80 (\pm 95\% \text{ CI: } 75-98)$ ชนิด และ $80 (\pm 95\% \text{ CI: } 76-95)$ ชนิด ตามลำดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับจำนวนชนิดทั้งหมดที่พบจากการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 74 ชนิด (ภาพที่ 11) เมื่อพิจารณาแนวโน้มของกราฟจำนวนชนิดของมอด xyleborine ambrosia beetles ที่คาดว่าจะพบในพื้นที่ศึกษาในภาพที่ 9 พบว่ากราฟพัฒนาเข้าสู่จุดคงที่ (asymptotic point) แสดงว่าจำนวนที่คำนวณได้มีค่าใกล้เคียงกับจำนวนชนิดของมอดที่มีอยู่จริงในพื้นที่ศึกษา ค่าดัชนีความหลากหลาย ($\pm \text{SD}$) ของมอดกลุ่มดังกล่าวคำนวณด้วย Shannon-Wiener diversity index และ Fisher's alpha diversity index มีค่าเท่ากับ 2.46 และ 10.50 ตามลำดับ



ภาพที่ 11 จำนวนชนิดของมอด xyleborine ambrosia beetles ที่คาดว่าจะพบในพื้นที่ศึกษา คำนวณโดย Chao1 (abundance-based) และ Chao2 (incidence-based) species richness estimators และจำนวนชนิดที่พบจริงจากการศึกษา

จำนวนชนิดของมอด xyleborine ambrosia beetles ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 74 ชนิด จากการสำรวจ เมื่อรวมกับจำนวนมอดเอมโบรเซียในวงศ์ย่อย Platypodinae จำนวน 34 ชนิด และ มอดเปลือกไม้ (bark beetles) จำนวน 40 ชนิด รวมในการศึกษาพบมอดเปลือกไม้และมอดเอมโบรเซีย (bark and ambrosia beetles) ในพื้นที่ศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 148 ชนิด จำนวนมอดที่พบทั้งหมดมากกว่าจำนวนมอดกลุ่มดังกล่าวที่พบจากการสำรวจในประเทศไทยและพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีรายงานก่อนหน้านี้


นี้ค่อนข้างมาก ยกตัวอย่างเช่น Hulcr และคณะ (2007, 2008b) ศึกษาความหลากหลายของ xyleborin ambrosia beetles ที่เข้าทำลายต้นไม้ที่ทำให้ตายใหม่ๆ ในป่าดิบชื้นของประเทศปาปัวนิวกินีพบมอดเอมโบรเซีย (รวมทั้งมอดในวงศ์ย่อย Platypodinae ด้วย) จำนวน 74 และ 84 ชนิดตามลำดับ ในประเทศมาเลเซีย Maeto และ Fukuyama (1999) ศึกษาความหลากหลายของมอดเอมโบรเซียในเผ่าพันธุ์ Xyleborini พื้นที่ป่าดิบชื้นพบมอดในกลุ่มดังกล่าว จำนวน 33 ชนิด และในประเทศไทย Hulcr และคณะ (2008a) ศึกษาความหลากหลายของมอดเปลือกไม้และมอดเอมโบรเซีย (bark and ambrosia beetles) ในพื้นที่ป่าดิบเขา และป่าเต็งรัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่พบมอดในกลุ่มดังกล่าวทั้งหมด 118 ชนิด ในจำนวนดังกล่าวพบมอด xyleborin ambrosia beetles จำนวน 42 ชนิด จำนวนชนิดมอดที่พบในพื้นที่มาเลเซียและประเทศไทยมีจำนวนมอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอดในกลุ่ม xyleborin ambrosia beetles ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างที่ไม่เพียงพอ (under-sampling) ใช้ระยะเวลาสั้นเกินไป (3 อาทิตย์) ในการเก็บตัวอย่างในการศึกษาในประเทศมาเลเซีย หรือมีจำนวนแมลงที่จับได้จำนวนน้อยเกินไป (2,107 ตัว) ในพื้นที่ดอยสุเทพ

6.3 พลวัตประชากรของมอด xyleborine ambrosia beetles ในพื้นที่ป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาลวง

การเปลี่ยนแปลงระดับประชากรในรอบปีหรือพลวัตประชากรของมอดเอมโบรเซียในพื้นที่ศึกษาป่าดิบชื้น พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลวง ในช่วงการศึกษาปีแรกมีนาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554 มีการเปลี่ยนแปลงระดับประชากรแบบสูงสุด 1 ครั้งในรอบปี (unimodal curve) โดยระดับประชากรสูงสุดในเดือนเมษายน-พฤษภาคม (ภาพที่ 12) โดยมีจำนวนมอดที่จับได้ทั้งหมดจำนวน 1,633 ตัว และ 1,187 ตัว ตามลำดับ หลังจากนั้นในช่วงฤดูฝนระดับประชากรจะลดลงและจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบๆ โดยระดับประชากรจะต่ำลงจากช่วงสูงสุดจนถึงระดับต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมและสูงขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงจุดสูงสุดในเดือนกันยายน (750 ตัว) ในช่วงกลางฤดูฝนเมื่อปริมาณน้ำฝนลดลงแต่ระดับประชากรจะต่ำกว่าในช่วงระดับประชากรสูงสุดในฤดูร้อนค่อนข้างมาก และลดลงอีกครั้งจนถึงระดับประชากรต่ำสุดในช่วงที่ 2 เดือนพฤศจิกายนและเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์จนครบรอบปี

ในปีที่สองช่วงมีนาคม 2554-มิถุนายน 2554 การเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดกลุ่มดังกล่าวค่อนข้างแตกต่างกับการเปลี่ยนแปลงระดับประชากรในช่วงปีแรก เมื่อระดับประชากรสูงขึ้นจากเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์แทนที่ระดับประชากรจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในเดือนมีนาคมและสูงสุดในเดือนเมษายนเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงระดับประชากรในช่วงปีแรก แต่ระดับประชากรของมอดกลับลดลงอีกครั้งและลดลงต่ำสุดในเดือนเมษายน และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน

โดยระดับประชากรของมอด xyleborin ambrosia beetles ในช่วงดังกล่าวมีจำนวนมากกว่าจำนวนสูงสุดของมอดในช่วงสูงสุดของการศึกษาในปีแรก (1,325 ตัวและ 2,156 ตัว ตามลำดับ)



ภาพที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอด xyleborin ambrosia beetles และปัจจัยภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษา: A ปริมาณน้ำฝน B และ C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้เวียนยอดตามลำดับ เส้นประในภาพที่ 12C แสดงช่วงเวลาและระดับปริมาณน้ำฝนที่มากผิดปกติระหว่างการศึกษ


การเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดेमโบรเซียเผ่าพันธุ์ *Xyleborini* ในป่าดิบชื้นพื้นที่เขาหลวงมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยมอดมีระดับประชากรสูงสุดในฤดูแล้งช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระหว่างฤดูฝนเดือนกรกฎาคม-กันยายน เมื่อปริมาณน้ำฝนลดลงระหว่างฤดู (ลักษณะการกระจายของปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีลักษณะฝนตกมากช่วงต้นและปลายฤดูและลดลงในกลางฤดู) การลดลงอย่างผิดปกติของระดับประชากรของมอดในการศึกษาปีที่ 2 ช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนคาดว่าจะมีสาเหตุมาจากปริมาณน้ำฝนที่มากผิดปกติในเดือนมีนาคม (1,543.7 มม) ทำให้ความชื้นสูงและอาจส่งผลกระทบต่อการสร้างรังของมอดเอ็มโบรเซีย โดยความชื้นที่สูงเกินไปจะทำให้เชื้อราที่อยู่ร่วมกับมอดเอ็มโบรเซียแบบพึ่งพาอาศัยจะเจริญเติบโตมากเกินความสามารถในการควบคุมของมอดเอ็มโบรเซียและส่งผลให้การสร้างรังล้มเหลว (Batra, 1966; Hulcr *et al.*, 2008a) ระดับประชากรของมอดเอ็มโบรเซียสูงขึ้นหลังจากฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนคาดว่าจะเนื่องมาจากปริมาณไม้ซึ่งเป็นอาหารและวัสดุสร้างรังที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากในเดือนมีนาคมมีฝนตกมากและมีลมกระโชกทำให้กิ่งไม้ขนาดเล็กและขนาดกลางหักลงสู่พื้นป่ารวมทั้งมีต้นไม้โค่นล้มทั้งต้นจำนวนมาก

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดเอ็มโบรเซียเผ่าพันธุ์ *Xyleborini* ในพื้นที่ป่าดิบชื้นมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสุทธิ์ และสุรโกร (2554a,b,c) ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีไม้ผลเป็นเป็นพืชหลัก Beaver และ Löyttyniemi (1991) ในพื้นที่ป่า savanna (Zambia) และ Flechtmann และคณะ (2001) ในสวนป่าสนและสวนป่ายูคาลิปตัส ที่มีรูปแบบที่แน่นอนและมีช่วงเวลาที่ระดับประชากรสูงสุดและต่ำสุดชัดเจนเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล แต่แตกต่างจากงานวิจัยของ Hulcr และคณะ (2008a) ในพื้นที่ป่าดิบเขาและป่าเต็งรัง (ดอยสุเทพ เชียงใหม่) ที่มีรูปแบบไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามในพื้นที่ป่าดิบชื้นมีช่วงเวลาที่ระดับประชากรสูงสุดอยู่ในช่วงฤดูแล้ง หรือช่วงกลางฤดูฝนเมื่อปริมาณน้ำฝนลดลงแตกต่างจากพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่า savanna ที่ระดับประชากรสูงสุดในช่วงกลางและปลายฤดูฝน ปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดเอ็มโบรเซียกลุ่มดังกล่าวได้แก่ลักษณะของสังคมพืช (Reed and Muzika, 2010) และการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิอากาศใต้เรือนยอด (Under-canopy microclimate) ในแต่ละสังคมพืช (Sittichaya *et al.*, 2011) โดยในพื้นที่เกษตรกรรม (สวนไม้ผล) สวนป่าและป่า savanna การเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิอากาศภายในสังคมพืชดังกล่าวมีความแตกต่างระหว่างฤดูกาลอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพอากาศภายนอกสังคมพืช (Sittichaya *et al.*, 2011) ทำให้ปัจจัยภูมิอากาศมีอิทธิพลโดยตรงต่อระดับประชากรของมอด

เอมโบรเซียในสังคมพืชเหล่านี้ ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีไม้ผลเป็นพืชหลักในบางฤดูปัจจัยภูมิอากาศมีอิทธิพลเหนือปัจจัยปริมาณอาหารหรือปริมาณไม้ที่เหมาะสมต่อการสร้างรังของมอดเอมโบรเซีย โดยผลการศึกษาของ วิสุทธิ์ และ สุรไกร (2554a,c) และ Sittichaya และคณะ (2011) พบว่าในสวนทุเรียนระดับประชากรของมอดเอมโบรเซียในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนมีระดับประชากรต่ำมาก จำนวนมอดที่ตกได้/กับดัก/เดือน ใกล้เคียงถึงแม้ว่าปริมาณอาหารหรือไม้ที่สามารถใช้สร้างรังได้มีปริมาณมากก็ตาม เนื่องจากไม้มีความชื้นต่ำไม่เหมาะสมต่อการสร้างรังและไม้ที่มอดใช้สร้างรังแห้งอย่างรวดเร็วทำให้การสร้างรังล้มเหลว เช่นเดียวกับผลการทดลองของ Hulcr และคณะ (2008a) ที่พบว่าระดับประชากรและจำนวนชนิดของมอดเอมโบรเซียในป่าเต็งรังต่ำกว่าในป่าดิบเขาเนื่องจากในป่าเต็งรังไม้ที่มอดใช้สร้างรังมีอัตราการระเหยของน้ำที่สูงกว่า การเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอด xyleborin ambrosia beetles ในพื้นที่ป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาลง มีความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพภูมิอากาศโดยระดับประชากรของมอดสูงขึ้นเมื่อระดับอุณหภูมิสูงขึ้นและลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง ในทางตรงกันข้ามการเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดกลุ่มดังกล่าวมีลักษณะตรงกันข้ามกับความชื้นสัมพัทธ์ ต่างจากในพื้นที่เกษตรกรรมสวนป่าและป่าที่มีลักษณะเรือนยอดไม่หนาที่บอบบาง Savanna เนื่องจากในป่าดิบชื้นระดับความชื้นสัมพัทธ์ได้เรือนยอดอยู่ในระดับสูงตลอดเวลา (>85%) เมื่อระดับความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสร้างรังหรืออีกนัยหนึ่งก็คือต่อระดับประชากรของมอดเอมโบรเซียโดยรวม (ภาพที่ 12A,B) อย่างไรก็ตามเนื่องจากระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้เรือนยอดอยู่ในระดับสูง และกว้างในช่วงแคบๆ (อุณหภูมิ 23.34-27.12°C และ ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 80-99%) เมื่อนำค่าของปัจจัยอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ดังกล่าวไปวิเคราะห์หาอิทธิพลต่อระดับประชากรของมอดเอมโบรเซียที่พบในพื้นที่ศึกษาโดยวิเคราะห์ Simple linear regression ทำให้ค่า (R^2) มีค่าน้อยมากและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P=0.03$) เฉพาะปัจจัยอุณหภูมิต่อระดับประชากรของมอดเอมโบรเซียเท่านั้น (ภาพที่ 13 A-C)

ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในพื้นที่ศึกษาจะขึ้นลงอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมอดกลุ่มดังกล่าว อย่างไรก็ตามผลการศึกษาของ Walgama และ Zalucki (2007) พบว่าระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดต่อการเจริญเติบโตของมอดเอมโบรเซียชนิด *Euwallacia fornicatus* (Eichhoff) เฉลี่ยทุกระยะการเจริญเติบโตอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส ถึงแม้ว่าการศึกษาชีววิทยาของมอดเอมโบรเซียที่พบในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ยังมีน้อย อย่างไรก็ตามผลการศึกษาของ Walgama และ Zalucki (2007) แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิในพื้นที่ศึกษายังไม่ใช่อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดต่อการเจริญเติบโตของมอดเอมโบรเซียบางกลุ่ม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิที่ต่างกัน 1-4 องศาในแต่ละช่วงเวลาในรอบปี

ย้อมมีผลต่อการเจริญเติบโตของมอดรุ่นลูกและระยะเวลาที่มอดใช้ในการสร้างรังและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดเอมโบรเซียในพื้นที่ศึกษาในที่สุด



ภาพที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภูมิอากาศได้แก่ ปริมาณน้ำฝน (มม) อุณหภูมิ (°C) และ ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ภายใต้เรือนยอดกับระดับประชากรรวมรายเดือนของมอด xyleborin ambrosia beetles ในพื้นที่ป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

6.4 ประสิทธิภาพของชนิดและรูปแบบการวางกับดักต่อการศึกษาความหลากหลายและติดตามประชากรของมอดเอบโรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini


6.4.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างกับดัก eBT และ ePT

ผลการศึกษพบว่ากับดักชนิด ePT (ethanol baited Panel-trap) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดักจับมอดเอบโรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini ได้มากกว่ากับดักแบบ eBT (ethanol baited Bottles-trap) ทั้งจำนวนชนิดและจำนวน(ตัว)ทั้งหมด และผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากับดักชนิด ePT นี้มีประสิทธิภาพในการศึกษาความหลากหลายและติดตามประชากรมอดเอบโรเซียได้ดีกว่ากับดักอีก eBT ผลการเก็บตัวอย่าง กับดัก ePT จำนวน 5 กับดักระยะเวลาในการศึกษา 16 เดือนพบแมลงทั้งหมด 3,382 ตัว จำแนกได้เป็น 55 ชนิด ในขณะที่กับดักแบบ eBT ดักจับแมลงได้ทั้งหมด 1,745 ตัวจำแนกเป็น 51 ชนิด ค่าเฉลี่ยจำนวนมอด/เดือนในกับดักชนิด ePT มีค่าเท่ากับ (\pm SE) 55.44 ± 11.70 ตัว/กับดัก/เดือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกับดักชนิด eBT ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.61 ± 9.23 ตัว/กับดัก/เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($F=0.032$, $df=119.97$, $p=0.001$)

จำนวนชนิดที่พบจากการศึกษาต่อระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา (species accumulation curve) คำนวณโดย Mao Tau-function จากผลการเก็บตัวอย่างด้วยกับดักชนิด ePT มีค่าสูงกว่ากับดักชนิด eBT เล็กน้อยตลอดระยะเวลาศึกษา (ภาพที่ 14A) และกราฟจำนวนชนิดที่พบของกับดักชนิด ePT มีแนวโน้มพัฒนาเข้าสู่ระดับคงที่ (Asymptotic point) (จุดที่แสดงว่าจำนวนชนิดที่สำรวจพบมีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับจำนวนชนิดที่มีในพื้นที่ศึกษา และจำนวนการสุ่มตัวอย่างไม่น้อยเกินไป (under-sampling)) มากกว่ากราฟของกับดักชนิด eBT ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับจำนวนชนิด และจำนวนมอด(ตัว)ทั้งหมดที่กับดักแต่ละชนิดจับได้ในช่วงต้นที่แสดงให้เห็นว่ากับดักชนิด ePT มีประสิทธิภาพสูงกว่ากับดักชนิด eBT

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากราฟ species accumulation curve ในภาพที่ 14A จะพบว่ากราฟจำนวนชนิด (species) ที่สำรวจพบจากกับดักทั้งสองชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังไม่เข้าสู่ระดับคงที่แสดงให้เห็นว่าจำนวนชนิดที่สำรวจได้มีค่าน้อยกว่าชนิดที่คาดว่าจะมีอยู่จริงในพื้นที่ศึกษาค่อนข้างมาก และการเก็บตัวอย่างโดยใช้กับดักเพียง 5 กับดักของแต่ละชนิดนั้นน้อยเกินไป ผลการศึกษาจำนวนชนิดที่พบจากการสำรวจ 51 ชนิดจากกับดักแบบ eBT และ 55 จากกับดักแบบ ePT มีค่าน้อยกว่าจำนวนชนิดที่คาดว่าจะพบในพื้นที่ศึกษา สอดคล้องกับจำนวนชนิดที่พบจากการศึกษาในครั้งนี้ทั้งหมดจากกับดักทุกชนิดและรูปแบบการวางกับดักทั้งสองรูปแบบที่ระดับ 81 ชนิดจากการสำรวจและ 88-89 ชนิดจากการคำนวณ

ผลการศึกษาโดยใช้กับดัก ePT พบมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ *Xyleborini* การสำรวจ 55 ชนิดเมื่อนำผลการศึกษาดังกล่าวไปคำนวณจำนวนชนิดที่คาดว่าจะพบทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา (total species richness) ได้จำนวนชนิดทั้งหมดจากการคำนวณด้วย Chao1- และ Chao2-estimators ($\pm 95\%$ CI) เท่ากับ $60.63 \pm 56.32-79.06$ ชนิด และ $65.18 \pm 58.09-88.55$ ชนิดตามลำดับ ในขณะที่กับดักชนิด eBT พบจำนวนชนิดจากการสำรวจทั้งหมด 51 ชนิด และจำนวนชนิดทั้งหมดจากการคำนวณด้วย Chao1- และ Chao2-estimators ($\pm 95\%$ CI) เท่ากับ $68.5 \pm 56.12-110.84$ ตัว และ $76.33 \pm 59.41-127.33$ ชนิดตามลำดับ (ภาพที่ 14B,C) เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการคำนวณและแนวโน้มของกราฟในภาพที่ 14B และ 14C จะพบว่ากับดักทั้งสองชนิดและจำนวนกับดักที่ใช้จำนวน 5 กับดัก มีข้อเสียที่แตกต่างกัน โดยกับดักชนิด ePT สามารถดักจับมอดได้จำนวนชนิดมากกว่ากับดัก eBT และให้ผลลัพธ์จำนวนชนิดที่เพิ่มขึ้นแม้ในช่วงที่ระดับประชากรของมอดอยู่ในระดับต่ำ (ช่วงเดือนที่ 5-14) (พิจารณากราฟการเปลี่ยนแปลงระดับประชากรในภาพที่ 12 ประกอบ) และจำนวนชนิดที่จับได้เพิ่มเติมในช่วงเดือนที่ 15-16 ซึ่งมีระดับประชากรสูงเพิ่มขึ้นไม่มากนักแสดงให้เห็นว่าจำนวนชนิดที่พบทั้งหมดจากการศึกษาโดยใช้กับดักชนิดนี้สามารถดักจับแมลงเกือบทุกชนิดได้ตั้งแต่การศึกษาในช่วงที่ระดับประชากรสูงครั้งแรกเดือนที่ 3-5 ของการเก็บตัวอย่าง (เมษายน-มิถุนายน 2553) และในช่วงที่ระดับประชากรต่ำช่วงเดือนที่ 5-13 ผลการเก็บตัวอย่างดังกล่าวทำให้ค่าแนวโน้มจำนวนชนิดที่คาดว่าจะพบในพื้นที่ศึกษาจากการคำนวณไม่สูงเกินจริงจนส่งสัญญาณสู่การสรุปที่ผิดพลาดได้อย่างในกรณีผลการคำนวณจากกับดัก eBT ในภาพที่ 14C ดังที่จะกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตามในการศึกษาความหลากหลายทางชนิดของมอด *xyleborin ambrosia beetles* ในป่าดิบชื้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลงโดยใช้กับดัก ePT จำนวน 5 กับดักระยะเวลาในการศึกษา 16 เดือน พบจำนวนชนิดของมอดน้อยกว่าที่ควรจะเป็น (under sampling/under estimate) ทั้งจำนวนชนิดจากการสำรวจจริงและจากการคำนวณ (55 ชนิดจากการสำรวจ และ 61- 65 ชนิดจากการคำนวณ) เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนมอดในกลุ่มนี้ที่พบทั้งหมดจากการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 74 ชนิด (88-89 $\pm 83-109$ ชนิด จากการคำนวณ) นอกจากนี้แนวโน้มเส้นกราฟจำนวนชนิดที่คาดว่าจะพบในพื้นที่ศึกษาจากการคำนวณ (ภาพ 14B) ยังมีแนวโน้มเข้าสู่ระดับคงที่แสดงให้เห็นว่าจำนวนชนิดที่พบและคำนวณได้จากการสำรวจด้วยกับดักชนิดนี้มีแนวโน้มใกล้เคียงกับชนิดที่มีอยู่จริงในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดอย่างยิ่ง เนื่องจากชนิดที่พบจริงทั้งหมดจากการศึกษาครั้งนี้จากกับดักทั้งหมดและจากการคำนวณจากฐานการเก็บตัวอย่างที่ครอบคลุมมากกว่ามีจำนวนชนิดสูงกว่าค่อนข้างมาก



ภาพที่ 14 Species accumulation curve และ total species richness ของมอด xyleborin ambrosia beetles ผลจากการเปรียบเทียบชนิดกับดัก: A จำนวนชนิดของมอดเอมโบรเซียกลุ่มดังกล่าวที่พบในพื้นที่ศึกษาต่อระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คำนวณจำนวนชนิดที่พบด้วย Mao Tau-function (Colwell, 2005), B และ C จำนวนชนิดทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาจากการสำรวจ และจากการคำนวณด้วย Chao1-และ Chao2-estimators, B กับดักชนิด ePT และ C กับดักชนิด eBT

ในขณะที่กับดัก ePT พบจำนวนชนิดต่ำกว่าชนิดที่พบทั้งหมดในการศึกษาในครั้งนี้ และให้ข้อมูลจำนวนชนิดที่คาดว่าจะพบจากการคำนวณน้อยกว่าจำนวนชนิดที่พบจริง และส่งสัญญาณไปในทาง under-estimate ในทางตรงกันข้ามการศึกษาความหลากหลายของมอดเอบโรเซียในกลุ่มดังกล่าวโดยใช้กับดักชนิด eBT ถึงแม้ว่าจำนวนชนิดที่พบจากการสำรวจจริง 51 ชนิดจะน้อยกว่าชนิดที่พบทั้งหมดจากการศึกษาโดยรวมและจากกับดักชนิด ePT (55 ชนิด) แต่จำนวนชนิดทั้งหมดที่คาดว่าจะพบจากการคำนวณ 68.5- 76.33 ชนิด มีค่าใกล้เคียงกับจำนวนชนิดที่พบจากการสำรวจทั้งหมดในครั้งนี้ (81 ชนิด) มากกว่าผลจากกับดักชนิด ePT อย่างไรก็ตามจำนวนชนิดจากการคำนวณมีค่า $\pm 95\%$ CI (สูงสุด) 110.84-127.33 ชนิด ค่าดังกล่าวค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริงค่อนข้างมาก ผลลัพธ์จากการคำนวณที่สูงมากดังกล่าวเกิดจากการดักจับมอดชนิดที่ไม่เคยจับได้มาก่อนในตอนท้ายของการเก็บตัวอย่าง (ภาพที่ 14C) ลักษณะของข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นข้อด้อยของกับดักชนิด eBT 2 ประการด้วยกัน ได้แก่ ประการแรก การเก็บตัวอย่างโดยใช้กับดักชนิดนี้ 5 กับดัก ระยะเวลาศึกษา 16 เดือน เป็นการเก็บตัวอย่างที่น้อยเกินไป (under sampling) และให้จำนวนชนิดที่คาดว่าจะพบในพื้นที่ศึกษาจากการคำนวณที่สูงเกินจริง (over estimate) และข้อที่สองกับดักชนิดนี้มีประสิทธิภาพ น้อยกว่ากับดักชนิด ePT เมื่อใช้ศึกษาความหลากหลายและติดตามประชากรของมอดเอบโรเซียในช่วงที่ระดับประชากรอยู่ในระดับต่ำ (เดือนที่ 4-13 ของการเก็บตัวอย่าง) โดยสังเกตจากราฟจำนวนชนิดที่พบจริงจากการสำรวจ (observation species richness) และที่คาดว่าจะพบทั้งหมด (Chao1, Chao2) ในภาพที่ 14C ที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วงปลายของการเก็บตัวอย่างซึ่งเป็นช่วงที่ระดับประชากรอยู่ในระดับสูงมาก (ดูภาพที่ 12 การเปลี่ยนระดับประชากรประกอบ) มอดส่วนใหญ่ถูกจับได้ในช่วงที่ระดับประชากรสูงในช่วงต้นและปลายการเก็บตัวอย่าง (เดือนที่ 2-4 และ เดือนที่ 15-16) ในขณะที่ในช่วงที่ระดับประชากรต่ำพบจำนวนชนิดมอดเพิ่มเติมเล็กน้อยมาก ส่งผลให้การคำนวณชนิดที่คาดว่าจะพบมีค่าสูงเกินจริงมาก ถึงแม้ว่าจำนวนชนิดของมอด xyleborin ambrosia beetles ที่คาดว่าจะพบในพื้นที่ศึกษาอาจมีสูงถึง 150-180 ชนิดอย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการศึกษาความหลากหลายทางชนิดของมอดเอบโรเซียจำเป็นต้องใช้วิธีในการสุ่มเก็บตัวอย่างหลายๆ วิธีร่วมกัน เช่น ใช้ Flight interception trap, pan trap และการเก็บตัวอย่างโดยตรง เพื่อให้สามารถพบชนิดของมอดในพื้นที่ศึกษานั้นๆ ให้มากที่สุด (วิสุทธิ์ และสุไรกร, 2554c; Sittichaya *et al.*, 2011; Beaver, ติดต่อส่วนตัว) ในการศึกษาแมลงในกลุ่มนี้ ไม่สามารถใช้กับดักที่มีแอลกอฮอล์เป็นสารดึงดูดได้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากแอลกอฮอล์ไม่สามารถดึงดูดมอดเอบโรเซียได้ทุกกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่นมอดในสกุล *Microperus*, *Coptodryas*, *Immanus* บางชนิดในสกุล *Xylosandrus* ถึงแม้ว่ามอดเหล่านี้จะ

พบบ่อยเมื่อสำรวจด้วยวิธีอื่นๆ ก็ตาม นอกจากนี้การกระจายตามระดับความสูงตามระดับเรือนยอดของมอดแต่ละกลุ่มยังมีความแตกต่างกันซึ่งจะไปมีผลต่อจำนวนชนิดที่ได้จากการสำรวจในแต่ละวิธีอีกด้วย


6.4.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างรูปแบบการวางกับดักแบบชิด และแบบห่าง

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการวางกับดักโดยใช้กับดัก eBT วางใน 2 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่แบบชิด (densely trap setting) ระยะห่างระหว่างกับดัก 10 เมตร จำนวน 10 กับดัก และแบบห่าง (distantly trap setting) ระยะห่างระหว่างกับดัก 100 เมตร จำนวน 10 กับดัก เพื่อใช้ในการศึกษาความหลากหลายและติดตามประชากรของมอดเอบโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini ผลการศึกษาพบว่า การวางกับดักแบบชิดมีประสิทธิภาพดีกว่าการวางกับดักแบบห่างเล็กน้อย โดยการวางกับดักแบบชิดพบจำนวนมอดเอบโบรเซีย กลุ่มดังกล่าวทั้งสิ้น 4,278 ตัว จำแนกเป็น 69 ชนิด และมีค่าเฉลี่ยจำนวนมอดที่ดักได้ต่อกับดักต่อเดือน (\pm SE) เท่ากับ 30.13 ± 3.39 ตัว/กับดัก/เดือน ในขณะที่การวางกับดักแบบห่างพบมอดจำนวนทั้งสิ้น 3,852 ตัว จำแนกเป็น 64 ชนิด มีค่าเฉลี่ยจำนวนมอดที่ดักได้ต่อกับดักต่อเดือนเท่ากับ 27.13 ± 4.39 ตัว/กับดัก/เดือน น้อยกว่าการวางกับดักแบบชิดเล็กน้อยและไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($F=0.413$, $df=282$, $p=0.584$)

กราฟ species accumulation curve (ภาพที่ 15A) ของการวางกับดักทั้งสองรูปแบบมีแนวโน้มจำนวนชนิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อใช้ระยะเวลาในการศึกษามากขึ้น (ไม่มีแนวโน้มเข้าสู่ระดับคงที่) แสดงให้เห็นว่าการเก็บตัวอย่างด้วยกับดักดังกล่าวจำนวน 10 กับดัก ทั้งสองรูปแบบการวางกับดักยังน้อยเกินไป (under sampling) อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการวางกับดักจะพบว่า การวางกับดักแบบชิดจะมีประสิทธิภาพในการศึกษาความหลากหลายทางชนิดได้ดีกว่าเล็กน้อย โดยสังเกตได้จากกราฟจำนวนชนิดต่อระยะเวลาในการสำรวจที่มีค่าสูงกว่าและมีแนวโน้มเข้าสู่ระดับคงที่มากกว่า

จำนวนชนิดที่คาดว่าจะพบทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา (total species richness) คำนวณด้วย Chao1- และ Chao2-estimators ($\pm 95\%$ CI) จากการวางกับดักแบบชิดมีค่าเท่ากับ $99.6 \pm 78.50-167.60$ ชนิด และ $89.04 \pm 75.57-130.08$ ชนิดตามลำดับ ในขณะที่การวางกับดักแบบห่างพบจำนวนชนิดทั้งหมดจากการคำนวณด้วย Chao1- และ Chao2-estimators ($\pm 95\%$ CI) เท่ากับ $92.5 \pm 73.18-152.45$ ชนิด และ $100.96 \pm 77.10-168.33$ ชนิดตามลำดับ (ภาพที่ 15B,C) ผลจากการคำนวณแสดงให้เห็นว่าจำนวนชนิดทั้งหมดที่คาดว่าจะพบในพื้นที่ศึกษามีค่อนข้างสูงมาก (under sampling/over estimate) เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดที่พบทั้งหมดจากการศึกษาครั้งนี้โดยรวม (81ชนิด) รวมทั้งประมาณการจำนวนชนิดของมอดในกลุ่มนี้ในพื้นที่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในช่วงต้น และเส้นกราฟจำนวนชนิดทั้งหมดยังมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดค่อนข้างมากทั้งการวางกับดักแบบชิดและแบบห่าง อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการวางกับดักเพียงอย่างเดียว พบว่าการวางกับดักแบบชิดจะให้ข้อมูลที่ดีกว่าทั้งจากจำนวนชนิดที่พบจริงจากการสำรวจและจากการคำนวณเนื่องจากเส้นกราฟจำนวนชนิดทั้งหมดจาก

การคำนวณเริ่มเข้าสู่ระดับคงที่ ในขณะที่ผลจากการคำนวณจากการเก็บตัวอย่างแบบห่างยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการจับแมลงชนิดที่ไม่เคยจับได้มาก่อนได้แบบก้าวกระโดดในช่วงปลายของการเก็บตัวอย่าง ซึ่งเป็นช่วงที่ระดับประชากรอยู่ในระดับสูง (ดูภาพที่ 12 ประกอบ) แสดงให้เห็นว่าการวางกับดักแบบนี้มีข้อจำกัดในการใช้ศึกษาความหลากหลายของแมลงในกลุ่มนี้ในช่วงที่ระดับประชากรของมอดอยู่ในระดับต่ำ



ภาพที่ 15 Species accumulation curve และ Total species richness ของมอด xyleborin ambrosia beetles ข้อมูลจากการเปรียบเทียบรูปแบบการวางกับดักแบบชิด (ระยะห่างระหว่างกับดัก 10 เมตร) และแบบห่าง (100 เมตร): A จำนวนชนิดของมอดเอมโบรเซียกลุ่มดังกล่าวที่พบในพื้นที่ศึกษาต่อระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คำนวณจำนวนชนิดที่พบด้วย Mao Tau-function (Colwell, 2005), B และ C จำนวนชนิดทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาจากการสำรวจ และจากการคำนวณด้วย Chao1-และ Chao2-estimators, B การวางกับดักแบบชิด (densely trap setting) และ C การวางกับดักแบบห่าง (distantly trap setting)

7. สรุปผลการศึกษา

การศึกษาความหลากหลายทางชนิดและการเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดเฝ้าพันธุ์ Xyleborini ในพื้นที่ป่าดิบชื้น พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้กับดักชนิด ethanol baited traps พบมอดทั้งสิ้น จำนวน 12,063 ตัว จำแนกเป็น 26 สกุล (Genera) 74 ชนิด น่าสนใจมากที่ในพื้นที่ป่าสมบูรณ์อย่างป่าดิบชื้นมีรูปแบบขององค์ประกอบทางชนิด (species composition) ของสังคมมอดในกลุ่มนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายต่ำอย่างพื้นที่เกษตรกรรมที่มีมอดชนิดเด่นเพียง 3-5 ชนิดเท่านั้น ชนิดอื่นๆ ที่เหลือจัดเป็นชนิดที่พบน้อย ในพื้นที่ศึกษาพบมอดชนิดที่พบมากและจัดเป็นชนิดเด่นได้แก่ *Arixyleborus rugosipes* Hopkins (24.60%) *Xyleborus perforans* (Wollaston) (19.75%) *Xylosandrus crassiusculus* (Motschulsky) (14.90%) และ *Leptoxyleborus concisus* (Blandford) (12.19%) โดยมีมอดสี่ชนิดมีจำนวนรวมกันคิดเป็น 71.43% (8,616 ตัว) ของมอดที่พบทั้งหมด จำนวนชนิดของมอด xyleborine ambrosia beetles ในพื้นที่ศึกษาจำนวน 74 ชนิดจากการสำรวจ 80 ($\pm 95\%$ CI: 75-98) ชนิด และ 80 ($\pm 95\%$ CI: 76-95) ชนิดจากการคำนวณ เมื่อรวมกับจำนวนมอดเอมโบรเซียในวงศ์ย่อย Platypodinae จำนวน 34 ชนิด และ มอดเปลือกไม้ (bark beetles) จำนวน 40 ชนิดรวมพบมอดเปลือกไม้และเอมโบรเซีย (bark and ambrosia beetles) ในพื้นที่ศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 148 ชนิด โดยมีค่าค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในภูมิภาค อย่างไรก็ตามผลการศึกษาดังกล่าวคาดว่าจะยังน้อยกว่าจำนวนชนิดของมอดในกลุ่มดังกล่าวที่มีอยู่จริงในพื้นที่เนื่องจากกับดักแอลกอฮอล์ไม่สามารถดึงดูดและดักจับมอดเอมโบรเซียได้ทุกกลุ่ม

การเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดเอมโบรเซียเฝ้าพันธุ์ Xyleborini ในพื้นที่ป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาลงมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยมีมอดมีระดับประชากรสูงสุดในฤดูแล้งช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระหว่างฤดูฝนเดือนกรกฎาคม-กันยายนเมื่อปริมาณน้ำฝนลดลงระหว่างฤดู การเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดกลุ่มดังกล่าวมีความสอดคล้องกับปัจจัยสภาพภูมิอากาศโดยระดับประชากรของมอดสูงขึ้นเมื่อระดับอุณหภูมิสูงขึ้นและลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง ในทางตรงกันข้ามการเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของแมลงกลุ่มดังกล่าวมีลักษณะตรงกันข้ามกับความชื้นสัมพัทธ์

กับดักชนิด ethanol baited Panel-trap (ePT) มีประสิทธิภาพดีกว่ากับดักชนิด ethanol baited Bottle-trap (eBT) โดยกับดักชนิดดังกล่าวสามารถดักแมลงได้มากกว่าทั้งจำนวนชนิดและจำนวน (ตัว) ในแต่ละชนิด นอกจากนี้กับดักชนิดนี้ยังสามารถดักจับมอดได้ดีแม้ในช่วงที่ระดับประชากรของแมลงอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามกับดักชนิดนี้ค่อนข้างมีราคาแพงจากราคาของวัสดุ (แผ่นอะคริลิก) และมีขนาดใหญ่ยุ่งยากในการขนส่งและติดตั้ง วัสดุมีความคงทนน้อย การลดขนาดให้เล็กลง หรือใช้วัสดุอื่นมาทดแทนอาจ

เป็นทางเลือกที่ดี เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการวางกับดักโดยใช้กับดักชนิด eBT พบว่าการการวางกับดักแบบชิดให้ประสิทธิภาพดีกว่าเล็กน้อยโดยพบจำนวนชนิดและจำนวนในแต่ละชนิดมากกว่าเล็กน้อย

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 16 เดือน ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างกับดัก 2 ชนิดโดยแต่ละชนิดของกับดัก ใช้กับดักจำนวน 5 กับดัก (ในแต่ละชนิด) และในการศึกษารูปแบบการวางกับดักใช้กับดัก eBT จำนวน 10 กับดักต่อรูปแบบการวาง ผลจากการเก็บตัวอย่างทั้งหมดสามารถสรุปได้พอสมควร ว่าการเก็บตัวอย่างทั้งสองกรณีเป็นแบบเก็บตัวอย่างน้อยเกินไป (under sampling) ในการศึกษาในอนาคตต้องใช้จำนวนกับดักเพิ่มขึ้น ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชนิดและรูปแบบการวางกับดักในครั้งนี้ ตอบคำถามได้ค่อนข้างจำกัด ทั้งจำนวนกับดักที่เหมาะสมในการศึกษา และรูปแบบการวางกับดักที่เหมาะสม

นอกจากนี้ผลการศึกษาทำให้ทราบว่ากับดักชนิดที่มีแอลกอฮอล์เป็นสารดึงดูดมีความเหมาะสมในการศึกษาความหลากหลายทางชนิดของมอดेमโบรเซียได้ดี โดยสามารถดักมอดได้จำนวนชนิดที่สูงพอสมควร แต่ต้องมีวิธีการอื่นๆ ประกอบเพื่อรับประกันว่ามอดชนิดที่ไม่สามารถดึงดูดด้วยแอลกอฮอล์ จะได้รับการสำรวจ แต่กับดักชนิดนี้มีความเหมาะสมน้อยในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดเอ็มโบรเซียในป่าดิบชื้นเนื่องจากในช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง และอุณหภูมิต่ำ อัตราระเหยของสารดึงดูดอาจลดลงดังนั้นจึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าการลดลงของจำนวนมอดที่ดักได้เกิดจากระดับประชากรที่ลดลง หรือประสิทธิภาพของกับดักที่ลดลง หรือร่วมกันทั้งสองปัจจัย

8. References

- จวิทยา วิสิทธิ์พานิช, ชาตรี สิทธิกุล, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, ภมรทิพย์ อักษรทอง และ จินดา เต็มบรรจง.
2544. มอดเจาะกิ่งลำไย แมลงชนิดใหม่ที่พบระบาด ใน รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพิสูจน์สาเหตุ
ของโรคหงอย อาการพุ่มแจ้ และ อาการตายเฉียบพลันของลำไย และ การป้องกัน และ กำจัด.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 267 หน้า.
- ชัยวัฒน์ กระตุกฤษ. 2538. มอดเจาะลำต้นทุเรียนกับเชื้อราไฟทอปธอรา สาเหตุโรครากเน่า-โคนเน่าของ
ทุเรียน. กสิกร 68: 51-53.
- วิสิทธิ์ สิทธิฉายา และ สุรไกร เพิ่มคำ. 2554a. พลวัตประชากรของแมลงกลุ่มมอด (Coleoptera:
Bostrichidae, Curculionidea; Scolytinae, Platypodinea) และด้วงกระดุกสัตว์แมลงศัตรู
(Coleoptera: Cleridae) ในสวนทุเรียน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42: 331-334.
- วิสิทธิ์ สิทธิฉายา และ สุรไกร เพิ่มคำ. 2554b. ความหลากหลายทางชนิด และพลวัตประชากรของมอด
xyleborin ambrosia beetles (Curculionidae: Scolytinae, Xyleborini) ในสวนทุเรียนพื้นที่ภาคใต้.
งานประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 12-14 ตุลาคม
2554, ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, ปทุมธานี.
- วิสิทธิ์ สิทธิฉายา และ สุรไกร เพิ่มคำ. 2554c. การศึกษาความหลากหลายทางชนิด และ พลวัตประชากร
ของมอดแฮมโบรเซีย (Ambrosia beetles) (Coleoptera: Curculionidae; Scolytinae,
Platypodinae) ในระบบนิเวศสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวและเชิงผสมในพื้นที่ภาคใต้. รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 106 หน้า.
- ศรุต สุทธิอารมณ์. 2538. มอดเจาะลำต้นทุเรียน. เกษตร 19: 148-151.
- Batra, L. R. 1966. Ambrosia fungi: Extent of specificity to ambrosia beetles. Science 153: 193–
195.
- Bamrungsri, S., Beaver, A., Phongpaichit, S. and Sittichaya, W. 2008. The infestation by an
exotic ambrosia beetle, *Euplatypus parallelus* (F.) (Coleoptera: Curculionidae: Platypodinae)
of Angsana trees (*Pterocarpus indicus* Willd.) in southern Thailand. Songklanakarin Journal
of Science and Technology 30: 579-582.

- Boa, E. and Kirkendall, L. 2004. Sandragon wilt disease, Seychelles. Strengthening national capacity for control of *Pterocarpus indicus* wilt disease and forest protection, FAO final technical report. 25 p.
- Browne, F.G. and Beaver, R.A. 1975. The Scolytidae and Platypodidae of Thailand. *Oriental Insect* 9: 283-311.
- Beaver, R. A. 1990. New recorded and new species of bark and ambrosia beetles of Thailand. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 4-5: 279-254.
- Beaver, R. A. 1999a. New recorded of ambrosia beetles from Thailand (Coleoptera: Platypodidae). *Serangga* 4: 29-34.
- Beaver, R.A. 1999b. New recorded of bark and ambrosia beetles from Thailand (Coleoptera: Scolytidae). *Serangga* 4: 175-183.
- Beaver, R.A., and Löyttyniemi, K. 1991. Annual flight patterns and diversity of bark and ambrosia beetles (Col., Scolytidae and Platypodidae) attracted to bait logs in Zambia. *Journal of Applied Entomology* 112: 505-511.
- Browne, F.G. 1980a. Bark beetles and ambrosia beetles (Coleoptera, Scolytidae and Platypodidae) Intercepted at Japan Ports, with descriptions of new species, I. *Kontyû* 48: 370-379.
- Browne, F.G. 1980b. Bark beetles and ambrosia beetles (Coleoptera, Scolytidae and Platypodidae) Intercepted at Japan Ports, with descriptions of New species, II. *Kontyû Tokyo* 48: 380-389.
- Browne, F.G. 1980c. Bark beetles and ambrosia beetles (Coleoptera, Scolytidae and Platypodidae) intercepted at Japan Ports, with descriptions of new species, III. *Kontyû* 48: 382-489.
- Browne, F.G. 1981. Bark beetles and ambrosia beetles (Coleoptera, Scolytidae and Platypodidae) intercepted at Japan ports, with descriptions of new species, V. *Kontyû* 49: 125-136.


- Cognato, A.I. 2008. A New species of *Orthotomicus* Ferrari 1867 (Curculionidae: Scolytinae: Ipini) from Thailand. *The Coleopterists Bulletin* 62:496-499.
- Colwell, R.K. 2005. EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared species from samples. (<http://www.purl.oclc.org/estimates>).
- Euler, D., Konrad, M., Sauerborn, J. and Hengsawad, V. 2006. Challenges for sustainable Litchi production systems in Northern Thailand: an ecological perspective. *In* International conference on sustainable sloping lands and watershed management December 12 - 15, 2006. Luang Prabang, Lao PDR.
- Flechtmann, C.A.H., Ottati, A.L.T. and Berisford, C.W. 2001. Ambrosia and bark beetles (Scolytidae: Coleoptera) in pine and eucalypt stands in southern Brazil. *Forest Ecology and Management* 142: 183-191.
- Fraedrich, S.W., Harrington, T.C., Rabaglia, R.J., Ulyshen, M.D., Mayfield, A.E., Hanula, J.L., Eickwort, J.M. and Miller, D.R. 2008. A fungal symbiont of the Redbay ambrosia beetle causes a Lethal wilt in Redbay and other Lauraceae in the Southeastern United States. *Plant Disease* 92: 215- 224.
- Grégoire, J.-C., Piel, F., de Proft, M. and Gilbert, M. 2003. Spatial distribution of ambrosia-beetle catches: a possibly useful knowledge to improve mass-trapping. *Integrated Pest Management Reviews* 6: 237–242.
- Hulcr, J., Mogia, M., Isua, B. and Novotny, V. 2007. Host specificity of ambrosia and bark beetles (Col., Curculionidae: Scolytinae and Platypodinae) in a New Guinea rain forest. *Ecological Entomology* 32: 762-772.
- Hulcr, J., Beaver, R. A., Puranasakul, W., Dole, S. A. and Sontichai, S.. 2008a. A Comparison of Bark and Ambrosia Beetle Communities in Two Forest Types in Northern Thailand (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae and Platypodinae). *Environ Entomol.* 37: 1461-1470.
- Hulcr, J., Novotny, V., Maurer, B. A. and Cognato, A.I. 2008b. Low beta diversity of ambrosia beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae and Platypodinae) in lowland rainforests of Papua New Guinea. *Oikos* 117: 214-222.

- Kangkamanee, T., Sittichaya, W., Ngampongsai, A., Permkam, S. and Beaver R. A. 2010. Wood-boring beetles (Coleoptera: Bostrichidae, Curculionidae; Platypodinae and Scolytinae) infesting rubberwood sawn timber in southern Thailand. *Journal of Forest Research* 16: 302–308.
- Kamata, N., Esaki, K., Kato, K., Igeta, Y. and Wada, K. 2002. Potential impact of global warming on deciduous oak dieback caused by ambrosia fungus *Raffaelea* sp. carried by ambrosia beetle *Platypus quercivorus* (Coleoptera: Platypodidae) in Japan. *Bulletin of Entomological Research* 92: 119–126.
- Kinuura, H. and Kobayashi, M. 2005. Death of *Quercus crispula* by inoculation with adult *Platypus quercivorus* (Coleoptera: Platypodidae). *Applied Entomology and Zoology* 41: 123–128.
- Kühnholz, S. Borden, J.H. And Uzunovic, A. 2001. Secondary ambrosia beetles in apparently healthy trees: Adaptations, potential causes and suggested research. *Integrated Pest Management Reviews* 6: 209–219.
- Maeto, K., and Fukuyama, K. 2003. Vertical stratification of ambrosia beetle assemblage in a lowland forest at Pasoh, peninsular Malaysia, pp. 325-336. *In* T. Okuda, N. Manokaran, Y. Matsumoto, K. Niiyama, S. C. Thomas and P. S. Ashton (eds.), *Pasoh: ecology of a lowland rain forest in Southeast Asia*. Springer, Tokyo, Japan.
- Mayfield, A.E., Peña, J.E., Crane, J.H., Smith, J.A., Branch, C.L., Ottoson, E.D. and Hughes, M. 2008. Ability of the Redbay ambrosia beetle (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) to bore into young Avocado (Lauraceae) plants and transmit the Laurel wilt pathogen (*Raffaelea* sp). *Florida Entomologist* 91: 485- 487.
- Murphy, D.H. and Meepol, W. 1990. Timber beetles of the Ranong Mangrove Forest. *Mangrove Ecosystems occasional Papers* 7: 6-8.
- Philip, E. 1999. Wilt disease of angšana (*Pterocarpus indicus*) in Peninsular Malaysia and its possible control. *Journal of Tropical Forest Science* 11: 519-527.


- Puranasakul, W. 2006. Diversity of bark and ambrosia beetles (Coleoptera: Scolytidae and Platypodidae) in Mixed Evergreen and Deciduous Dipterocarp Forest in Northern Thailand. Master's Thesis. Graduate school, Chiang Mai University. 134pp.
- Reed, S.E. and Muzika, R.M. 2010. The influence of forest stand and site characteristics on the composition of exotic dominated ambrosia beetle communities (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). *Environ. Entomol.* 39: 1482-1491.
- Sanderson, F.R., King, F.Y., Pheng, Y.C., Ho, O.K. and Anuar, S. 1997. A *Fusarium* wilt (*Fusarium oxysporum*) of Angsana (*Pterocarpus indicus*) in Singapore. I. Epidemiology and identification of the causal organism. *Arboricultural Journal* 21: 187-204.
- Schedl, K.E. 1967. Bark beetles and pine-hole borer (Scolytidae) Intercepted from imported logs andseeds in Japanese Ports II. *Kontyû* 35: 119-129.
- Schedl, K.E. 1970. Bark beetles and pine-hole borer (Scolytidae) intercepted from imported logs andseeds in Japanese Ports IV. *Kontyû* 38: 353-370.
- Sittichaya, W and Beaver, R. 2009. Rubberwood-destroying beetles in the eastern and gulf areas of Thailand (Coleoptera: Bostrichidae, Curculionidae: Scolytinae and Platypodinae). *Songklanakarin Journal of Science and Technology* 31: 381-387.
- Sittichaya, W., and Permkam, S. 2011. Powder-post beetle (Coleoptera: Bostrichidae) communities in durian orchards in Southern Thailand. *Kasetsart Journal of Natural Science*. (in press).
- Sittichaya, W., Permkam, S. and Roger A. Beaver. 2011. Powder-post beetle (Coleoptera: Bostrichidae) communities in durian orchards in Southern Thailand. *Maejo International Journal of Science and Technology*. (in press).
- Walgama, R.S. and Zalucki, M.P. 2007. Temperature-dependent development of *Xyleborus fornicatus* (Coleoptera : Scolytidae), the shot-hole borer of tea in Sri Lanka: Implications for distribution and abundance. *Insect Science* 14: 301-308.

ภาคผนวก


มอด xyleborin ambrosia beetles ที่พบมากที่สุด 10 ชนิดแรกในพื้นที่ศึกษาป่าดิบชื้น อุทยาน
แห่งชาติเขาหลวง จ. นครศรีธรรมราช




Arixyleborus rugosipes Hopkins, dorsal and lateral view




Xyleborus perforans (Wollaston), dorsal and lateral view




Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky), dorsal and lateral view




Leptoxyleborus concisus (Blandford), dorsal and lateral view




Xylosandrus mancus (Blandford), dorsal and lateral view




Xyleborus affinis Eichhoff, dorsal and lateral view




Arixyleborus granulifer (Eggers), dorsal and lateral view



Microperus sp7, dorsal and lateral view



Ambrosiodmus conspectus (Schedl), dorsal and lateral view



Diuncus adossuarius (Schedl), dorsal and lateral view

ตารางภาคผนวกที่ 1 เปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนระหว่างพื้นที่โล่ง (สถานีตรวจอากาศ) และ ใต้เรือนยอดไม้ของพื้นที่ศึกษาป่าดิบชื้นของอุทยานแห่งชาติเขาลวก

ปัจจัยภูมิอากาศ	พื้นที่	Jan-10	Feb-10	Mar-10	Apr-10	May-10	Jun-10	Jul-10	Aug-10	Sep-10	Oct-10	Nov-10	Dec-10	Jan-11	Feb-11	Mar-11	Apr-11	เฉลี่ย
อุณหภูมิ (°C)	สถานีตรวจอากาศ	26.61	27.17	27.89	29.00	29.65	28.65	27.94	27.61	27.49	27.07	25.68	25.83	25.34	26.72	26.44	27.74	27.43±1.1 8
	ใต้เรือนยอด	24.30	25.51	26.46	26.72	27.12	26.13	25.32	25.55	25.18	24.55	23.59	23.34	23.47	24.62	24.08	24.99	25.11±1.1 0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	สถานีตรวจอากาศ	82.56	78.59	77.9	78.2	76.96	79.19	80.14	79.93	82.54	83.44	90.43	87.2	87.34	80.22	85.35	80.67	81.70±3.7 3
	ใต้เรือนยอด	90.84	82.98	79.57	85.20	86.94	87.74	89.82	89.18	91.48	92.58	98.96	98.66	96.64	89.52	92.65	91.54	90.26±4.9 6




Photo by Sihasak Prachum