

ฉบับที่ 51

13 สิงหาคม 2556

10.00 น.

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้

จากข้อมูลดาวเทียม NOAA-18 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 จำนวนจุดที่เกิดไฟไหม้บน
เกษตรสูมารา ประเทศไทยลดลงจากเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 จำนวน 16 จุด เป็น 7 จุด
และตัวบ่งชี้ด้านล่างนี้ในเวลาต่อมา (รูปที่ 1)

สำหรับคุณภาพอากาศในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ของพื้นที่ภาคใต้ คือ จังหวัดภูเก็ต สงขลา
พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) มีค่าลดลงจากเมื่อวันนี้ (วันที่ 12 สิงหาคม
2556) จังหวัดยะลา นราธิวาส และสตูลพบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส และยะลาอยู่ในเกณฑ์ดี และคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสตูลอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชาชน รายละเอียดดังตารางที่ 1 และรูปที่ 3

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM_{10} และ AQI ในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.

สถานี	PM_{10}^*	AQI**
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 อ.เมือง	30***
จังหวัดภูเก็ต	ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง	22
จังหวัดสงขลา	เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่	40
จังหวัดนราธิวาส	ศากกาลาง อ.เมือง	33
จังหวัดยะลา	สนมโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง	23
จังหวัดสตูล	ศากกาลางจังหวัดสตูล	41
		51

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐาน $PM-10$ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

* : หน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu g/m^3$)


** : ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index)

*** : เนื่องจากสถานีขัดข้อง ข้อมูลคุณภาพอากาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556


เกณฑ์คุณภาพอากาศ

PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ค่า AQI	คุณภาพอากาศ
≤ 40	0-50	ดี
41-120	51-100	ปานกลาง
121-350	101-200	มีผลกระทบต่อสุขภาพ
351-420	201-300	มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
> 420	>300	อันตราย


ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ



รูปที่ 1 จำนวนจุดที่เกิดไฟใหม่บนเกาะสุมาตรา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556




รูปที่ 2 ทิศทางลม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556




รูปที่ 3 ดัชนีคุณภาพอากาศ วันที่ 13 สิงหาคม 2556

(เนื่องจากสถานีขัดข้อง ข้อมูลคุณภาพอากาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556)



รูปที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงของ Hotspot บนเกาะสุมาตรา
ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2556




รูปที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 13 สิงหาคม 2556

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูปแบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O_3) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ขึ้นของสารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุดจะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น



ตารางที่ 1 เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย

AQI	ความหมาย	สีที่ใช้	แนวทางการป้องกันผลกระทบ
0-50	คุณภาพดี	ฟ้า	ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
51-100	คุณภาพปานกลาง	เขียว	ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกอาคาร
101-200	มีผลกระทบต่อสุขภาพ	เหลือง	บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรทำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน
201-300	มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก	ส้ม	ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร
มากกว่า 300	อันตราย	แดง	บุคคลทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกอาคาร สำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยู่ภายในอาคาร

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ