

ชื่อวิทยานิพนธ์	การสำรวจความซุกการดื้อยา และการศึกษาปัจจัยเสี่ยง ผลการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อ <i>Streptococcus pneumoniae</i> ในภาคใต้ของประเทศไทย
ผู้เขียน	นางสาวกิตติมา อุรุณการ
สาขาวิชา	นาสขกรรมคลินิก
ปีการศึกษา	2545

### บทคัดย่อ

จากการศึกษาเชื้อ *Streptococcus pneumoniae* 92 ตัวอย่าง ที่ได้รับจากโรงพยาบาลในภาคใต้ 15 โรงพยาบาลตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2544 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 พบร่วมมีเชื้อ *Streptococcus pneumoniae* ที่ไวต่อยา penicillin 40 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีเชื้อที่ไม่ไวต่อยาในระดับปานกลาง 45 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 48.9 และมีเชื้อที่ดื้อยา 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 7.6 เชื้อที่แยกจากผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีความไวต่อยา cefotaxime ร้อยละ 100 เชื้อที่แยกจากผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เช่น โรคปอดบวม โรคติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ ความไวต่อยา cefotaxime, imipenem, levofloxacin และ erythromycin ตามลำดับร้อยละดังนี้ 95.1, 71.7, 100 และ 56.5 เชื้อนี้มีค่า MIC<sub>50</sub>/ค่า MIC<sub>90</sub> ของยา cefotaxime ในผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 0.047/0.5 ไม่คร大雨/มิลลิลิตร และมีค่า MIC<sub>50</sub>/ค่า MIC<sub>90</sub> ของยา penicillin, cefotaxime, imipenem, levofloxacin และ erythromycin ที่แยกจากผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะตามลำดับดังนี้ 0.19/1.5, 0.19/1.0, 0.064/0.25, 0.75/1.0 และ 0.094/6.0 ไม่คร大雨/มิลลิลิตร นอกจากนี้พบว่าเชื้อมีการติดต่อยาปฏิชีวนะมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ชนิด (multidrug-resistant) ร้อยละ 22.8 จากการศึกษาจะระบุนิยนของผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้ พบร่วม co-morbidity เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อ *Streptococcus pneumoniae* ที่ไม่ไวต่อยา penicillin (OR=3.6; 95% CI, 1.1-11.7) และติดเชื้อที่ไม่ไวต่อยา erythromycin (OR=4.0; 95% CI, 1.2-13.1) นอกจากนี้ยังพบว่า อายุเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องต่อยา penicillin และ erythromycin สำหรับการศึกษาด้านผลลัพธ์ทางคลินิก พบร่วมการเข้ารักษาในห้องผู้ป่วยหนัก การตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะภายใน 72 ชั่วโมง ผลลัพธ์ทางคลินิกสุดท้าย และอัตราการตาย ระหว่างผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่ไวต่อยา penicillin และผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่ไม่ไวต่อยา penicillin นั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Thesis Title	Prevalence survey of drug-resistant <i>Streptococcus pneumoniae</i> (DRSP), and risk factor, clinical outcome of infection caused by DRSP in Southern Thailand.
Author	Miss Kittima Uranakarn
Major Program	Clinical Pharmacy
Academic Year	2002

## Abstract

Ninety-two pneumococcal isolates from 15 hospitals in Southern Thailand during September 2001-May 2002 were investigated prospectively and medical records of patients whose pneumococcal isolates obtained were retrospectively reviewed. Of the 92 isolates, 40 (43.5%) isolates were penicillin susceptible pneumococci, 45 (48.9%) isolates were intermediate susceptible strains, and 7 (7.6%) isolates were penicillin resistant. The percentage of susceptible isolates to cefotaxime among meningitis, cefotaxime among non-meningitis, imipenem, levofloxacin, and erythromycin were 100, 95.1, 71.7, 100, and 56.5, respectively. The MIC<sub>50</sub>/MIC<sub>90</sub> of penicillin, cefotaxime in meningitis, cefotaxime in non-meningitis, imipenem, levofloxacin, and erythromycin were 0.19/1.5, 0.047/0.5, 0.19/1.0, 0.064/0.25, 0.75/1.0, and 0.094/6.0 µg/ml, respectively. Multidrug-resistance was found 22.8%. The major risk factor for acquisition of penicillin-nonsusceptible pneumococci and erythromycin-nonsusceptible strains in this study was co-morbidity; OR=3.6; 95%CI, 1.1-11.7 and OR=4.0; 95% CI, 1.2-13.1, respectively. In addition, risk factor associated with penicillin- and erythromycin-resistant pneumococci infection in adult was age. Among the 92 patients, admission to ICU, a favorable response within 72 hours, final clinical outcome, and mortality were not different among patients infected by penicillin-susceptible and penicillin-nonsusceptible *Streptococcus pneumoniae*.