

ชื่อวิทยานิพนธ์	พฤติกรรมการดูแลของพยาบาลในการจัดการกับความปวดตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยที่มีความปวดหลังผ่าตัด
ผู้เขียน	นางสาวชिरาพร สุนทรสวัสดิ์
สาขาวิชา	การพยาบาลผู้ใหญ่
ปีการศึกษา	2545

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้ป่วยที่มีความปวดหลังผ่าตัดและการรับรู้ของพยาบาลต่อพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลในการจัดการกับความปวด และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของผู้ป่วยที่มีความปวดหลังผ่าตัดกับการรับรู้ของพยาบาลต่อพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลในการจัดการกับความปวด โดยผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดจากการประยุกต์แนวคิดเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและพยาบาลของคิง (King, 1981) กับการดูแลและการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยที่มีความปวดหลังผ่าตัด ซึ่งพฤติกรรมในการดูแลของพยาบาลในการจัดการกับความปวด มี 2 ส่วน คือ การประเมินความปวดและการติดตามประเมินผล และการดูแลของพยาบาลในการจัดการกับความปวด

กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องในระยะ 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัดที่พักรักษาอยู่ในหอผู้ป่วยศัลยกรรม และนรีเวช ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยดังกล่าวของโรงพยาบาลในภาคใต้ 2 แห่ง ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการคำนวณ power analysis (power = .80) กลุ่มละ 63 ราย แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และผ่านการทดลองใช้กับผู้ป่วยและพยาบาลจำนวนกลุ่มละ 10 แบบสัมภาษณ์มี 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์พยาบาล และชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่มีความปวดหลังผ่าตัด 24-48 ชั่วโมงแรก และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง โดยสรุปผลการศึกษาดังนี้

1. การรับรู้ของผู้ป่วยที่มีความปวดหลังผ่าตัดต่อพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลในการจัดการกับความปวด พบว่า ผู้ป่วยมีระดับการรับรู้ในเรื่องการประเมินความปวดและการติดตามประเมินผลรวมไปถึงการจัดการกับความปวดของพยาบาลอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คือ 5.65

2. การรับรู้ของพยาบาลต่อพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลในการจัดการกับความปวดพบว่าพยาบาลมีระดับการรับรู้ในเรื่องการประเมินความปวดและการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 14.21 และระดับการรับรู้ในเรื่องการจัดการกับความปวดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 17.03

3. การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของพยาบาลและการรับรู้ของผู้ป่วยที่มีความปวดหลังผ่าตัดต่อพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลในภาพรวมทั้งหมด พบว่า การรับรู้ของพยาบาลและการรับรู้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .001$) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของพฤติกรรมการประเมินความปวด และการติดตามประเมินผล พบว่ามี 16 ใน 18 พฤติกรรมที่ผู้ป่วยและพยาบาลมีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .01$) ส่วนพฤติกรรมของพยาบาลในการจัดการกับความปวด พบว่า ผู้ป่วยและพยาบาลมีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกพฤติกรรม ($p < .01$) ซึ่งในความแตกต่างของการรับรู้ระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย พบว่า จำนวนพยาบาลที่มีการรับรู้ว่าตนเองปฏิบัติมีจำนวนมากกว่าผู้ป่วยทุกพฤติกรรม

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปวางแผนการพัฒนารูปแบบในการดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดหลังผ่าตัดโดยพยาบาลอาจจะต้องให้ข้อมูลในการจัดการกับความปวดกับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจในการจัดการกับความปวด และยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนานุเคราะห์ในเรื่องการจัดการกับความปวด

Thesis Title Nurses ' Caring Behaviors in Pain Management Perceived by
 Nurses and Patients with Post-operative Pain

Author Miss Wachiraporn Soontornsawad

Major Program Adult Nursing

Academic Year 2002

Abstract

This descriptive study aimed at describing the perception of nurses and patients regarding nurses' caring behaviors in pain management of patients with postoperative pain (NCB-PPP) and to examine the differences of nurses' perception and patients' perception regarding NCB- PPP. The researcher constructed the conceptual framework by synthesizing the concept of perception in nurse-patient interaction, the nursing process, and knowledge from pain literature. Two sequential behaviors of nurses' caring behaviors in pain management were conceptualized as "pain assessment-evaluation" and "pain interventions."

A purposive sampling was used to recruit 63 nurses and 63 patients from the surgical wards in two regional hospitals in southern Thailand. The sample size was determined using power analysis to reach a power of .80. Surgical nurses participated in the study were those who had taken care of postoperative patients. Postoperative surgical patients recruited in the study were those who experienced pain during 24-48 hours postoperatively. Two identical sets of questionnaire were constructed based on the conceptual framework of this study in order to measure the perceptions of nurses and patients independently. The questionnaires were validated by three experts and pilot tested with 10 nurses and 10 patients prior to actual data collection. The main finding of this study revealed that post-operative patients perceived that their nurses performed caring behaviors in pain assessment and pain interventions in a very low level ($M=5.65$). In contrast, nurses perceived that they did perform caring behaviors in pain assessment

(M=14.21) and pain interventions (M=17.03) in a very high level. The perception of patients and nurses was significantly different ($p<.001$) of which nurses had higher perception scores than patients. Item analyses revealed that the perceptions of patients and nurses in 16 out of 18 items of pain assessment subscale were significantly different ($p<.01$) whereas all items of pain intervention subscale were significantly different ($p<.01$).

The findings of the study suggest that nurses may need to inform their patients about pain interventions provided as the different perceptions between nurses and patients may have contributed to patients' satisfaction. It is recommended that nursing staff development in the area of pain management is needed.