ชื่อวิทยานิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การสนับสนุนจาก

คู่สมรส กับการปรับตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

ผู้เขียน นางสาวจีณพัต สำราญราษฎร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)

ปีการศึกษา 2548

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การสนับสนุนจากคู่สมรส กับการปรับตัวของผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดมะเร็งเด้านม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งเด้านม จำนวน 96 ราย มาติดตามการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลสูนย์ 3 แห่งในภาคใต้ เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบวัดการรับรู้ความ รุนแรงของการเจ็บป่วย 3) แบบวัดการสนับสนุนจากคู่สมรส และ 4) แบบวัดการปรับตัวของผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม หาค่าความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาก ได้ค่าความ เที่ยงของแบบวัดการสนับสนุนจากคู่สมรส และแบบวัดการปรับตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็ง เต้านม เท่ากับ .84 และ .78 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงบรรยาย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลางกับ การปรับตัว โดยรวม $(\mathbf{r}=-.60,\,\mathbf{p}<.01)$ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับการปรับตัวรายด้าน พบว่าการรับ รู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลางกับการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ และ ด้านบทบาทหน้าที่ $(\mathbf{r}=-.67,\,\mathbf{p}<.01,\,\mathbf{r}=-.43,\,\mathbf{p}<.01$ ตามลำดับ) และมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับ ต่ำกับการปรับตัวด้านสรีระ และด้านการพึ่งพาระหว่างกัน $(\mathbf{r}=-.38,\,\mathbf{p}<.01,\,\mathbf{r}=-.36,\,\mathbf{p}<.01,\,$ ตามลำดับ)

การสนับสนุนจากคู่สมรส มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการปรับตัว โคยรวม ($\mathbf{r}=.42,\,\mathbf{p}<.05$) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับการปรับตัวรายด้าน พบว่าการสนับสนุนจากคู่ สมรสมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ ($\mathbf{r}=.44,\,\mathbf{p}<.01$) และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ ด้านการพึ่งพาระหว่างกัน และด้านสรีระ ($\mathbf{r}=.39,\,\mathbf{p}<.01,\,\mathbf{r}=.25,\,\mathbf{p}<.05,\,\mathbf{r}=.25,\,\mathbf{p}<.05$ ตามถำดับ)

ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาล เพื่อส่งเสริม การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย และการสนับสนุนจากคู่สมรส เพื่อส่งผลต่อการปรับตัวของผู้ ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม Thesis Title The Relationships between Perceived Severity of Illness, Spouse Support,

and Adaptation of Patients with Breast Cancer who have Undergone

Mastectomy

Author Miss Jenaphat Samranrat

Major Program Nursing Science (Adult Nursing)

Academic Year 2005

ABSTRACT

The objectives of this descriptive study were to investigate the relationships between perceived severity of illness, spouse support, and adaptation of patients with breast cancer who had undergone mastectomy. The sample was composed of 96 patients with breast cancer who had undergone mastectomy selected from the out-patient department at three hospitals in southern Thailand. There were 4 instruments used in this study 1) Demographic Data Questionnaire, 2) Perceived Severity of Illness Scale, 3) Personal Resource Questionnaires Part II, and 4) Adaptation of Breast Cancer Questionnaire. Reliability of the Personal Resource Questionnaires Part II and Adaptation of Breast Cancer Questionnaires were tested and Cronbach's alpha coefficients obtained were .84 and .78 respectively. Data were analyzed using Pearson product moment coefficient correlation.

The results revealed that there was statistically significant negative relationship between perceived severity of illness and adaptation of patients with breast cancer who had undergone mastectomy at a moderate level (r = -.60, p < .01). There were statistically significant negative relationships between perceived severity of illness and adaptation in self concept mode and in adaptation in role function mode at moderate levels (r = -.67, p < .01, r = -.43, p < .01 respectively). There were statistically significant negative relationships between perceived severity of illness and adaptation in physiology mode and in adaptation in interdependence mode at low levels (r = -.38, p < .01, r = -.36, p < .01, respectively)

The result also indicated a statistically significant positive relationship between spouse support and adaptation of patients with breast cancer who had undergone mastectomy at a moderate level (r = .42, p < .05). There was a statistically significant positive relationship between

spouse support and adaptation in role function mode at a moderate level (r = .44, p < .01). There were statistically significant positive relationships between spouse support and adaptation in self concept mode, adaptation in interdependence mode, and adaptation in physiology mode at low levels (r = .39, p < .01, r = .25, p < .05, r = .25, p < .05 respectively).

The results of this study could contribute to nursing care in promoting perceived severity of illness and enhanced spouse support to improve adaptation of patients with breast cancer who had undergone mastectomy.