

## ภาคผนวก ก

### ผลการศึกษาเพิ่มเติม

#### ตาราง ก 1

ความถี่ และร้อยละของผู้ป่วยไทยเรื่องที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำแนกตามอาการขณะที่กำลังฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และจำนวนยาที่รับประทาน/ยาฉีดประจำ

| ข้อมูลส่วนบุคคล                                   | ความถี่ | ร้อยละ |
|---|---------|--------|
| <b>อาการขณะที่กำลังฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม</b> |         |        |
| ตะคริว  | 48      | 65.8   |
| ความดันโลหิตต่ำ                                   | 40      | 54.8   |
| ความดันโลหิตสูง                                   | 38      | 52.1   |
| ปวดศีรษะ  | 17      | 23.3   |
| อ่อนเพลีย   | 9       | 12.3   |
| กัน   | 5       | 6.8    |
| เจ็บหน้าอก  | 3       | 4.1    |
| คลื่นไส้อาเจียน                                   | 1       | 1.4    |
| น้ำตาลในเลือดต่ำ                                  | 1       | 1.4    |
| <b>จำนวนยาที่รับประทาน/ยาฉีดประจำ</b>             |         |        |
| ยาลดความเป็นกรดในเลือด                            | 65      | 89.0   |
| ยาลดความดันโลหิต                                  | 64      | 87.7   |
| วิตามิน   | 64      | 87.7   |
| ยาจับฟอสเฟต                                       | 63      | 86.3   |
| ยาฉีดรักษาภาวะเลือดจาง                            | 60      | 82.2   |
| ยาเสริมธาตุเหล็กชนิดรับประทาน                     | 58      | 79.5   |
| วิตามินดี   | 17      | 23.3   |
| ยาขับปัสสาวะ                                      | 17      | 23.3   |
| ยาด้านเกล็ดเลือด                                  | 14      | 19.2   |
| ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด                            | 13      | 17.8   |
| ยานอนหลับ/ยาลดความเครียด                          | 13      | 17.8   |

**ตาราง ก 1 (ต่อ)**

| ข้อมูลส่วนบุคคล | ความถี่ | ร้อยละ |
|-----------------|---------|--------|
| ยาลดกรดยูริก    | 12      | 16.4   |
| ยารักษาโรคหัวใจ | 7       | 9.6    |
| ยาคลาย          | 7       | 9.6    |
| ยาลดอาการคัน    | 5       | 6.8    |

## ตาราง ก 2

เปรียบเทียบความต้องการกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้ป่วย โดยวิเคราะห์ที่รักษาด้วยเครื่องไม้เทียมรายข้อ ตามการรับรู้ของผู้ป่วย

| กิจกรรมหรือเหตุการณ์   | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ |      |         |      |                   | ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ |      |         |      |                   | paired t-test |
|--|----------------------------------|------|---------|------|-------------------|--------------------------------|------|---------|------|-------------------|---------------|
|  | ไม่เลย                           | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย                         | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) |               |
| <b>ด้านอารมณ์</b>  |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |               |
| 1. การช่วยในการผ่อนคลายความเครียด เช่น การพูดคุยกายอกลือ   | 49.3                             | 26.0 | 19.2    | 5.5  | 0.81<br>(0.94)    | 46.6                           | 26.0 | 21.9    | 5.5  | 0.86<br>(0.95)    | - .70 ns      |
| 2. การรับฟังความรู้สึก รับฟังความคับข้องใจ และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน                             | 43.8                             | 31.5 | 15.1    | 9.6  | 0.90<br>(0.99)    | 41.1                           | 30.1 | 19.2    | 9.6  | 0.97<br>(1.00)    | - .86 ns      |
| 3. การช่วยปลอบ哄ใจให้กำลังใจเมื่อรู้สึกเบื่อหน่ายและห้อแท้  | 43.8                             | 32.9 | 15.1    | 8.2  | 0.88<br>(0.96)    | 34.2                           | 35.6 | 19.2    | 11.0 | 1.07<br>(0.99)    | -2.16*        |
| 4. การสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการเข้าสังคม เช่น การได้เข้าร่วมทำบุญทางศาสนา การได้ร่วมงานประเพณีต่างๆ             | 37.0                             | 28.8 | 11.0    | 23.3 | 1.21<br>(1.18)    | 27.4                           | 32.9 | 19.2    | 20.5 | 1.33<br>(1.09)    | -1.29 ns      |
| 5. การได้รับการสัมผัส เช่น การสัมผัสมือเบาๆ การลูบคลำส่วนที่ไม่สูบ สนับยเมื่อมีอาการพิคปกติ หรือรู้สึกไม่สุขสบาย | 24.7                             | 26.0 | 19.2    | 30.1 | 1.55<br>(1.17)    | 21.9                           | 19.2 | 27.4    | 31.5 | 1.68<br>(1.14)    | -1.64 ns      |

\*p<.05 ns = non significant

ตาราง ก 2 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์   | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ |      |         |      |                   | ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ |      |         |      |                   | paired<br>t-test    |
|--|----------------------------------|------|---------|------|-------------------|--------------------------------|------|---------|------|-------------------|---------------------|
|  | ไม่เลย                           | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย                         | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) |                     |
| <b>ด้านอารมณ์ (ต่อ)</b>  |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |                     |
| 6.การช่วยให้เพลิด<br>เพลินในสิ่งที่ชอบ เช่น<br>ได้ดูทีวี ได้ฟังวิทยุ ได้<br>เลี้ยงสัตว์หรือทำงาน<br>อดิเรกที่ชอบ                   | 50.7                             | 13.7 | 11.0    | 24.7 | 1.10<br>(1.27)    | 46.6                           | 13.7 | 12.3    | 27.4 | 1.21<br>(1.29)    | -1.58 <sup>ns</sup> |
| 7.การช่วยให้รับรู้เรื่องราว<br>สารการอธิบายเรื่องราว<br>ต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลด้าน<br>ค่าใช้จ่ายในการรักษา<br>เช่นสิทธิประโยชน์ต่างๆ | 47.9                             | 34.2 | 6.8     | 11.0 | 0.81<br>(0.98)    | 46.6                           | 30.1 | 15.1    | 8.2  | 0.85<br>(0.97)    | 0.46 <sup>ns</sup>  |
| 8.การช่วยแสวงหาข้อมูล<br>ด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการ<br>รักษาที่ทันสมัยเกี่ยวกับ<br>โรค ไตรมาสฟอกเลือดการ<br>เปลี่ยนไต                | 42.5                             | 34.2 | 9.6     | 13.7 | 0.95<br>(1.04)    | 39.7                           | 34.2 | 16.4    | 9.6  | 0.96<br>(0.98)    | -1.14 <sup>ns</sup> |
| 9.การมีที่ปรึกษามีเมื่อมี<br>ปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บ<br>ป่วย   | 16.4                             | 30.1 | 26.0    | 27.4 | 1.64<br>(1.06)    | 17.8                           | 21.9 | 34.2    | 26.0 | 1.68<br>(1.05)    | -0.59 <sup>ns</sup> |
| 10.การช่วยเหลือเมื่อ<br>ต้องการติดต่อกับแพทย์<br>หรือพยาบาลเพื่อขอ<br>คำแนะนำสอนด้าน<br>อาการและอธิบาย<br>ปัญหาต่างๆ               | 42.5                             | 8.2  | 12.3    | 37.0 | 1.44<br>(1.36)    | 34.8                           | 1.4  | 12.3    | 47.9 | 1.70<br>(1.40)    | -3.56**             |

\*\*p&lt;.01 ns = non significant

ตาราง ก 2 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์  | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ |      |         |      |                   | ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ |      |         |      |                   | paired<br>t-test    |
|---|----------------------------------|------|---------|------|-------------------|--------------------------------|------|---------|------|-------------------|---------------------|
|   | ไม่เลย                           | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย                         | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) |                     |
| <b>ด้านข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)</b>  |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |                     |
| 11. การช่วยเหลือให้ได้ พมประคุคคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร            | 58.9                             | 15.1 | 11.0    | 15.1 | 0.82<br>(1.13)    | 63.0                           | 8.2  | 12.3    | 16.4 | 0.82<br>(1.18)    | .00 <sup>ns</sup>   |
| ในการดูแลตนเองกับผู้ป่วยโรคไตด้วยกัน                                      |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |                     |
| 12. การช่วยเตือนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์/พยาบาล                       | 50.7                             | 30.1 | 13.7    | 5.5  | 0.74<br>(0.90)    | 19.2                           | 16.4 | 24.7    | 39.7 | 1.85<br>(1.15)    | -8.93**             |
| ด้านการประเมินค่า   |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |                     |
| 13. การที่ครอบครัวรับฟังขอความคิดเห็นชุมชนเมืองปัจจุบันตัวได้ถูกต้อง      | 11.00                            | 12.3 | 34.2    | 42.5 | 2.08<br>(1.00)    | 9.6                            | 21.9 | 27.4    | 41.1 | 2.00<br>(1.01)    | 1.00 <sup>ns</sup>  |
| ให้คำชี้แจงเมื่อปัจจุบัน  |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |                     |
| 14. การที่ครอบครัวให้คำชี้แจงเมื่อมีปัญหา                                 | 13.7                             | 28.8 | 27.4    | 30.1 | 1.74<br>(1.04)    | 9.6                            | 28.8 | 30.1    | 31.5 | 1.84<br>(0.99)    | -1.35 <sup>ns</sup> |
| ในการทำงานจากบุคคลในครอบครัวต่างๆ   |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |                     |
| 15. การได้รับความเห็นอกเห็นใจยอมรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ | 0                                | 0    | 8.2     | 91.8 | 2.92<br>(0.28)    | 0                              | 1.4  | 8.2     | 90.4 | 2.89<br>(0.36)    | .57 <sup>ns</sup>   |
| ครอบครัวเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ                        |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |                     |
| 16. ครอบครัวเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ                    | 0                                | 1.4  | 2.7     | 95.9 | 2.95<br>(0.28)    | 0                              | 1.4  | 2.7     | 95.9 | 2.95<br>(0.28)    | .00 <sup>ns</sup>   |

\*\*p&lt;.01 ns = non significant

ตาราง ก 2 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์  | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ |      |         |      |                   | ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ |      |         |                |                   | paired<br>t-test    |
|---|----------------------------------|------|---------|------|-------------------|--------------------------------|------|---------|----------------|-------------------|---------------------|
|   | ไม่เลย                           | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย                         | น้อย | ปานกลาง | มาก            | $\bar{x}$<br>(SD) |                     |
| <b>ด้านอารมณ์ (ต่อ)</b>   |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |                |                   |                     |
| การรักษาที่กำลังได้รับอยู่  |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |                |                   |                     |
| ค้านทรัพยากร  |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |                |                   |                     |
| 17. การช่วยเหลือเมื่อมีอาการไม่สุขสบาย เช่น ช่วยเก็บวามีอาการคัน ช้ำบีบ นวดให้เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเป็นตะคริว | 30.1                             | 21.9 | 17.8    | 30.1 | 1.48<br>(1.21)    | 28.8                           | 17.8 | 21.9    | 31.5<br>(1.21) | 1.56              | -1.42 <sup>ns</sup> |
| 18. การช่วยเหลือใน การซั่งและการประเมิน น้ำหนักตัวทุกวัน  | 61.11                            | 15.1 | 9.6     | 8.2  | 0.59<br>(0.97)    | 46.6                           | 16.4 | 15.1    | 21.9<br>(1.22) | 1.12              | -5.36**             |
| 19. การช่วยเหลือใน เรื่องพาหนะเมื่อต้องเดินทางไปฟอกเลือด เช่น การจัดรถรับส่งให้                                   | 17.8                             | 11.0 | 13.7    | 57.5 | 2.11<br>(1.19)    | 12.3                           | 16.4 | 11.0    | 60.3<br>(1.11) | 2.19              | .92 <sup>ns</sup>   |
| 20. การเดินทางไปเป็นเพื่อนและช่วยดูแลในขณะที่ฟอกเลือดหรือเวลาที่ต้องพับแพท์ตามนัด                                 | 13.7                             | 19.2 | 12.3    | 54.8 | 2.08<br>(1.14)    | 9.6                            | 23.3 | 8.2     | 58.9<br>(1.09) | 2.16              | -1.06 <sup>ns</sup> |
| 21. การช่วยเหลือเมื่อต้องการที่จะเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือทำธุระ  | 23.3                             | 42.5 | 13.7    | 20.5 | 1.32<br>(1.05)    | 26.0                           | 39.7 | 15.1    | 19.2<br>(1.06) | 1.27              | .50 <sup>ns</sup>   |

\*\*p&lt;.01 ns = non significant

ตาราง ก 2 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์  | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ |      |         |      |                   | ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ |      |         |      |                   | paired<br>t-test    |
|---|----------------------------------|------|---------|------|-------------------|--------------------------------|------|---------|------|-------------------|---------------------|
|   | ไม่เลย                           | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย                         | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) |                     |
| <b>ค้านทรัพยากร (ต่อ)</b>   |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |                     |
| 22.การช่วยเหลือใน<br>เรื่องการออกกำลังกาย   | 83.6                             | 9.5  | 5.5     | 1.4  | 0.25<br>(0.62)    | 83.6                           | 5.5  | 5.5     | 2.7  | 0.25<br>(0.68)    | .00 <sup>ns</sup>   |
| เช่นการเดิน หรือการ<br>บริหารกล้ามเนื้อข้อ  |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |                     |
| 23.การจัดสิ่งแวดล้อม<br>ให้สามารถนั่งพักผ่อน  | 23.3                             | 16.4 | 21.9    | 38.4 | 1.75<br>(1.20)    | 21.9                           | 15.1 | 17.8    | 45.2 | 1.86<br>(1.22)    | -1.27 <sup>ns</sup> |
| ได้ เช่น การจัดที่นอน<br>ดูแลแสงและเสียง  |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |                     |
| การถ่ายเทอากาศ  |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |                     |
| 24.การช่วยสังเกตสิ่ง<br>ผิดปกติที่เกิดกับร่างกาย  | 43.8                             | 27.4 | 19.2    | 9.6  | 0.95<br>(1.01)    | 30.1                           | 20.5 | 23.3    | 26.0 | 1.45<br>(1.18)    | -5.18**             |
| เช่น อาการบวม เป็น<br>ไข้ผิวหนังบริเวณสาย<br>สันหลังฟอกเลือด<br>อักเสบเป็นหนอง              |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |                     |
| 25.การดูแลให้ได้รับ<br>ยาตามแผนการรักษา   | 80.8                             | 1.4  | 6.8     | 11.0 | 0.48<br>(1.03)    | 76.7                           | 4.1  | 5.5     | 13.7 | 0.56<br>(1.09)    | -2.17**             |
| ของแพทย์  |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |                     |
| 26.การจัดเครื่องดื่มที่<br>ไม่มีส่วนผสมของ ชา<br>กาแฟหรือยาดกอหอส์<br>และช่วยจำกัดปริมาณน้ำ | 69.9                             | 17.8 | 9.6     | 2.7  | 0.45<br>(0.78)    | 42.5                           | 17.8 | 23.3    | 16.4 | 1.14<br>(1.15)    | -6.65**             |
| ตามแผนการรักษาของ<br>แพทย์  |                                  |      |         |      |                   |                                |      |         |      |                   |                     |

\*\*p&lt;.01 ns = non significant

ตาราง ก 2 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์  | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ |           |              |          |                   | ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ |           |              |          |                   | paired<br>t-test    |
|---|----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|---------------------|
|   | ไม่เลย<br>0                      | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย<br>0                    | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) |                     |
| <b>ด้านทรัพยากร (ต่อ)</b>   |                                  |           |              |          |                   |                                |           |              |          |                   |                     |
| 27.การช่วยเหลือใน<br>การทำกิจวัตรประจำวัน<br>ที่บ้านช่วยการเคลื่อน<br>ข้ายลงจากเตียง ลุก<br>จากเก้าอี้หรือการเดิน | 89.0                             | 9.6       | 1.4          | 0        | 0.12<br>(0.37)    | 83.6                           | 13.7      | 1.4          | 1.4      | 0.21<br>(0.53)    | -2.17**             |
| 28.การจัดเตรียมอาหาร<br>ที่ขอบรับประทานและ<br>เหมาะสมกับโรค เช่น<br>อาหารรสจีด อาหาร<br>ไขมันต่ำ                  | 12.3                             | 13.7      | 35.6         | 38.4     | 2.00<br>(1.01)    | 8.2                            | 12.3      | 19.2         | 60.3     | 2.32<br>(0.98)    | -3.30**             |
| 29.การช่วยเหลือเมื่อ<br>มีอาการผิดปกติ เช่น<br>ห้องผูกหรือห้องเสีย  | 78.1                             | 11.0      | 4.1          | 6.8      | 0.40<br>(0.86)    | 78.1                           | 8.2       | 4.1          | 9.6      | 0.45<br>(0.96)    | -1.65 <sup>ns</sup> |
| 30.การช่วยกระตุนให้<br>ได้รับอาหารอย่างเพียง<br>พอ แม้จะมีอาการเบื่อ<br>อาหาร                                     | 54.8                             | 28.8      | 11.0         | 5.5      | 0.67<br>(0.88)    | 30.1                           | 21.9      | 19.2         | 28.8     | 1.47<br>(1.20)    | -6.28**             |
| 31.การช่วยเหลือใน<br>การทำงานบ้าน   | 5.5                              | 26.0      | 24.7         | 43.8     | 2.07<br>(0.96)    | 5.5                            | 15.1      | 12.3         | 67.1     | 2.41<br>(0.94)    | -4.00**             |
| 32.การจัดหาอุปกรณ์<br>เครื่องใช้ที่จำเป็นภายในบ้าน  | 15.1                             | 34.2      | 26.0         | 24.7     | 1.60<br>(1.02)    | 11.0                           | 34.2      | 32.9         | 21.9     | 1.66<br>(0.95)    | -.94 <sup>ns</sup>  |
| 33.การช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล  | 21.9                             | 17.8      | 2.7          | 57.5     | 1.96<br>(1.28)    | 15.1                           | 17.8      | 5.5          | 61.6     | 2.41<br>(1.18)    | -2.71*              |

\*p&lt;.05 \*\*p&lt;.01 ns = non significant

## ตาราง ก 2 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์                                  | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ |           |              |          |                   | ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ |           |              |          |                   | paired<br>t-test   |
|---|----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|--------------------|
|   | ไม่เลย<br>0                      | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย<br>0                    | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) |                    |
| <b>ด้านทรัพยากร (ต่อ)</b>                                 |                                  |           |              |          |                   |                                |           |              |          |                   |                    |
| 34.การช่วยหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้เพียงพอ | 2.7                              | 5.5       | 11.0         | 80.8     | 2.7<br>(0.70)     | 1.4                            | 9.6       | 15.1         | 74.0     | 2.62<br>(0.72)    | 1.51 <sup>ns</sup> |
| 35.การเก็บออมรายได้บางส่วนไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน          | 5.5                              | 4.1       | 8.2          | 82.2     | 2.67<br>(0.80)    | 4.1                            | 5.5       | 21.9         | 68.5     | 2.55<br>(0.78)    | 1.53 <sup>ns</sup> |
| 36.การช่วยเหลือเมื่อป่วยหนักและจัดการกับภารกิจ            | 0                                | 1.4       | 4.1          | 94.5     | 2.93<br>(0.30)    | 0                              | 0         | 9.6          | 90.4     | 2.90<br>(0.30)    | 0.63 <sup>ns</sup> |
| 37.การช่วยเหลือด้านการจัดการกับมรดกหรือหนี้สิน            | 59.8                             | 12.3      | 17.8         | 11.0     | 0.81<br>(1.09)    | 49.3                           | 12.3      | 23.3         | 15.1     | 1.04<br>(1.16)    | -3.24*             |

\*p&lt;.05 ns = non significant

## ตาราง ก 3

เปรียบเทียบความต้องการการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้ป่วย ไตรายเรื่องที่รักษาด้วยเครื่องใจเทียนรายชื่อ ตามการรับรู้ของผู้ป่วยและของครอบครัว และค่า t

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์                        | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ |           |              |          |                   | ตอนที่ 2 ความต้องการการช่วยเหลือ |           |              |          |                   | Independen<br>t-test |
|---|----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|----------------------|
|   | ไม่เลย<br>0                      | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย<br>0                      | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) |                      |
| <b>ด้านอารมณ์</b>                               |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| 1. การช่วยในการผ่อนคลายความเครียดเช่น           | 49.3                             | 26        | 19.2         | 5.5      | 0.81<br>(0.94)    | 12.3                             | 6.8       | 5.2          | 24.7     | 1.93<br>(0.90)    | -7.37**              |
| การพูดคุยกายอกลือ                               |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| 2. การรับฟังความรู้สึก                          | 43.8                             | 31.5      | 15.1         | 8.2      | 0.90<br>(0.99)    | 11.0                             | 12.3      | 47.9         | 28.8     | 1.95<br>(0.93)    | -6.57**              |
| รับฟังความคับข้องใจ<br>และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิด |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| ขึ้นในชีวิตประจำวัน                             |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| 3. การช่วยปลอบ哄ใจให้กำลังใจเมื่อรู้สึกเบื่อ     | 43.8                             | 32.9      | 15.1         | 8.2      | 0.88<br>(0.99)    | 12.3                             | 4.1       | 39.7         | 43.8     | 2.15<br>(0.98)    | -7.94**              |
| หน่ายและห้อแท้                                  |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| 4. การสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการเข้า            | 37.0                             | 28.8      | 11.0         | 23.3     | 1.21<br>(1.18)    | 6.8                              | 23.3      | 38.4         | 31.5     | 1.95<br>(0.91)    | -4.24**              |
| สังคม เช่น การได้เข้า                           |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| ร่วมทำบุญทางศาสนา                               |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| การได้ร่วมงาน                                   |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| ประเพณีต่างๆ                                    |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| 5. การได้รับการดูแลด้วยความรัก                  | 24.7                             | 26.0      | 19.2         | 30.1     | 1.55<br>(1.17)    | 4.1                              | 15.1      | 27.4         | 53.4     | 2.30<br>(0.88)    | -4.41**              |
| เช่น การสัมผัสมือเบาๆ                           |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| การลูบคลำส่วนที่ไม่สุข                          |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| พยายามเมื่ออาการพิดปกติ                         |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| หรือรู้สึกไม่สุขพยายาม                          |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |

\*\*p&lt;.01

ตาราง ก 3 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์  | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ<br>ดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ผู้ป่วย (รือขอของผู้ป่วย) |           |              |          |                   | ตอนที่ 2 ความต้องการการช่วยเหลือ<br>ดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ครอบครัว (รือขอของครอบครัว) |           |              |          |                   |                      |
|---|---|-----------|--------------|----------|-------------------|---|-----------|--------------|----------|-------------------|----------------------|
|   | ไม่เลย<br>0   | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย<br>0   | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) | Independen<br>t-test |
| <b>ด้านอารมณ์ (ต่อ)</b>   |   |           |              |          |                   |   |           |              |          |                   |                      |
| 6.การช่วยให้เพลิด<br>เพลินในสิ่งที่ชอบ เช่น<br>ได้ดูทีวี ได้ฟังวิทยุ ได้<br>เลี้ยงสัตว์หรือทำงาน<br>อดิเรกที่ชอบ                  | 50.7  | 13.7      | 11.0         | 24.7     | 1.10<br>(1.27)    | 16.4  | 4.1       | 28.8         | 50.7     | 2.14<br>(1.10)    | -5.23**              |
| <b>ด้านข้อมูลข่าวสาร</b>  |   |           |              |          |                   |   |           |              |          |                   |                      |
| 7.การช่วยให้รับรู้ข่าว<br>สารการอธิบายเรื่องราว<br>ต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลด้าน<br>ค่าใช้จ่ายในการรักษา<br>เช่นสิทธิประโยชน์ต่างๆ     | 47.9  | 34.2      | 6.8          | 11.0     | 0.81<br>(0.98)    | 16.4  | 12.3      | 31.5         | 39.7     | 1.95<br>(1.09)    | -6.62**              |
| 8.การช่วยแสวงหาข้อ <sup>*</sup><br>มูลข่าวสารเกี่ยวกับการ<br>รักษาที่พันสมัยเกี่ยวกับ<br>โรคโดยการฟอกเลือดการ<br>เปลี่ยนไต        | 42.5  | 34.2      | 9.6          | 13.7     | 0.95<br>(1.04)    | 13.7  | 30.1      | 32.9         | 23.3     | 1.66<br>(0.99)    | -4.24**              |
| 9.การนิ่งที่ปรึกษามีเมื่อมี<br>ปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บ<br>ป่วย  | 16.4  | 30.1      | 26.0         | 27.4     | 1.64<br>(1.06)    | 8.2   | 13.7      | 34.2         | 43.8     | 2.14<br>(0.95)    | -2.97*               |
| 10.การช่วยเหลือเมื่อ <sup>*</sup><br>ต้องการติดต่อกับแพทย์<br>หรือพยาบาลเพื่อขอ<br>คำแนะนำสอนด้าน<br>อาการและอธิบาย<br>ปัญหาต่างๆ | 42.5  | 8.2       | 12.3         | 37.0     | 1.44<br>(1.36)    | 13.7  | 6.8       | 23.3         | 56.2     | 2.22<br>(1.07)    | -3.84**              |

\*p&lt;.05 \*\*p&lt;.01

ตาราง ก 3 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์   | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ |           |              |          |                   | ตอนที่ 2 ความต้องการการช่วยเหลือ |           |              |          |                   | Independen<br>t-test |
|--|----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|----------------------|
|  | ไม่เลย<br>0                      | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย<br>0                      | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) |                      |
| <b>ด้านข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)</b>   |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| 11. การช่วยเหลือให้ได้ พมประคุณเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในการดูแลตนเองกับผู้ป่วยโรคไตด้วยกัน | 58.9                             | 15.1      | 11.0         | 15.1     | 0.82<br>(1.13)    | 19.2                             | 16.4      | 35.6         | 28.8     | 1.74<br>(1.08)    | -5.00**              |
| 12. การช่วยเตือนให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์/พยาบาล                                  | 50.7                             | 30.1      | 13.7         | 5.5      | 0.74<br>(0.90)    | 15.1                             | 19.2      | 28.8         | 37.0     | 1.88<br>(1.08)    | -6.92**              |
| <b>ด้านการประเมินค่า</b>   |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| 13. การที่ครอบครัวรับฟังขอความคิดเห็นชุมชนเมืองปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง                              | 11.0                             | 12.3      | 34.2         | 42.5     | 2.08<br>(1.00)    | 8.2                              | 8.2       | 53.3         | 30.1     | 2.05<br>(0.85)    | -.18 ns              |
| 14. การที่ครอบครัวให้คำชี้แจงเมื่อมีปัญหา  | 13.7                             | 28.8      | 27.4         | 30.1     | 1.74<br>(1.04)    | 5.5                              | 19.2      | 42.5         | 32.9     | 2.03<br>(0.87)    | -1.82 ns             |
| <b>เงิน</b>  |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| 15. การได้รับความเห็นอกเห็นใจยอมรับในการทำงานจากบุคคลในครอบครัวต่างๆ                             | 0                                | 0         | 8.2          | 91.8     | 2.92<br>(0.28)    | 2.7                              | 1.4       | 28.8         | 67.1     | 2.60<br>(0.66)    | 3.76**               |
| 16. ครอบครัวเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ   | 0                                | 1.4       | 2.7          | 95.9     | 2.95<br>(0.28)    | 4.1                              | 0         | 17.8         | 78.1     | 2.70<br>(0.68)    | 2.86**               |

\*\*p&lt;.01 ns = non significant

ตาราง ก 3 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์                                 | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ |      |         |      |                   | ตอนที่ 2 ความต้องการการช่วยเหลือ |      |         |                |                   | Independen<br>t-test |
|--|----------------------------------|------|---------|------|-------------------|----------------------------------|------|---------|----------------|-------------------|----------------------|
|  | ไม่เลย                           | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย                           | น้อย | ปานกลาง | มาก            | $\bar{x}$<br>(SD) |                      |
| ด้านอารมณ์ (ต่อ)   |                                  |      |         |      |                   |                                  |      |         |                |                   |                      |
| การรักษาที่กำลังได้รับอยู่                               |                                  |      |         |      |                   |                                  |      |         |                |                   |                      |
| ด้านทรัพยากร   |                                  |      |         |      |                   |                                  |      |         |                |                   |                      |
| 17. การช่วยเหลือเมื่อมีอาการไม่สุขสบาย เช่น ช่วยเก็บภาระ | 30.1                             | 21.9 | 17.8    | 30.1 | 1.48<br>(1.21)    | 8.2                              | 5.5  | 30.1    | 56.2<br>(0.92) | 2.34              | 4.77**               |
| อาการคัน ชาบีบีน ปวดเมื่อยหรือเป็นตะคริว                 | 61.1                             | 15.1 | 9.6     | 8.2  | 0.59<br>(0.97)    | 27.4                             | 24.7 | 28.8    | 19.2<br>(1.09) | 1.40              | -4.73**              |
| การชั่งและการประเมินน้ำหนักตัวทุกวัน                     | 17.8                             | 11.0 | 13.7    | 57.5 | 2.11<br>(1.19)    | 2.7                              | 5.5  | 19.2    | 72.6<br>(0.72) | 2.62              | -3.12**              |
| เดินทางไปฟอกเลือด เช่น การจัดรถรับส่งให้                 | 13.7                             | 19.2 | 12.3    | 54.8 | 2.08<br>(1.14)    | 2.7                              | 11.0 | 17.8    | 68.5<br>(0.80) | 2.52              | -2.69**              |
| ตามนัด   | 23.3                             | 42.5 | 13.7    | 20.5 | 1.32<br>(1.05)    | 8.2                              | 23.3 | 34.2    | 34.2<br>(0.96) | 1.95              | -3.69**              |
| ไปเยี่ยมญาติหรือทำธุระ                                   |                                  |      |         |      |                   |                                  |      |         |                |                   |                      |

\*\*p&lt;.01

ตาราง ก 3 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์  | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ |           |              |          |                   | ตอนที่ 2 ความต้องการการช่วยเหลือ |           |              |          |                   | Independen<br>t-test |
|---|----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|----------------------|
|   | ไม่เลย<br>0                      | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย<br>0                      | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) |                      |
| <b>ด้านทรัพยากร (ต่อ)</b>   |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| 22. การช่วยเหลือใน<br>เรื่องการออกกำลังกาย  | 83.6                             | 9.5       | 5.5          | 1.4      | 0.25<br>(0.62)    | 27.4                             | 23.3      | 24.7         | 24.7     | 1.47<br>(1.14)    | -8.01**              |
| เช่นการเดิน หรือการ<br>บริหารกล้ามเนื้อข้อ  |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| 23. การจัดสิ่งแวดล้อม<br>ให้สามารถอนพักผ่อน<br>ได้ เช่น การจัดที่นอน<br>ดูแลแสงและเสียง<br>การถ่ายท่าอากาศ                        | 23.3                             | 16.4      | 21.9         | 34.8     | 1.75<br>(1.20)    | 6.8                              | 11.0      | 39.7         | 42.5     | 2.18<br>(0.89)    | -2.43*               |
| 24. การช่วยสังเกตสิ่ง<br>ผิดปกติที่เกิดกับร่างกาย<br>เช่น อาการบวม เป็น<br>ไข้ผิวนังบริเวณสาย<br>สำหรับฟอกเลือด<br>อักเสบเป็นหนอง | 43.8                             | 27.4      | 19.2         | 9.6      | 0.95<br>(1.01)    | 12.3                             | 13.7      | 32.9         | 41.1     | 2.03<br>(1.03)    | -6.41**              |
| 25. การดูแลให้ได้รับ<br>ยาตามแผนการรักษา<br>ของแพทย์  | 80.8                             | 1.4       | 6.8          | 11.0     | 0.48<br>(1.03)    | 21.9                             | 8.2       | 17.8         | 52.1     | 2.00<br>(1.22)    | -8.12**              |
| 26. การจัดเครื่องคิมที่<br>ไม่มีส่วนผสมของ ชา<br>กาแฟหรือยาลกอชอล์<br>และช่วยจำกัดปริมาณน้ำ<br>ตามแผนการรักษาของ<br>แพทย์         | 69.9                             | 17.8      | 96.0         | 2.7      | 0.45<br>(0.78)    | 24.7                             | 31.5      | 21.9         | 21.9     | 1.41<br>(1.09)    | -6.10**              |

\*p &lt;.05 \*\*p &lt; .01

ตาราง ก 3 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์  | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ |           |              |          |                   | ตอนที่ 2 ความต้องการการช่วยเหลือ |           |              |          |                   | Independen<br>t-test |
|---|----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|----------------------|
|   | ไม่เลย<br>0                      | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย<br>0                      | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) |                      |
| <b>ด้านทรัพยากร (ต่อ)</b>   |                                  |           |              |          |                   |                                  |           |              |          |                   |                      |
| 27. การช่วยเหลือใน<br>การทำกิจวัตรประจำวัน<br>ที่บ้านช่วยการเคลื่อน<br>ข้ายลังจากเตียง ลูก<br>จากเก้าอี้หรือการเดิน | 89.0                             | 9.6       | 1.4          | 0        | 0.12<br>(0.37)    | 31.5                             | 24.7      | 21.9         | 21.9     | 1.34<br>(1.15)    | -8.65**              |
| 28. การจัดเตรียมอาหาร<br>ที่ขอบรับประทานและ<br>เหมาะสมกับโรค เช่น<br>อาหารรสจีด อาหาร<br>ไขมันต่ำ                   | 12.3                             | 13.7      | 35.6         | 38.4     | 2.00<br>(1.01)    | 12.3                             | 13.7      | 28.8         | 45.2     | 2.07<br>(1.05)    | -.40 <sup>ns</sup>   |
| 29. การช่วยเหลือเมื่อ<br>มีอาการผิดปกติ เช่น<br>ห้องผูกหรือห้องเสีย   | 78.1                             | 11.0      | 4.1          | 6.8      | 0.40<br>(0.86)    | 20.5                             | 20.5      | 26.0         | 32.9     | 1.71<br>(1.14)    | -7.88**              |
| 30. การช่วยกระตุนให้<br>ได้รับอาหารอย่างเพียง<br>พอ แม้จะมีอาการเบื่อ<br>อาหาร                                      | 54.8                             | 28.8      | 11.0         | 5.5      | 0.67<br>(0.88)    | 16.4                             | 17.8      | 31.5         | 34.2     | 1.84<br>(1.08)    | -7.13**              |
| 31. การช่วยเหลือใน<br>การทำงานบ้าน  | 5.5                              | 26.0      | 24.7         | 43.8     | 2.07<br>(0.96)    | 4.1                              | 17.8      | 35.6         | 42.5     | 2.16<br>(0.87)    | -.63 <sup>ns</sup>   |
| 32. การจัดหาอุปกรณ์<br>เครื่องใช้ที่จำเป็นภายในบ้าน   | 15.1                             | 34.2      | 26.0         | 24.7     | 1.60<br>(1.02)    | 6.8                              | 19.2      | 41.1         | 32.9     | 2.00<br>(0.90)    | -2.49*               |
| 33. การช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล   | 21.9                             | 17.8      | 2.7          | 57.5     | 1.96<br>(1.28)    | 11.0                             | 19.2      | 11.0         | 58.9     | 2.18<br>(1.10)    | -1.10 <sup>ns</sup>  |

\*p &lt;.05 \*\*p &lt;..01 ns = non significant

ตาราง ก 3 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์                                   | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ                             |      |         |      |                   | ตอนที่ 2 ความต้องการการช่วยเหลือ                               |      |         |      |                   | Independen<br>t-test |
|--|--|------|---------|------|-------------------|--|------|---------|------|-------------------|----------------------|
|  | ดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ผู้ป่วย (ร้อยละของผู้ป่วย) |      |         |      |                   | ดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ครอบครัว (ร้อยละของครอบครัว) |      |         |      |                   |                      |
|  | ไม่เลย   | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย   | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) | Independen<br>t-test |
| <b>ด้านทรัพยากร (ต่อ)</b>                                  |  |      |         |      |                   |  |      |         |      |                   |                      |
| 34. การช่วยหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้เพียงพอ | 2.7  | 5.5  | 11.0    | 80.8 | 2.70<br>(0.70)    | 6.8  | 16.4 | 20.5    | 56.2 | 2.26<br>(0.97)    | 3.13**               |
| 35. การเก็บออมรายได้บางส่วนไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน          | 5.5  | 4.1  | 8.2     | 82.2 | 2.67<br>(0.80)    | 8.2  | 16.4 | 27.4    | 47.9 | 2.25<br>(0.98)    | 3.51**               |
| 36. การช่วยเหลือเมื่อป่วยหนักและจัดการกับภารกิจ            | 0  | 1.4  | 4.1     | 94.5 | 2.93<br>(0.30)    | 2.7  | 5.5  | 23.3    | 68.5 | 2.85<br>(0.72)    | 3.87**               |
| 37. การช่วยเหลือด้านการจัดการกับมรดกหรือหนี้สิน            | 59.8   | 12.3 | 17.8    | 11.0 | 0.81<br>(1.09)    | 32.9   | 19.2 | 26.0    | 21.9 | 1.37<br>(1.16)    | -3.01**              |

\*\*p&lt;.01

## ตาราง ก 4

เปรียบเทียบการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้ป่วย ไตรายเรื่องที่รักษาด้วยเครื่องใจเทียมรายข้อตามการรับรู้ของผู้ป่วยและของครอบครัว และค่า t

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์  | ตอนที่ 1 การได้รับการช่วยเหลือ |           |              |          |                   | ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ |           |              |          |                   | Independen<br>t-test |
|---|--------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|----------------------|
|   | ไม่เลย<br>0                    | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย<br>0                    | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) |                      |
| <b>ด้านอารมณ์</b>   |                                |           |              |          |                   |                                |           |              |          |                   |                      |
| 1. การช่วยในการผ่อนคลายความเครียดเช่น การพูดคุยหยอกล้อ  | 46.6                           | 26.0      | 21.9         | 5.5      | 0.86<br>(.95)     | 8.2                            | 8.2       | 57.5         | 26.0     | 2.01<br>(0.82)    | .78**                |
| 2. การรับฟังความรู้สึก รับฟังความคับข้องใจ และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน                                  | 41.1                           | 30.1      | 19.2         | 9.6      | 0.97<br>(1.0)     | 6.8                            | 13.7      | 46.6         | 32.9     | 2.05<br>(0.86)    | -6.98**              |
| 3. การช่วยปลอบอนใจให้กำลังใจเมื่อรู้สึกเบื่อหน่ายและห้อแท้  | 34.2                           | 35.6      | 19.2         | 11.0     | 1.07<br>(0.99)    | 6.8                            | 6.8       | 41.1         | 45.2     | 2.25<br>(0.86)    | -7.55**              |
| 4. การสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการเข้าสังคม เช่น การได้เข้าร่วมทำบุญทางศาสนา การได้ร่วมงานประเพณีต่างๆ                    | 27.4                           | 32.9      | 19.2         | 20.5     | 1.33<br>(1.09)    | 1.4                            | 21.9      | 41.1         | 35.6     | 2.11<br>(0.79)    | -4.94**              |
| 5. การได้รับการสัมผัส เช่น การสัมผัสมือเบาๆ การลูบคลำส่วนที่ไม่สุข สนับสนุนเมื่อมีอาการผิดปกติ หรือรู้สึกไม่สุขสนับสนุน | 21.9                           | 19.2      | 27.4         | 31.5     | 1.68<br>(1.14)    | 2.7                            | 16.4      | 30.1         | 50.7     | 2.99<br>(0.84)    | -3.63**              |

\*\*p&lt;..01 ns = non significant

ตาราง ก 4 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์   | ตอนที่ 1 การได้รับการช่วยเหลือ<br>ดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ผู้ป่วย (รือขอของผู้ป่วย) |           |              |          |                   |             | ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ<br>ดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ครอบครัว (รือขอของครอบครัว) |              |          |                   |                      |  |
|--|---|-----------|--------------|----------|-------------------|-------------|---|--------------|----------|-------------------|----------------------|--|
|  | ไม่เลย<br>0   | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย<br>0 | น้อย<br>1   | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | $\bar{x}$<br>(SD) | Independen<br>t-test |  |
| <b>ด้านอารมณ์ (ต่อ)</b>  |   |           |              |          |                   |             |   |              |          |                   |                      |  |
| 6.การช่วยให้เพลิด<br>เพลินในสิ่งที่ชอบ เช่น<br>ได้ดูทีวี ได้ฟังวิทยุ ได้<br>เลี้ยงสัตว์หรือทำงาน<br>อดิเรกที่ชอบ             | 46.6  | 13.7      | 12.3         | 27.4     | 1.21<br>(1.29)    | 13.7        | 5.5   | 21.9         | 58.9     | 2.66<br>(1.07)    | -5.38**              |  |
| 7.การช่วยให้รับรู้ท่า<br>สารการอธิบายเรื่องราว<br>ต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลด้าน<br>ค่าใช้จ่ายในการรักษา<br>เช่นสิทธิประโยชน์ต่างๆ | 46.6  | 30.1      | 15.1         | 8.2      | 0.85<br>(0.97)    | 15.1        | 13.7  | 27.4         | 43.8     | 2.00<br>(1.09)    | -6.73**              |  |
| 8.การช่วยแสวงหาข้อ<br>มูลท่าสารเกี่ยวกับการ<br>รักษาที่พันสมัยเกี่ยวกับ<br>โรค ไกด์การฟอกเลือดการ<br>เปลี่ยนไต               | 39.7  | 34.2      | 16.4         | 9.6      | 0.96<br>(0.98)    | 13.7        | 23.3  | 34.2         | 28.8     | 1.78<br>(1.02)    | -4.98**              |  |
| 9.การมีที่ปรึกษามีมี<br>ปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บ<br>ป่วย  | 17.8  | 21.9      | 34.2         | 26.0     | 1.68<br>(1.05)    | 4.1         | 16.4  | 34.2         | 45.2     | 2.12<br>(0.87)    | -3.26**              |  |
| 10.การช่วยเหลือเมื่อ<br>ต้องการติดต่อกับแพทย์<br>หรือพยาบาลเพื่อขอ<br>คำแนะนำสำหรับ<br>อาการและอธิบาย<br>ปัญหาต่างๆ          | 38.4  | 1.4       | 12.3         | 47.9     | 1.70<br>(1.40)    | 11.1        | 8.2   | 23.3         | 57.5     | 2.27<br>(1.02)    | -2.84**              |  |

\*\*p&lt;..01

ตาราง ก 4 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์  | ตอนที่ 1 การได้รับการช่วยเหลือ<br>ดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ผู้ป่วย (ร้อยละของผู้ป่วย) |      |         |      |           |        | ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ<br>ดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ครอบครัว (ร้อยละของครอบครัว) |      |         |      |           |        |                      |
|---|--|------|---------|------|-----------|--------|--|------|---------|------|-----------|--------|----------------------|
|   | ไม่เลย   | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$ | (SD)   | ไม่เลย   | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$ | (SD)   | Independen<br>t-test |
| <b>ด้านข้อมูลข่าวสาร (ต่อ)</b>  |  |      |         |      |           |        |  |      |         |      |           |        |                      |
| 11. การช่วยเหลือให้ได้<br>พบประพฤติเพื่อแลก<br>เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร<br>ในการดูแลตนเองกับ<br>ผู้ป่วยโรคไตด้วยกัน | 63.0   | 8.2  | 12.3    | 16.4 | 0.82      | (1.18) | 15.1   | 15.1 | 43.8    | 26.0 | 1.81      | (1.00) | -5.45**              |
| 12. การช่วยเตือนให้<br>ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง<br>ตามคำแนะนำของ<br>แพทย์/พยาบาล                                     | 19.2   | 16.4 | 24.7    | 39.7 | 1.85      | (1.15) | 2.7  | 11.0 | 28.8    | 57.5 | 2.41      | (0.80) | -3.43**              |
| <b>ด้านการประเมินค่า</b>  |  |      |         |      |           |        |  |      |         |      |           |        |                      |
| 13. การที่ครอบครัว <sup>a</sup><br>รับฟังขอความคิดเห็น<br>ชุมชนเมื่อปฏิบัติตัว <sup>b</sup><br>ได้ถูกต้อง       | 9.6  | 21.9 | 27.4    | 41.1 | 2.00      | (1.01) | 5.5  | 12.3 | 45.2    | 37.0 | 2.14      | (0.84) | .89 ns               |
| 14. การที่ครอบครัว <sup>a</sup><br>ให้คำชี้แนะนำเมื่อมี<br>ปัญหา  | 9.6  | 28.8 | 30.1    | 31.5 | 1.84      | (0.99) | 5.5  | 13.7 | 43.8    | 37   | 2.12      | (0.85) | -1.89 ns             |
| 15. การได้รับความ <sup>a</sup><br>เห็นอกเห็นใจยอมรับ<br>ในการทำงานจาก<br>บุคคลในครอบครัว <sup>b</sup><br>ต่างๆ  | 0  | 1.4  | 8.2     | 90.4 | 2.89      | (0.36) | 0  | 6.8  | 30.1    | 63.0 | 2.56      | (0.62) | 3.91**               |
| 16. ครอบครัวเข้าใจ <sup>a</sup><br>และยอมรับการเปลี่ยน<br>แปลงของร่างกายและ                                     | 0  | 1.4  | 2.7     | 95.9 | 2.95      | (0.28) | 0  | 1.4  | 16.4    | 82.2 | 2.81      | (0.43) | 2.02*                |

\*p &lt;.05 \*\*p &lt;..01 ns = non significant

ตาราง ก 4 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์  | ตอนที่ 1 การได้รับการช่วยเหลือ  |      |         |      |           | ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ                                 |        |         |      |           | Independen<br>t-test |
|---|---|------|---------|------|-----------|--|--------|---------|------|-----------|----------------------|
|   | ดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ผู้ป่วย (ร้อยละของผู้ป่วย)  |      |         |      |           | ดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ครอบครัว (ร้อยละของครอบครัว) |        |         |      |           |                      |
| \   | ไม่เลย  | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$ | ไม่เลย   | น้อย   | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$ | Independen<br>t-test |
| <b>ด้านอารมณ์ (ต่อ)</b>   |   |      |         |      |           |  |        |         |      |           |                      |
| การรักษาที่กำลังได้รับอยู่  | 17.การช่วยเหลือเมื่อมีอาการไม่สุขสบาย เช่น ช่วยเก็บภาระ อาการคัน ชาบีบ น้ำดีให้มีมีอาการปวดเมื่อยหรือเป็นตะคริว | 28.8 | 17.8    | 21.9 | 31.5      | 1.56   | 5.5    | 9.6     | 26.0 | 58.9      | 2.38                 |
|   |   |      |         |      |           |  | (1.21) |         |      |           | (0.88)               |
| 18.การช่วยเหลือใน การชั่งและการประเมินน้ำหนักตัวทุกวัน                            | 46.6  | 16.4 | 15.1    | 21.9 | 1.12      | 13.7   | 26.0   | 34.2    | 26.0 | 1.73      | -3.25**              |
|   |   |      |         |      |           | (1.22)   |        |         |      |           | (1.00)               |
| 19.การช่วยเหลือใน เรื่องพาหนะเมื่อต้องเดินทางไปฟอกเลือด เช่น การจัดรถรับส่งให้    | 12.3  | 16.4 | 11.0    | 60.3 | 2.19      | 4.1  | 8.2    | 19.2    | 68.5 | 2.52      | -2.03*               |
|   |   |      |         |      |           | (1.11)   |        |         |      |           | (0.82)               |
| 20.การเดินทางไปเป็นเพื่อนและช่วยดูแลในขณะที่ฟอกเลือดหรือเวลาที่ต้องพับแพทช์ตามนัด | 9.6   | 23.3 | 8.2     | 58.9 | 2.16      | 2.7  | 13.7   | 20.5    | 63.0 | 2.44      | -1.70 <sup>ns</sup>  |
|   |   |      |         |      |           | (1.09)   |        |         |      |           | (0.83)               |
| 21.การช่วยเหลือเมื่อต้องการที่จะเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือทำธุระ                     | 26.0  | 39.7 | 15.1    | 19.2 | 1.27      | 5.5  | 20.5   | 32.9    | 41.1 | 2.10      | -5.02**              |
|   |   |      |         |      |           | (1.06)   |        |         |      |           | (0.92)               |

\*\*p&lt;.01 ns = non significant

ตาราง ก 4 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์   | ตอนที่ 1 การได้รับการช่วยเหลือ                              |      |         |   |                   |        | ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ |         |      |                   |                      |  |
|--|---|------|---------|---|-------------------|--------|--------------------------------|---------|------|-------------------|----------------------|--|
|  | คูณจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ผู้ป่วย (ร้อยละของผู้ป่วย) |      |         | คูณจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ครอบครัว (ร้อยละของครอบครัว) |                   |        |                                |         |      |                   |                      |  |
|  | ไม่เลย  | น้อย | ปานกลาง | มาก   | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย | น้อย                           | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) | Independen<br>t-test |  |
| <b>ด้านทรัพยากร (ต่อ)</b>  |   |      |         |   |                   |        |                                |         |      |                   |                      |  |
| 22.การช่วยเหลือใน<br>เรื่องการออกกำลังกาย  | 86.3  | 5.5  | 5.5     | 2.7   | 0 .25<br>(0.68)   | 26.0   | 24.7                           | 26.0    | 23.3 | 1.41<br>(1.12)    | -7.95**              |  |
| เช่นการเดิน หรือการ<br>บริหารกล้ามเนื้อข้อ   |   |      |         |   |                   |        |                                |         |      |                   |                      |  |
| 23.การจัดสิ่งแวดล้อม<br>ให้สามารถอนพักผ่อน<br>ได้ เช่น การจัดที่นอน<br>คูณและแสงและเสียง<br>การถ่ายเทอากาศ                       | 21.9  | 15.1 | 17.8    | 45.2  | 1.68<br>(1.22)    | 2.7    | 5.5                            | 32.9    | 58.9 | 2.48<br>(0.73)    | -3.71**              |  |
| 24.การช่วยสังเกตสิ่ง<br>ผิดปกติที่เกิดกับร่างกาย<br>เช่น อาการบวม เป็น<br>ไข้ผิวนังบริเวณสาย<br>สำหรับฟอกเลือด<br>อักเสบเป็นหนอง | 30.1  | 20.5 | 23.3    | 26.0  | 1.45<br>(1.18)    | 4.1    | 8.2                            | 23.3    | 64.4 | 2.48<br>(0.82)    | -6.11**              |  |
| 25.การคูณให้ได้รับ<br>ยาตามแผนการรักษา<br>ของแพทย์   | 76.6  | 4.1  | 5.5     | 13.7  | 0.56<br>(1.09)    | 17.8   | 9.6                            | 17.8    | 54.8 | 2.10<br>(1.17)    | -8.19**              |  |
| 26.การจัดเครื่องคิมที่<br>ไม่มีส่วนผสมของ ชา<br>กาแฟหรือยาลกอชอล์<br>และช่วยจำกัดปริมาณน้ำ<br>ตามแผนการรักษาของ<br>医師            | 42.5  | 17.8 | 23.3    | 16.4  | 1.14<br>(1.15)    | 11.0   | 23.3                           | 27.4    | 34.8 | 1.93<br>(1.03)    | -4.40**              |  |

\*\*p&lt;.01

ตาราง ก 4 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์   | ตอนที่ 1 การได้รับการช่วยเหลือ<br>ดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ผู้ป่วย (ร้อยละของผู้ป่วย) |      |         |      |                   | ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ<br>ดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ครอบครัว (ร้อยละของครอบครัว) |      |         |      |                   |                      |
|--|--|------|---------|------|-------------------|--|------|---------|------|-------------------|----------------------|
|  | ไม่เลย   | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย   | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) | Independen<br>t-test |
| <b>ด้านทรัพยากร (ต่อ)</b>  |  |      |         |      |                   |  |      |         |      |                   |                      |
| 27.การช่วยเหลือใน<br>การทำกิจวัตรประจำวัน<br>ที่บ้าน เช่น การเคลื่อน<br>ข้ามลงจากเตียง ลุก<br>จากเก้าอี้ หรือการเดิน | 83.6   | 13.7 | 1.4     | 1.4  | 0 .21<br>(0.53)   | 28.8   | 21.9 | 27.4    | 21.9 | 1.42<br>(1.13)    | -8.36**              |
| 28.การจัดเตรียมอาหาร<br>ที่ชอบรับประทานและ<br>เหมาะสมกับโรค เช่น<br>อาหารรสจีด อาหาร<br>ไขมันต่ำ                     | 8.2  | 12.3 | 19.2    | 60.3 | 2.32<br>(0.98)    | 8.2  | 13.7 | 24.7    | 53.4 | 2.23<br>(0.98)    | .51 <sup>ns</sup>    |
| 29.การช่วยเหลือเมื่อ<br>มีอาการผิดปกติ เช่น<br>ห้องผูกหรือห้องเสีย   | 78.1   | 8.2  | 4.1     | 9.6  | 0.45<br>(0.96)    | 21.9   | 13.7 | 28.8    | 35.6 | 1.78<br>(1.16)    | -7.56**              |
| 30.การช่วยกระตุนให้<br>ได้รับอาหารอย่างเพียง<br>พอ แม้จะมีอาการเบื่อ<br>อาหาร  | 30.1   | 21.9 | 19.2    | 28.8 | 1.47<br>(1.20)    | 4.1  | 12.3 | 37.0    | 46.6 | 2.26<br>(0.83)    | -4.64**              |
| 31.การช่วยเหลือใน<br>การทำงานบ้าน  | 5.5  | 15.1 | 12.3    | 67.1 | 2.41<br>(0.94)    | 1.4  | 6.8  | 32.9    | 58.9 | 2.49<br>(0.69)    | -6.00 <sup>ns</sup>  |
| 32.การจัดหาอุปกรณ์<br>เครื่องใช้ที่จำเป็นภายในบ้าน   | 11.0   | 34.2 | 32.9    | 21.9 | 1.16<br>(0.95)    | 5.5  | 8.2  | 41.1    | 45.2 | 2.26<br>(0.83)    | -4.08**              |
| 33.การช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล   | 15.1   | 17.8 | 5.5     | 61.6 | 2.14<br>(1.18)    | 11.0   | 16.4 | 15.1    | 57.5 | 2.19<br>(1.08)    | -.29 <sup>ns</sup>   |

\*\*p&lt;.01 ns = non significant

ตาราง ก 4 (ต่อ)

| กิจกรรมหรือ<br>เหตุการณ์                                  | ตอนที่ 1 การได้รับการช่วยเหลือ                               |      |         |      |                   | ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ                                 |      |         |      |                   | Independen<br>t-test |
|---|--|------|---------|------|-------------------|--|------|---------|------|-------------------|----------------------|
|   | ดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ผู้ป่วย (ร้อยละของผู้ป่วย) |      |         |      |                   | ดูแลจากครอบครัวตามการรับรู้ของ<br>ครอบครัว (ร้อยละของครอบครัว) |      |         |      |                   |                      |
|   | ไม่เลย   | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) | ไม่เลย   | น้อย | ปานกลาง | มาก  | $\bar{x}$<br>(SD) | Independen<br>t-test |
| <b>ด้านทรัพยากร (ต่อ)</b>                                 |  |      |         |      |                   |  |      |         |      |                   |                      |
| 34.การช่วยหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้เพียงพอ | 1.4  | 9.6  | 15.1    | 74.0 | 2.62<br>(0.72)    | 4.1  | 12.3 | 26.0    | 57.5 | 2.37<br>(0.86)    | 1.88 <sup>ns</sup>   |
| 35.การเก็บออมรายได้บางส่วนไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน          | 4.1  | 5.5  | 21.9    | 68.5 | 2.55<br>(0.78)    | 5.5  | 9.6  | 38.4    | 46.6 | 2.26<br>(0.85)    | 2.13*                |
| 36.การช่วยเหลือเมื่อป่วยหนักและจัดการกับภารกิจ            | 0  | 0    | 9.6     | 90.4 | 2.90<br>(0.30)    | 0  | 2.7  | 19.2    | 78.1 | 2.75<br>(0.49)    | 2.24*                |
| 37.การช่วยเหลือด้านการจัดการกับมรดกหรือหนี้สิน            | 49.3   | 12.3 | 23.3    | 15.1 | 1.04<br>(1.16)    | 28.8   | 17.8 | 27.4    | 26.0 | 1.51<br>(1.17)    | -2.42*               |

\*p &lt; .05 ns = non significant

## ภาคผนวก ข

### เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

#### แบบสอบถามชุดที่ 1

คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม

ส่วนที่ 2. แบบสอบถามความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้ป่วยที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมตามการรับรู้ของผู้ป่วย

ส่วนที่ 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม

---

คำชี้แจง ขอให้ท่านเติมข้อความลงในช่องว่างและทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เป็นคำตอบในคำถามแต่ละข้อ ตามที่เป็นจริง

1. อายุ.....ปี

2. เพศ

( 0 ) ชาย

( 1 ) หญิง

3. ศาสนา

( 1 ) พุทธ

( 2 ) คริสต์

( 3 ) อิสลาม

( 4 ) อื่นๆ/โปรดระบุ.....

4. สถานภาพสมรส

( 1 ) โสด

( 2 ) คู่

( 3 ) หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่

5. ระดับการศึกษา

( 0 ) ไม่ได้รับการศึกษา

( 1 ) ประถมศึกษา

( 2 ) มัธยมศึกษา

( 3 ) ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา

( 4 ) ปริญญาตรี

( 5 ) สูงกว่าปริญญาตรี

#### 6. อาชีพ

อาชีพก่อนเข้ารับการรักษาด้วยเครื่องไถเทียม

( 0 ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ

( 1 ) ประกอบอาชีพรับจ้าง

( 2 ) ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

( 3 ) ประกอบอาชีพเกย์ตระกром

( 4 ) ประกอบอาชีพค้าขาย

( 5 ) ประกอบอาชีพอื่นๆ (ระบุ) .....

อาชีพในปัจจุบัน

( 0 ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ

( 1 ) ประกอบอาชีพรับจ้าง

( 2 ) ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

( 3 ) ประกอบอาชีพเกย์ตระกром

( 4 ) ประกอบอาชีพค้าขาย

( 5 ) ประกอบอาชีพอื่นๆ (ระบุ) .....

#### 7. ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยเครื่องไถเทียม

( 0 ) เมิกไม่ได้

( 1 ) เมิกได้บางส่วน

( 2 ) เมิกได้ทั้งหมด

ถ้าเบิกได้ใช้สิทธิการเบิกจาก

( 1 ) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

( 2 ) ประกันสังคม

( 3 ) พระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้า

( 4 ) อื่นๆ (ระบุ) .....

#### 8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางมาฟอกเลือด ค่าอาหารในขณะ ที่มา รับการฟอกเลือด แหล่งสนับสนุนคือ

( 1 ) ญาติ

( 2 ) บุตรสาว / บุตรชาย

- (3) บุตรสะไภ้/บุตรเบย
- (4) บิดา/มารดา
- (5) อื่นๆ ระบุ.....

9. รายได้ปัจจุบันเฉลี่ยต่อเดือน

- (0) ไม่มีรายได้
- (1) มีรายได้.....บาท / เดือน

10. ท่านมีปัญหาด้านเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด

- (0) ไม่มีปัญหา
- (1) มีปัญหาเล็กน้อย
- (3) มีปัญหาปานกลาง
- (4) มีปัญหามาก

11. ระยะทางบ้านถึงหน่วยไฟเทียม.....กิโลเมตร

- (1) น้อยกว่า 10 กิโลเมตร
- (2) 10 – 30 กิโลเมตร
- (3) มากกว่า 30 กิโลเมตร

ท่านเดินทางมาด้วย.....

- (1) รถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว
- (2) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
- (3) รถยนต์ส่วนตัว
- (4) รถยนต์รับจ้าง
- (5) อื่นๆ (ระบุ).....

12. การเดินทางมาฟอกเลือด ท่านมีมีสมาชิกในครอบครัว/ญาติ เดินทางมาเป็นเพื่อน  
หรือไม่

- (0) ไม่มี
- (1) มี คือ คู่สมรส
- (2) มีคือ บุตรสาว/บุตรชาย
- (3) มีคือ บุตรสะไภ้/บุตรเบย
- (4) มีคือ บิดา/มารดา
- (5) มีบุคคลอื่นๆ (ระบุ).....

13. ขณะที่กำลังฟอกเลือดท่านมีมีสมาชิกในครอบครัว/ญาติ ช่วยดูแลหรือไม่

(0) ไม่มี

(1) มีคือ คุ้มครอง

(2) มีคือ บุตรสาว/บุตรชาย

(3) มีคือ บุตรสะใภ้/บุตรเขย

(4) มีคือ บิดา/มารดา

(5) มีบุคคลอื่นๆ (ระบุ).....

14. บุคคลในครอบครัวที่ให้การดูแลช่วยเหลือมากที่สุดจะอยู่บ้านคือ....

(1) คุ้มครอง

(2) บุตรสาว/บุตรชาย

(3) บุตรสะใภ้/บุตรเขย

(4) บิดา/มารดา

(5) อื่นๆ (ระบุ).....

#### ข้อมูลด้านสุขภาพ

15. ระยะเวลาของการเจ็บป่วยด้วยโรคไตรวยเรื้อรัง.....ปี

16. ระยะเวลาของการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่อง ไตรเทียม.....ปี

โดยฟอกสัปดาห์ละ .....ครั้ง

17. โรคประจำตัวอื่นๆ นอกจากไตรวยเรื้อรังระยะสุดท้าย (ถ้าตอบว่ามีให้ตอบ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

(0) ไม่มี

(1) มี ได้แก่ เบ้าหวาน

(2) มีได้แก่ ความดันโลหิตสูง

(3) มีโรคอื่นๆ (ระบุ).....

18. ขณะที่ท่านกำลังฟอกเลือดด้วยเครื่อง ไตรเทียมท่านมีอาการ (ตอบ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) ความดันโลหิตต่ำ

(2) ความดันโลหิตสูง

(3) ตะคริว

(4) อื่นๆ (ระบุ).....

19. ใน 1 เดือนที่ผ่านมาจะอยู่ที่บ้านท่านมีอาการ (ตอบ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) อ่อนเพลีย

(2) ปวดศีรษะ

( 3 ) ก้ม

#### ( 4 ) เบื้องต้นอาหาร

( 5 ) ອິນໆ (ຮະບູ).....

## เก็บจากรายงานผู้ป่วย (ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึก)

20. ผลการตรวจเลือดครั้งล่าสุด ค่าบีบูอินก่อนฟอกเลือด/หลังฟอกเลือดเท่ากัน.....

ค่า ภีมานาโตรดิริตเท่ากับ.....

21. ยาที่รับประทาน.....

**แบบสอบถามความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้ป่วยที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมตามการรับรู้ของผู้ป่วย**

**คำชี้แจง** ข้อความต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับความต้องการ การช่วยเหลือ การดูแล จากครอบครัวที่ท่านต้องการ และการได้รับการการช่วยเหลือ การดูแลจากครอบครัวในระหว่างที่ป่วยเป็นโรคไต รายเรื้อรังและรักษาด้วยเครื่องไตเทียม ให้ท่านทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่เห็นว่าตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการเลือกตอบดังนี้

**ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือ การดูแลจากครอบครัว**

ไม่เลย หมายถึง ผู้ป่วยไม่มีความต้องการการช่วยเหลือการดูแลในข้อดังกล่าว ให้คะแนนเท่ากับ 0

น้อย หมายถึง ผู้ป่วยมีความต้องการการช่วยเหลือการดูแลในข้อดังกล่าว นานๆครั้งให้คะแนนเท่ากับ 1

ปานกลาง หมายถึง ผู้ป่วยมีความต้องการการช่วยเหลือการดูแลในข้อดังกล่าว เป็นครั้งคราวให้คะแนนเท่ากับ 2

มาก หมายถึง ผู้ป่วยมีความต้องการการช่วยเหลือการดูแลในข้อดังกล่าวบ่อยครั้ง หรือเป็นประจำให้คะแนนเท่ากับ 3

**ตอนที่ 2 การได้รับการช่วยเหลือ การดูแลจากครอบครัว**

ไม่เลย หมายถึง ผู้ป่วยไม่ได้รับการช่วยเหลือการดูแลในข้อดังกล่าวเลยให้คะแนนเท่ากับ 0

น้อย หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือการดูแลในข้อดังกล่าวนานๆครั้งให้คะแนนเท่ากับ 1

ปานกลาง หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือการดูแลในข้อดังกล่าวเป็นครั้งคราว ให้คะแนนเท่ากับ 2

มาก หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือการดูแลในข้อดังกล่าวบ่อยครั้งหรือเป็นประจำให้คะแนนเท่ากับ 3

แบบประเมินความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากการครอบครัวของผู้ป่วยไตรวย เรือรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมตามการรับรู้ของผู้ป่วย

**แบบประเมินความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้ป่วยไทย  
เรื่องที่รักษาด้วยเครื่องไฟเทียมตามการรับรู้ของผู้ป่วย**

| กิจกรรมหรือเหตุการณ์   | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือดูแลจากครอบครัว |           |              |          | ตอนที่ 2 การได้รับการการช่วยเหลือดูแลจากครอบครัว |           |              |          |
|--|---|-----------|--------------|----------|--|-----------|--------------|----------|
|  | ไม่เลย<br>0                                     | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | ไม่เลย<br>0                                      | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 |
| ด้านการประเมินค่า  |   |           |              |          |  |           |              |          |
| 13. การที่ครอบครัวรับฟังขอความคิดเห็น ชมเชยเมื่อปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง   |   |           |              |          |  |           |              |          |
| 14. การที่ครอบครัวให้คำชี้แนะเมื่อมีปัญหา  | .   | .         | .            | .        |  |           |              |          |
| ด้านทรัพยากร   |   |           |              |          |  |           |              |          |
| 17. การช่วยเหลือเมื่อมีอาการไม่สุขสบาย เช่น ช่วยเก็บมาเมื่ออาการคัน ช่วยบินนำด้วยเมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเป็นตะคริว |   |           |              |          |  |           |              |          |
| 18. การช่วยเหลือในการซั่ง และการประเมินนำหนักตัวทุกวัน   | .   | .         | .            | .        |  |           |              |          |

## แบบสอบถามชุดที่ 2

คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนครอบครัวผู้ป่วย ได้แก่ อายุ ที่รักษาด้วยเครื่อง ไตเทียม

ส่วนที่ 2. แบบสอบถามความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้ป่วย ได้แก่ อายุ ที่รักษาด้วยเครื่อง ไตเทียม ตามการรับรู้ของครอบครัว

ส่วนที่ 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนครอบครัวผู้ป่วยที่รักษาด้วยเครื่อง ไตเทียม

คำชี้แจง ขอให้ท่านเติม ข้อความลงในช่องว่าง และทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เป็นคำตอบ ในคำถามแต่ละข้อ ตามที่เป็นจริง

1. อายุ.....ปี

2. เพศ

( 0 ) ชาย

( 1 ) หญิง

3. ศาสนา

( 1 ) พุทธ

( 2 ) คริสต์

( 3 ) อิสลาม

( 4 ) อื่นๆ โปรดระบุ.....

4. สถานภาพสมรส

( 1 ) โสด

( 2 ) คู่

( 3 ) หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่

5. ระดับการศึกษา

( 0 ) ไม่ได้รับการศึกษา

( 1 ) ประถมศึกษา

( 2 ) มัธยมศึกษา

( 3 ) ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา

( 4 ) ปริญญาตรี

( 5 ) สูงกว่าปริญญาตรี

6. อาชีพ

อาชีพก่อนให้การช่วยเหลือคุณผู้ป่วย

- (0) ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
 (1) ประกอบอาชีพ รับจ้าง  
 (2) ประกอบอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 (3) ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  
 (4) ประกอบอาชีพ ค้าขาย  
 (5) ประกอบอาชีพ อื่นๆ (ระบุ) .....
- อาชีพในปัจจุบัน
- (0) ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
 (1) ประกอบอาชีพ รับจ้าง  
 (2) ประกอบอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 (3) ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  
 (4) ประกอบอาชีพ ค้าขาย  
 (5) ประกอบอาชีพ อื่นๆ (ระบุ) .....
7. รายได้ปัจจุบันเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
- (0) ไม่มีรายได้  
 (1) มีรายได้.....บาท / เดือน
8. ครอบครัวมีปัญหาด้านเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด
- (0) ไม่มีปัญหา  
 (1) มีปัญหาเล็กน้อย  
 (2) มีปัญหาปานกลาง  
 (3) มีปัญหามาก
9. ท่านมีโรคประจำตัว (ถ้าตอบว่ามีตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- (0) ไม่มี  
 (1) มี ได้แก่ เปาหวาน  
 (2) มี ได้แก่ ความดันโลหิตสูง  
 (3) มี ได้แก่ โรคอื่นๆ (ระบุ) .....
10. สุขภาพของท่านเป็นอย่างไร
- (0) ไม่แข็งแรงเลย  
 (1) ไม่ค่อยแข็งแรง  
 (2) 強แข็งแรงพอสมควร

( 3 ) ແບ່ງແຮງດີ

( 4 ) ແບ່ງແຮງດືມາກ

11. ຮະບະເວລາທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດູແລຜູ້ປ່ວຍ.....ປີ

12. ຄວາມສັນພັນທຶນກັບຜູ້ປ່ວຍ ຂືອ.....

( 1 ) ຄຸ່ສມຮສ

( 2 ) ບຸຕຣສາວ/ບຸຕຣໜາຍ

( 3 ) ບຸຕຣະໄກ້/ບຸຕຣເບໍຂ

( 4 ) ບິດາ/ມາຮດາ

( 5 ) ອື່ນາ (ຮະບູ)

**แบบสอบถามความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้ป่วยไทย  
เรื่องที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมตามการรับรู้ของครอบครัว**

**คำชี้แจง** ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่ดีลักษณะทั่วไปของความคิดเห็นของท่านว่าผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่มีความต้องการการช่วยเหลือดูแลในหัวข้อข้างล่างนี้มากน้อยเพียงใด และได้รับการตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ให้ท่านทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการเลือกตอบดังนี้

**ตอนที่ 1** ความต้องการของผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่ ที่ต้องการ การช่วยเหลือ การดูแลจากครอบครัวตามความคิดเห็นของท่าน

ไม่เลย หมายถึง ผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่ไม่มีความต้องการการช่วยเหลือการดูแล ในข้อดังกล่าวให้คะแนนเท่ากับ 0

น้อย หมายถึง ผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่มีความต้องการการช่วยเหลือการดูแลใน ข้อดังกล่าวนานๆครั้งให้คะแนนเท่ากับ 1

ปานกลาง หมายถึง ผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่มีความต้องการการช่วยเหลือการดูแล ในข้อดังกล่าวเป็นครั้งคราวให้คะแนนเท่ากับ 2

มาก หมายถึง ผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่มีความต้องการการช่วยเหลือการดูแลใน ข้อดังกล่าวบ่อยครั้งหรือเป็นประจำให้คะแนนเท่ากับ 3

**ตอนที่ 2** การได้รับการช่วยเหลือ การดูแลของผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่จากครอบครัวตามความคิดเห็นของท่าน

ไม่เลย หมายถึง ผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่ ไม่ได้รับการช่วยเหลือการดูแลในข้อดังกล่าวเลยให้คะแนนเท่ากับ 0

น้อย หมายถึง ผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่ ได้รับการช่วยเหลือการดูแลในข้อดังกล่าวนานๆครั้งให้คะแนนเท่ากับ 1

ปานกลาง หมายถึง ผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่ ได้รับการช่วยเหลือการดูแลในข้อดังกล่าวเป็นครั้งคราวให้คะแนนเท่ากับ 2

มาก หมายถึง ผู้ป่วยที่ท่านดูแลอยู่ ได้รับการช่วยเหลือการดูแลในข้อดังกล่าวบ่อยครั้งหรือเป็นประจำให้คะแนนเท่ากับ 3

แบบประเมินความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากการครอบครัวของผู้ป่วยไตรวยเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไฟเทียมตามการรับรู้ของครอบครัว

**แบบประเมินความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้ป่วยไทย  
เรื่องที่รักษาด้วยเครื่องไฟเทียมตามการรับรู้ของครอบครัว**

| กิจกรรมหรือเหตุการณ์   | ตอนที่ 1 ความต้องการการช่วยเหลือดูแลจากครอบครัว |           |              |          | ตอนที่ 2 การได้รับการการช่วยเหลือดูแลจากครอบครัว |           |              |          |
|--|---|-----------|--------------|----------|--|-----------|--------------|----------|
|  | ไม่เลย<br>0                                     | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 | ไม่เลย<br>0                                      | น้อย<br>1 | ปานกลาง<br>2 | มาก<br>3 |
| ด้านการประเมินค่า  |   |           |              |          |  |           |              |          |
| 13. การที่ครอบครัวรับฟังขอความคิดเห็น ชมเชยเมื่อปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง   |   |           |              |          |  |           |              |          |
| 14. การที่ครอบครัวให้คำชี้แนะเมื่อมีปัญหา  | .   | .         | .            | .        |  |           |              |          |
| ด้านทรัพยากร   |   |           |              |          |  |           |              |          |
| 17. การช่วยเหลือเมื่อมีอาการไม่สุขสบาย เช่น ช่วยเก็บมาเมื่ออาการคัน ช่วยบินนำด้วยเมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเป็นตะคริว |   |           |              |          |  |           |              |          |
| 18. การช่วยเหลือในการซั่ง และการประเมินนำหนักตัวทุกวัน   | .   | .         | .            | .        |  |           |              |          |

## ภาคผนวก ค

### **การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัย**

#### **แบบพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม**

สวัสดีค่ะ คินันนางสุภาพ ปืนทอง นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขณะนี้กำลังทำวิจัยเรื่อง การสนับสนุนทางสังคม ความต้องการและการได้รับของผู้ป่วย ไตรายเรือรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมตามการรับรู้ของผู้ป่วย และของครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความต้องการการช่วยเหลือจากครอบครัวของผู้ป่วย ไตรายเรือรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมว่าผู้ป่วยมีความต้องการการช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้าง และครอบครัวรับรู้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยหรือไม่ โดยข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ เพื่อนำไปเป็นแนวทาง ในการให้การช่วยเหลือและตอบสนอง ความต้องการของผู้ป่วย ได้อย่าง เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย ได้อย่างแท้จริง หากท่านยินดีเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้จะให้ ท่านตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามความต้องการและการได้รับ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาที การเข้าร่วมการวิจัยจะ เป็นไปตามความสมัครใจของท่าน ไม่ว่าท่านจะเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่ก็ตามก็จะไม่มีผลใดๆต่อ ท่านหรือต่อการรักษาพยาบาลที่ท่านได้รับอยู่ หากท่านยินดีเข้าร่วมในการวิจัยและตอบ แบบสอบถาม ชื่อและข้อมูลของท่านจะเป็นความลับ คินันเพียงจะนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล ของผู้ป่วยรายอื่นๆ และจะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น ในระหว่างการตอบแบบสอบถามหากท่าน ไม่ต้องการตอบแบบสอบถามจนครบก็สามารถออกจาก การวิจัยก่อนที่จะตอบแบบสอบถามสำเร็จ หรือหากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้แล้ว และเกิดเปลี่ยนใจในภายหลัง ท่านมีสิทธิ์ที่จะยุติ การเข้าร่วมการวิจัย และมีสิทธิ์ขอข้อมูลกลับ โดยไม่มีผลต่อท่านหรือการรักษาพยาบาลที่ท่าน ได้รับอยู่ ในการวิจัยครั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ คินันยินดีตอบข้อซักถาม ได้ตลอดเวลา

คินันขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

นางสุภาพ ปืนทอง

นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

### แบบฟอร์มใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

**ชื่อโครงการวิจัย** การสนับสนุนทางสังคม: ความต้องการและการได้รับของผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมตามการรับรู้ของผู้ป่วยและของครอบครัว

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..... นามสกุล.....

ได้รับการอธิบายถึงรายละเอียดของการวิจัย ในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัยตามคำอธิบายข้างต้น จากนางสุภาพ ปั่นทอง ซึ่งเป็นผู้วิจัย ถึงวิธีการและผลที่จะได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้แล้ว ข้าพเจ้า มีความยินดีที่จะเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ หากข้าพเจ้าไม่พอใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัย ข้าพเจ้ามี สิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยไม่ต้องให้เหตุผลแม้ว่าข้าพเจ้าได้เซ็นยินยอมเข้าร่วม โครงการวิจัยแล้ว โดยที่ข้าพเจ้าจะไม่เสียสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ข้าพเจ้าหรือญาติของข้าพเจ้าได้รับการรักษาอยู่

.....  
.....

(.....)

(ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย)

(วัน/เดือน/ปี)

.....  
.....

(.....)

(ลายเซ็นนักวิจัย)

(วัน/เดือน/ปี)

.....  
.....

(.....)

(ลายเซ็นพยาน)

(วัน/เดือน/ปี)

## การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัย

### แบบพิทักษ์สิทธิ์ตัวแทนครอบครัวผู้ป่วยที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม

สวัสดีค่ะ คินันนางสุภาพ ปืนทอง นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขณะนี้กำลังทำวิจัยเรื่อง การสนับสนุนทางสังคม ความต้องการและการได้รับของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมตามการรับรู้ของผู้ป่วย และของครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความต้องการการช่วยเหลือจากครอบครัวของผู้ป่วย ไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมว่าผู้ป่วยมีความต้องการการช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้าง และครอบครัวรับรู้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยหรือไม่ โดยข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ เพื่อนำไปเป็นแนวทาง ในการให้การช่วยเหลือและตอบสนอง ความต้องการของผู้ป่วย ได้อย่าง เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย ได้อย่างแท้จริง หากท่านยินดีเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้จะให้ ท่านตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามความต้องการและการได้รับ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาที การเข้าร่วมการวิจัยจะ เป็นไปตามความสมัครใจของท่าน ไม่ว่าท่านจะเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่ก็ตามก็จะไม่มีผลใดๆต่อ ท่านหรือต่อการรักษาพยาบาลที่ญาติของท่านได้รับอยู่ หากท่านยินดีเข้าร่วมในการวิจัยและตอบ แบบสอบถาม ชื่อและข้อมูลของท่านจะเป็นความลับ คินันเพียงจะนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล ของครอบครัวผู้ป่วยรายอื่นๆ และจะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น ในระหว่างการตอบแบบสอบถาม หากท่านไม่ต้องการตอบแบบสอบถามจนครบก็สามารถออกจาก การวิจัยก่อนที่จะตอบ แบบสอบถามสำเร็จ หรือหากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้แล้ว และเกิดเปลี่ยนใจในภายหลัง ท่านมีสิทธิ์ที่จะยุติการเข้าร่วมการวิจัย และมีสิทธิ์ขอข้อมูลกลับ โดยไม่มีผลต่อท่านหรือการ รักษาพยาบาลที่ญาติของท่านได้รับอยู่ ในการวิจัยครั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ คินันยินดีตอบข้อ ซักถาม ได้ตลอดเวลา

คินันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

นางสุภาพ ปืนทอง

นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

### แบบฟอร์มใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

**ชื่อโครงการวิจัย** การสนับสนุนทางสังคม: ความต้องการและการได้รับของผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมตามการรับรู้ของผู้ป่วยและของครอบครัว

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..... นามสกุล.....

ได้รับการอธิบายถึงรายละเอียดของการวิจัย ในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัยตามคำอธิบายข้างต้น จากนางสุภาพ ปั่นทอง ซึ่งเป็นผู้วิจัย ถึงวิธีการและผลที่จะได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้แล้ว ข้าพเจ้า มีความยินดีที่จะเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ หากข้าพเจ้าไม่พอใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัย ข้าพเจ้ามี สิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยไม่ต้องให้เหตุผลแม้ว่าข้าพเจ้าได้เซ็นยินยอมเข้าร่วม โครงการวิจัยแล้ว โดยที่ข้าพเจ้าจะไม่เสียสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ข้าพเจ้าหรือญาติของข้าพเจ้าได้รับการรักษาอยู่

.....  
.....

( )

(ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย)

(วัน/เดือน/ปี)

.....  
.....

( )

(ลายเซ็นนักวิจัย)

(วัน/เดือน/ปี)

.....  
.....

( )

(ลายเซ็นพยาน)

(วัน/เดือน/ปี)

## ภาคผนวก ๔

### รายงานผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบความตรงตามเงื่อนไข

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา  
สังกัดหน่วยไถเกี้ยม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นายแพทย์ เจริญ เกียรติวรชัย  
อายุรแพทย์โรคไตหน่วยไถเกี้ยมโรงพยาบาลหาดใหญ่
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิยา สองอารีช  
อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. อาจารย์อมอร แซ่จิว  
อาจารย์พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. นางสุกร บุญปวนิช  
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไถเกี้ยมหน่วยไถเกี้ยม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

## การสนับสนุนทางสังคม : ความต้องการ และการได้รับการสนองตอบของผู้ป่วยไตรายเรือรังที่รักษาด้วยเครื่อง ไตเทียม\*

สุภาพ ปั่นทอง\*\* สุนัตตรา ตะบูนพงศ์\*\*\* วิภาวดี คงอินทร์\*\*\*\*

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้ป่วยไตรายเรือรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยไตรายเรือรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมที่โรงพยาบาลของรัฐ ในภาคใต้ จำนวน 73 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย แบบสอบถามความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านอารมณ์ 2) ด้านข้อมูลข่าวสาร 3) ด้านการประเมินค่า 4) ด้านทรัพยากร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและการทดสอบที่คู่ ผลการวิจัยมีดังนี้

1. ความต้องการการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยรวม ด้านการประเมินค่า และด้านทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอารมณ์และด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับน้อย

2. การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง

3. การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมากกว่าความต้องการการสนับสนุน ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ( $P<.05$ ) ยกเว้นด้านการประเมินค่าที่ระดับการได้รับและความต้องการการสนับสนุนไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาแสดงถึงการที่ผู้ป่วยต้องการการสนับสนุนทางสังคมด้านการประเมินค่าและด้านทรัพยากรในระดับที่สูงกว่าด้านอารมณ์และด้านข้อมูลข่าวสาร และผู้ป่วยได้รับการสนองตอบต่อความต้องการจากครอบครัวเป็นอย่างดี

**คำสำคัญ** การสนับสนุนทางสังคม ความต้องการ การได้รับการสนองตอบ ผู้ป่วยไตรายเรือรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ผู้ป่วยไตรายเรือรังจะต้องมีการรักษาด้วยเครื่องไตเทียม แต่การล้างไตทางเยื่อบุช่องท้อง การผ่าตัดเมล็ดไข่ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (อนุตตร, 2545) สถิติจำนวนผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง

\*วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

\*\* พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสงขลา

\*\*\* รองศาสตราจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

\*\*\*\* ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคม 2547 มีจำนวนผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 11,316 ราย กิดเป็นร้อยละ 83.22 ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทดแทนไต จากจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทดแทนไตทั้งหมด 13,597 ราย (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 11,316 ราย ล้างทางหน้าห้อง 739 ราย เปลี่ยนไต 1,542 ราย) (อนอม, และคณะ, 2548)

ถึงแม้การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น แต่ไม่ผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม ด้านร่างกาย เช่น ไม่สามารถควบคุมของเสียในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ป่วยยังคงมีของเสียคั่งในร่างกาย มีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียจากภาวะของโรค และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา ทั่วไปความดันโลหิตต่ำ ภาวะความดันโลหิตสูง ৎคริว ติดเชื้อ ผู้ป่วยต้องดูแลตัวเองตลอดชีวิต ด้านจิตใจ เช่น รู้สึกเครียด วิตกกังวลหวาดกลัว เกิดความรู้สึกห้อแท้เบื้องหน่าย มีความรู้สึกไม่แน่นอนในชีวิต และมีอาการซึมเศร้าเป็นครั้งคราวมากน้อยตามสภาพ (ลีนา, 2546) ด้านสังคม โดยเฉพาะในผู้ป่วยวัยทำงาน ก่อให้เกิดการขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม การปฏิบัติงานต่างๆ ไม่สามารถทำงานได้เหมือนเดิม อันเนื่องมาจากอาการอ่อนเพลียทางด้านร่างกาย การปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองที่มีข้อจำกัดเรื่องอาหารและน้ำดื่ม ต้องมาเข้าเครื่องไตเทียม วันละ 4-5 ชั่วโมง ที่มีจำนวนการฟอก 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ทำให้เวลาในการทำงานของผู้ป่วยลดลง (เบญจามารณ์, 2543) หรือผู้ป่วยบางรายไม่มีงานทำเนื่องจากต้องดูแลออกจากงาน (Ferrans & Power, 1985) ในส่วนของครอบครัวและคู่สมรส ผู้ป่วยต้องพึ่งพาการดูแลจากคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวเวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกับการรักษาและดูแลตนเอง มีเวลาให้ครอบครัวน้อยลง บางรายสัมพันธภาพ และการแสดงบทบาทการเป็นผู้นำในครอบครัวลดลง ขณะเดียวกันต้องพึ่งพาครอบครัวมากขึ้น (Phillips, 1996 อ้างตามเบญจามารณ์, 2543) โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยต้องพึ่งพาสมาชิกในครอบครัวในเรื่องการเดินทางมาฟอกเลือดบางครั้งสมาชิกในครอบครัวต้องหยุดงาน ก็จะทำให้ขาดรายได้และขาดงานด้วย ก็จะส่งผลถึงด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีภาวะไตรายเรื้อรังระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องไตเทียมต้องเสียค่าใช้จ่ายถึงคนละ 254,000 -304,000 บาท ต่อปี (วิโรจน์, ฯ, วิชัย, และ สุวรรณ, 2544) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายมหาศาล และเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระแก่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ยังไม่พร้อมที่จะให้รับน้ำหนักสนับสนุนการให้บริการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้โดยไม่คิดมูลค่า (เกรียง, วสันต์, และ ชนันดา, 2547) จึงเป็นภาระอันหนักหน่วงของครอบครัว ซึ่งมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ข้อจำกัดและเงื่อนไขเหล่านี้ ทำให้ผู้ป่วยต้องการการสนับสนุนจากครอบครัวในหลายด้านคือทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ เช่น การสนับสนุนเกี่ยวกับการทำกิจวัตรประจำวัน การเตรียมอาหาร เลี้ยง โรคที่ต้องรับประทานในแต่ละวัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และในผู้ป่วยสูงอายุอาจจำเป็นต้องมีผู้ดูแลทางไปเป็นเพื่อน และช่วยดูแลในขณะที่ฟอกเลือด การช่วยเหลือในเรื่องพาหนะเมื่อต้องเดินทางไปฟอกเลือด การช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การรับฟังความรู้สึกและรับนายความดับข้อคงใจ การช่วยให้มีส่วนร่วมในการเข้าสังคม เช่น การทำงานร่วมงานประเพณีต่างๆ

ผู้จัดซึ่งมีส่วนในการให้บริการแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม จึงมีความสนใจจะศึกษา ความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้ป่วย ผลกระทบวิจัยจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการพยาบาล เพื่อสนับสนุนการเก็บข้อมูลของครอบครัวต่อผู้ป่วย ทำให้การพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการดูแลผู้ป่วยนอกจากการดูแลแบบที่ผู้ป่วยมาฟอกเลือดต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล แต่ชีวิตของผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับครอบครัว ต้องอาศัยครอบครัวในการให้การดูแล

และให้การสนับสนุนในขณะอยู่ที่บ้าน โดยมีเป้าหมายคือช่วยให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไป มีความสุขตามอัตภาพได้ ถ้าผู้ป่วยได้รับการตอบสนองทางด้านกายจิตและสังคมตรงตามความต้องการของผู้ป่วย

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้ป่วยที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการ และการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว

### วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังซึ่งได้รับการรักษาทดแทนโดยด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สถานที่เก็บข้อมูล คือ หน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่งในภาคใต้ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูป ของโพลิท, และ เบ็ค (Polit & Beck, 2004) กำหนดอำนาจการทดสอบ ( $1 - \beta$ ) เท่ากับ 0.80 ความซื่อมั่น ( $\alpha$ ) เท่ากับ 95% และขนาดอิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.50 ได้กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 63 ราย (แต่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวน 73 ราย) ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเกณฑ์เจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด กล่าวคือเป็นผู้ป่วย ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ป่วยโดยวายเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม 2) แบบสอบถามความต้องการการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 3) แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ซึ่งแบบสอบถามในข้อ 2) และข้อ 3) เป็นแบบสอบถามผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดของเฮลส์ (House, 1981) และจากการบททวนเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 37 ข้อ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลทั่วสาร ด้านการประเมินค่า และด้านทรัพยากร แต่ละข้อคำถามมีคำตอบให้เลือก 4 คำตอบ ลักษณะคำตอบมีให้เลือกเป็นแบบลิคเตอร์สเกล (likert scale) 4 ระดับคือ ไม่เลย น้อย ปานกลาง มาก ให้ค่าคะแนน 0-3 (0= ไม่เลย, 1= น้อย, 2= ปานกลาง, 3 = มาก) แบบสอบถามทั้ง 2 ส่วนผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ผลการทดสอบความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์อัล法ของกรอนบาก (Cronbach's alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามความต้องการการสนับสนุน โดยรวมเท่ากับ .94 ด้านอารมณ์เท่ากับ .82 ด้านข้อมูลทั่วสารเท่ากับ .73 ด้านการประเมินค่าเท่ากับ .82 ด้านทรัพยากรเท่ากับ .93 และแบบสอบถามการได้รับการสนับสนุน โดยรวมเท่ากับ .91 ด้านอารมณ์เท่ากับ .84 ด้านข้อมูลทั่วสารเท่ากับ .70 ด้านการประเมินค่าเท่ากับ .73 ด้านทรัพยากรเท่ากับ .91 การแปลผลคะแนน โดยใช้ค่า mean ของ mean score ดังนี้ ช่วงคะแนน 0-1 อยู่ในระดับน้อย ช่วงคะแนน >1-2 อยู่ในระดับปานกลาง และช่วงคะแนน >2-3 อยู่ในระดับมาก

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเข้าพบทั้งหน้าหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์รวมทั้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความร่วมมือในการเป็นสื่อกลางประสานกับ

ผู้ป่วย และคัดเลือกผู้ป่วยตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จากนั้นผู้วิจัยเข้าพบผู้ป่วย แนะนำตัว อธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งแจ้งสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้ข้อมูล เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยแล้ว ผู้วิจัยขอให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามระหว่างรอการฟอกเลือดหรือขณะฟอกเลือด ในกรณีที่ผู้ป่วยอ่านหนังสือไม่ได้ผู้วิจัยจะใช้วิธีอ่าน และอธิบายข้อคำถามให้กับผู้ป่วยฟังและกล่าวผู้ป่วยระบุคำตอบผู้วิจัยจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลคำตอบเอง ภายหลังจากกลุ่มผู้ป่วยตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยผู้วิจัยทำการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยายและสถิติที่คู่

## ผลการวิจัย

### ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 73 ราย มีอายุระหว่าง 20-83 ปี อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.5 ค่าเฉลี่ยอายุเท่ากับ 58.37 ปี เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.4 และ 46.6 ตามลำดับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรส ปัจจุบันร้อยละ 46.6 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 89 เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยเครื่องไฟเทียน ได้แหล่งสนับสนุนการเงินคือบุตรคิดเป็นร้อยละ 42.5 ไม่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 46.6 ระยะทางจากบ้านถึงหน่วยไฟเทียน ส่วนใหญ่มากกว่า 30 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.4 การเดินทางมาฟอกเลือดใช้รถชนิดส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 45.2 และส่วนใหญ่จะมีผู้ดูแลในขณะเดินทางคิดเป็นร้อยละ 69.9 และขณะฟอกเลือดก็จะมีผู้ดูแลเป็นส่วนใหญ่ด้วยชั่นกัน คิดเป็นร้อยละ 64.4 ผู้ดูแลคือคู่สมรสคิดเป็นร้อยละ 30.1

### ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระยะเวลาที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังอยู่ระหว่าง 7 เดือนถึง 20 ปี อายุในช่วง 1-5 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63 ระยะเวลาของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไฟเทียน อายุระหว่าง 4 เดือนถึง 10 ปี อายุในช่วง 1-5 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74 จำนวนครั้งของการฟอกเลือดส่วนใหญ่ฟอกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 84.9 อาการขณะที่กำลังฟอกเลือดด้วยเครื่องไฟเทียนส่วนใหญ่จะมีอาการเป็นตะคริวคิดเป็นร้อยละ 65.8 อาการขณะอยู่ที่บ้านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะมีอาการอ่อนเพลีย คิดเป็นร้อยละ 91.8 และร้อยละ 87.7 กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย มีโรคประจำตัว โรคประจำตัวส่วนใหญ่ที่พบคือ ความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 63

### ความต้องการการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว

ตารางที่ 3 แสดงการกระจายของค่าเฉลี่ยคะแนนความต้องการการสนับสนุนทางสังคม พบว่า ผู้ป่วยมีความต้องการการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม ด้านการประเมินค่าและด้านทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านข้อมูลข่าวสารและด้านอารมณ์อยู่ในระดับน้อย สำหรับความต้องการรายข้อ (ตารางที่ 4) พบว่าความต้องการการสนับสนุนข้อที่ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 50 ต้องการในระดับมาก ในด้านอารมณ์และด้านข้อมูลข่าวสารไม่มี แต่มีในด้านการประเมินค่า 2 ข้อ และด้านทรัพยากร 6 ข้อ

### การได้รับการสนองตอบความต้องการการสนับสนุนทางสังคม

ตารางที่ 5 แสดงการกระจายของค่าเฉลี่ยคะแนนการได้รับการสนองตอบความต้องการการสนับสนุนทางสังคม พบว่า ผู้ป่วยได้รับการสนองตอบความต้องการการสนับสนุนโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งระดับ

การได้รับการสนองตอบการสนับสนุนทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง การได้รับการสนองตอบรายข้อ (ตารางที่ 6) ที่ผู้ป่วยร้อยละ 50 รับรู้ว่าได้รับการสนองตอบความต้องการในระดับมากอยู่ในด้านการประเมินค่า 2 ข้อ ด้านทรัพยากร 8 ข้อ โดยข้อเหล่านี้สอดคล้องกับความต้องการการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วย

#### เปรียบเทียบความต้องการการสนับสนุนทางสังคมและการได้รับการสนองตอบ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความต้องการการสนับสนุนทางสังคมและการได้รับการสนองตอบการสนับสนุนทางสังคม พนว่าระดับการได้รับการสนองตอบสูงกว่าความต้องการทั้งการสนองตอบการสนับสนุนโดยรวมด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านทรัพยากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) สำหรับด้านการประเมินค่าไม่มีความแตกต่างระหว่างการได้รับการสนองตอบการสนับสนุนและความต้องการการสนับสนุน

### การอภิปรายผล

#### 1. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยໄดาวyreรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมที่ศึกษาในครั้งนี้ เพศหญิงมากกว่าเพศชายซึ่งไม่สนับสนุนข้อมูลของซิลบิเกอร์ และนูการ์เท็น (Silbiger & Neugarten, 1995) ที่พบว่าเพศเมียทบทาต่อการเสื่อมของไต เพศชายมีการเสื่อมของไตเร็วกว่าเพศหญิง ทำให้อัตราส่วนของผู้ป่วยโรคໄدائyreรังระยะสุดท้ายมีสัดส่วนระหว่างเพศชายต่อเพศหญิงประมาณ 1.4 - 1.6 ต่อ 1 ซึ่งสนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยรับการรักษาทดแทนไตในประเทศไทยปลายปี 2543 ที่พบว่าอัตราส่วนของผู้ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยจะพบเพศชายมากกว่าเพศหญิง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างไตทางช่องห้อง หรือการเปลี่ยนไต (อนุตร, 2545) แต่ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อาจจะอธิบายได้ว่าในลักษณะของการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย จึงอาจมีผลต่ออัตราส่วนของกลุ่มตัวอย่าง ในส่วนของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้ว กลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่ได้ประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ของเฟอร์รันส์ และ เพาเวอร์ (Ferrans & Power, 1985 :273-277) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่มีงานทำเนื่องจากต้องถูกออกจากร้านค้าใช้จ่ายในการฟอกเลือด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเบิกได้ สอดคล้องกับการศึกษาของมนูญมาการณ์ (2543) ที่ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยໄدائyreรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเบิกได้ เช่นกัน ส่วนค่าจ่ายอื่นๆของกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการสนับสนุนจากบุตร สอดคล้องกับลักษณะสังคมไทยเมื่อมีความคาดการณ์การเงินป่วยเป็นหนี้ที่ของบุตรที่ต้องให้การคูดซึ่งเป็นการตอบแทนบุญคุณ (จินตนา, 2540) ร้อยละ 53.4 ของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย มีระยะเวลา จำกโรงพยาบาลถึงหน่วยไตเทียมมากกว่า 30 กิโลเมตร อาจเป็นเพราะไม่มีหน่วยไตเทียมใกล้บ้านหรือมีแต่จำนวนเครื่องไม่เพียงพอ การเดินทางมาฟอกเลือดส่วนมากมาโดยรถบันไดส่วนตัว อาจจะเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างบางส่วนเป็นผู้สูงอายุ การเดินทางโดยรถรับจ้างจะไม่สะดวก จึงต้องมีครอบครัวดูแลในขณะเดินทางมาฟอกเลือด และในขณะฟอกเลือดก็จะมีครอบครัวดูแลเป็นส่วนใหญ่ด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมนูญมี (2545) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผู้มาดูแลและมารับการฟอกเลือด ในการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของนันธนา (2543) ที่พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีบุคคลในครอบครัวช่วยเหลือดูแลในขณะฟอกเลือด ผลการศึกษาที่แตกต่างกัน

อาจเนื่องจากว่า ความแตกต่างของลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา บุคคลในครอบครัวที่มาดูแลส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส รองลงมาคือนุตรสาวและบุตรชาย สอดคล้องกับการศึกษาของอัมภาวรรณ (2543)

2. ความต้องการการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ของผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องใจเทียม ตามการรับรู้ของผู้ป่วย ผู้ป่วยมีความต้องการการสนับสนุนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ มีอายุเฉลี่ย 58.37 ปี ซึ่งอยู่ในวัยกลางคน แข็งแรง ไม่ต้องพิงพาด้านกิจวัตรประจำวัน และเมื่อได้รับการฟอกเลือดทำให้กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้นกว่าก่อนฟอกเลือดจึงทำให้มีความต้องการพึ่งพาผู้อื่นน้อยลง รวมทั้งระยะเวลาที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องใจเทียมของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ปี อาจทำให้ผู้ป่วยสะสมประสบการณ์และพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ระดับหนึ่ง ทำให้ความต้องการการสนับสนุนไม่สูง สนับสนุนผลการศึกษาของนัยนา (2535) ที่พบว่า ผู้ป่วยไตรายเรื้อรัง ที่รักษาด้วยเครื่องใจเทียม ส่วนใหญ่ ผู้ป่วยมีความสามารถในการดูแลตนเองอยู่ในระดับดี

ผู้ป่วยมีความต้องการด้านอารมณ์ และด้านข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับน้อย อาจอธิบายได้ว่าเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในระยะเวลาช่วงหนึ่ง จึงทำให้สามารถปรับสภาพอารมณ์ได้มากขึ้น ข่ายเหลือตัวเองในการระบายความเครียดจากการเจ็บป่วยได้ดีขึ้น จึงมีความต้องการการสนับสนุนด้านอารมณ์อยู่ในระดับน้อย ส่วนความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะผู้ป่วยได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องจากบุคลากรที่หน่วยใจเทียม หรือเพราระการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสพบแพทย์พนพยาบาลเป็นประจำอยู่เสมอ และได้รับฟังสาระต่างๆที่เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่จากแพทย์ จากพยาบาล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในทีมสุขภาพ จึงทำให้มีความต้องการการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวอยู่ในระดับน้อย ด้านการประเมินค่ามีความต้องการสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลางอาจอธิบายได้ว่าสภาพของร่างกายที่เปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดในเรื่องเวลาที่ต้องมาฟอกเลือด ผู้ป่วยบางส่วนจึงไม่ได้ทำงานหรือทำงานแต่ประสิทิชิผลของงานลดลงหลังจากที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องใจเทียมอาจทำให้รู้สึกว่าคุณค่าของตนลงลดลงด้วย จึงมีความต้องการการสนับสนุนในส่วนนี้แต่มีความต้องการในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาจรู้สึกเกรงใจครอบครัวที่จะแสดงออกถึงความต้องการของตนเองมากเกินไปเนื่องจากครอบครัวที่มีภาระด้านอื่นมากก่ออยู่แล้วจึงมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในด้านทรัพยากรอาจอธิบายได้ว่า ในเรื่องเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ บางส่วน (ร้อยละ 37) หรือเกี่ยวกับในการทำกิจวัตรประจำวันผู้ป่วยก็สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้จึงทำให้รู้สึกว่าความต้องการการสนับสนุนจากครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง

ส่วนรายข้อเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องการในระดับมากมีเฉพาะในด้านการประเมินค่าและด้านทรัพยากร ไม่มีในด้านอารมณ์และด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายด้าน การที่ผู้ป่วยต้องการการสนับสนุนด้านการประเมินค่าในข้อ ครอบครัวเข้าใจ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และการรักษาที่กำลังได้รับอยู่ และข้อการได้รับความเห็นอกเห็นใจยอมรับในการทำงานจากบุคคลในครอบครัว เพราะเมื่อป่วยเป็นโรคไตรายเรื้อรังและต้องฟอกเลือดสภาพของร่างกายย่อมมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผิวคล้ำลง มีภาวะซีด ร่างกายชูบผอม บางคันผอมร่วง คือสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิม ส่วนประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ป่วยก็ลดลง บางรายต้องออกจากงาน ส่งผลให้รายได้ลดลงด้วย อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 50 จึงต้องการการสนับสนุนตรงส่วนนี้ในระดับมาก และการที่ผู้ป่วยต้องการการสนับสนุนด้านทรัพยากร ในข้อการช่วยเหลือเมื่อป่วยหนัก การดูแลช่วยเหลือทางด้านการเงิน

การจัดการเกี่ยวกับการเดินทาง ความต้องการเหล่านี้จะหันสภาพปัญหาและความเป็นจริงของผู้ป่วยที่ร่างกายอ่อนเพลียไม่เหมือนบุคคลทั่วไป ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งไม่สามารถทำงานได้จึงต้องการผู้ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย และผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน ซึ่งสนับสนุนการศึกษาของมนุษย์มากรัตน์ (2543) ที่พบว่าปัญหาค่าใช้จ่าย เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดในระดับรุนแรงสุด ซึ่งต้องการการสนับสนุนตรงส่วนนี้อยู่ในระดับมากด้วย หรือในเรื่องเกี่ยวกับภาวะสุขภาพทางกาย หลังฟอกเลือดเสร็จผู้ป่วยมักจะมีอาการอ่อนเพลีย ซึ่งสนับสนุนการศึกษาของ มนุษย์มากรัตน์ (2543) ที่พบว่าหลังฟอกเลือดเสร็จผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียมาก บางรายต้องนอนพัก 1-2 ชั่วโมง จึงกลับบ้านได้ ทำให้ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 50 มีความต้องการการดูแลในเรื่องการเดินทางและการดูแลในขณะฟอกเลือดอยู่ในระดับมาก

3. การได้รับการสนับสนุนด้านการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้ป่วย ได้แก่ ได้รับการสนับสนุนด้วยเครื่องใจเที่ยม โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงว่าผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนด้านการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในด้านต่างๆ เช่น เที่ยมกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ สุนันทา (2540) ที่ศึกษาในผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเครื่องใจเที่ยม พบร่วมกัน พบว่า การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ดูแลตามการรับรู้ของผู้ป่วยอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน

เมื่อพิจารณารายข้อ (ตารางที่ 6) พบร่วมกัน พบว่าการได้รับการสนับสนุนทางสังคมข้อที่ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 50 ได้รับในระดับมากอยู่ในด้านการประเมินค่าและด้านทรัพยากรซึ่งสอดคล้องกับข้อที่เป็นความต้องการ แสดงถึงความเข้าใจของครอบครัวว่าผู้ป่วยมีความต้องการอะไรและการตอบสนองเหล่านี้ไม่หนีอิสัยของครอบครัวที่จะให้การดูแลโดยเฉพาะสามาชิกที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันและมีความผูกพันธ์กับทางสายโลหิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรกับบิดามารดาซึ่งโดยวัฒนธรรมประเพณีไทยที่บุตรต้องดูแลบิดามารดา (รุจា, 2541) เมื่อพิดามารดาเกิดการเจ็บป่วยจึงเป็นหน้าที่ของบุตรที่ต้องให้การดูแล ซึ่งเป็นการตอบแทนบุญคุณ (จินตนา, 2540) ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 50 จึงรับรู้ว่าการได้รับการสนับสนุนอยู่ในระดับมาก

4. คะแนนการได้รับการสนับสนุนมากกว่าคะแนนความต้องการการสนับสนุนทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านยกเว้นด้านการประเมินค่าที่ไม่มีความแตกต่างแสดงว่าในภาพรวมผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนมากกว่าความต้องการโดยเฉพาะด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านทรัพยากร สำหรับด้านการประเมินค่าไม่มีความแตกต่างแสดงว่าผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนตามความต้องการ การที่ผู้ป่วยได้รับมากกว่าต้องการ อาจเป็นเพราะผู้ป่วยมีครอบครัวที่ดี มีเศรษฐฐานะที่ดีพอสมควร และกลุ่มตัวอย่างของครอบครัวที่ศึกษารัตน์ มีปัญหาเศรษฐกิจในระดับเล็กน้อย 28 ราย (ร้อยละ 38.4) รองลงมาคือจะไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ 20 ราย (ร้อยละ 27.4) และรายที่สองของครอบครัว (ผู้ดูแล) ร้อยละ 31.1 จะมากกว่า 20,000 บาท/เดือน ครอบครัวจึงสามารถสนับสนุนผู้ป่วยได้ตามที่ต้องการ นอกจากนั้นผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ระดับหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการได้รับการฟอกเลือด ที่ทำให้มีข่องเสียคั่งน้อยลงมีความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น ขณะที่การศึกษาของ สุนันทา (2540) ที่ศึกษาความต้องการการดูแล และการได้รับความช่วยเหลือที่บ้าน ตามการรับรู้ของผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบประคับประคองและผู้ให้การดูแล พบร่วมกัน ตามการรับรู้ของผู้ป่วยโดยรวม ไม่มีความแตกต่างแสดงว่าผู้ป่วยได้รับการตอบสนองตามที่ผู้ป่วยต้องการ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ กลุคิส และมินคี (Gurkis & Menke, 1995) พบร่วมกัน ความต้องการการสนับสนุนมีมากกว่าการได้รับการสนับสนุนในผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเครื่องใจเที่ยม

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล

ให้ข้อมูลกับครอบครัวถึงความต้องการการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อให้ความต้องการของผู้ป่วยได้รับการตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประเมินค่าและด้านทรัพยากร

### 2. ด้านการวิจัย

2.1 ศึกษาช้า และมีกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้อ้างอิงประชากรในกลุ่มนี้ได้มากกว่านี้

2.2 ศึกษาในเรื่องการของครอบครัว และความต้องการการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวผู้ป่วย ไตรายเรือรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม

2.3 ศึกษาด้วยวิธี วิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับประสบการณ์ของครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

## บรรณานุกรม

- เกรียง ตั้งส่ง่า, วสัน สุเมธกุล, และ ชนันดา ธรรมกรรานนิช. (2547). การค้นหาแนวทางในการปฏิบัติตัวและการรักษาโรคไตเรื้อรัง. กรุงเทพมหานคร: Medinfo G.D., Ltd บริษัท ใจไทยแลนด์ จำกัด.
- จินตนา สมนึก. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะในการดูแล และความต้องการการสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลที่บ้าน. *วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*, สงขลา.
- ถนน สุภาพร, อำนาจ ชัยประเสริฐ, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, พรชัย กิ่งวัฒนกุล, สุชาดา บุญแก้ว, สุขฤทัย เลขยานนท์, และคณะ. (2548). *TRT Registry Annual Report 2005*. เอกสารประจำปี 2548 ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย วันที่ 4-5 สิงหาคม 2548. ห้องสยาม กฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบรมราชวัง 50 ปีกรุงเทพฯ ยังปรางค์. (2543). ความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. สารนิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยใน มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร.
- นัยนา พิพัฒน์วนิชชา. (2535). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. *วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*, เชียงใหม่.
- บุญมี แพรุ่งสกุล. (2545). ความเห็นอย่างล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. *วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*, เชียงใหม่.
- เบญจามาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ. (2543). สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดและวิธีการเผชิญปัญหาในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม. *วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น*, ขอนแก่น.
- จุรา ภู่พนูลดย์. (2541). การพยาบาลครอบครัว: แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเจพรินติ้ง. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ลีนา องอาจยุทธ. (2546). Dialysis education. ใน กำธร ลีلامะลิ, อุปัมภ์ ศุภสินธุ์, สรุฤทธิ์ เลขยา นันท์, ลีนา องอาจยุทธ, นันทกา จันวนิช, และ สุพัฒน์ วนิชย์กุล (บรรณาธิการ), ประจำวิชาการ 25 ปี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย 11-12 ธันวาคม 2546 update in clinical practice of hemodialysis and kidney transplantation. (หน้า 233-236). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, ยศ ติราเวตนานนท์, วิชัย เกษมทวาย, และ สุวรรณा มูเก็ม. (2544). การวิเคราะห์เชิงนโยบายของ การรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายกรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนล้วนหน้า. *แพทยศาสตร์*, 30(2), 216-225.

- สุนันทา ทองพัฒนา. (2540). ความต้องการการดูแลและการได้รับความช่วยเหลือที่บ้านตามการรับผู้ป่วยของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคองและผู้ให้การดูแลวิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
- อนุตตร จิตตินันน์. (2545). การลงทะเบียนทดแทนไตในประเทศไทย (Thailand renal replacement therapy registry, TRT Registry) : รายงานปี พ.ศ. 2540-2543. ใน สมชาย เอี่ยมอ่อง, เกรียง ตั้งสง่า, และ เกื้อเกี่ยว ประดิษฐ์พรศิลป์ (บรรณาธิการ), *Practical dialysis* (หน้า 14-22). กรุงเทพมหานคร: Text and Journal Publication Co., Ltd.
- อัมภาวรรณ์ ใจเปี้ย. (2543). การดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
- Ferrans, C., & Power, M. (1985). The employment potential of hemodialysis patients. *Nursing Research*, 34(5), 273-277.
- Gurkis, J.A., & Memke, E.M. (1995). Chronic hemodialysis patients perceptions of stress, coping, and social support. *American Nephrology Nurses's Association Journal*, 4(22), 381-387.
- House, J.S. (1981). *Work stress and social support*. California: Addison - Wesley Publishing Company.
- Polit, D.F., & Beck, C.T. (2004). *Nursing research: Principles and methods* (7 th ed.). Philadelphia: Lippincott.
- Silbiger, S.R., & Neugarten, J. (1995). The impact of gender on the progression of chronic renal disease. *American Journal of Kidney Disease*, 25(4), 515-533.

### ตารางที่ 1

ความถี่และร้อยละของผู้ป่วยไทยเรื่องที่รักษาด้วยเครื่องไฟเทียม จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (N=73)

| ข้อมูลส่วนบุคคล                            | ความถี่ | ร้อยละ |
|--|---------|--------|
| อายุ ( $\bar{x} = 58.37$ , SD = 13.89)     |         |        |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี                  | 3       | 4.1    |
| 31 - 40 ปี                                 | 5       | 6.8    |
| 41- 50 ปี                                  | 11      | 15.1   |
| 51 - 60 ปี                                 | 23      | 31.5   |
| มากกว่า 60 ปี – 83 ปี                      | 31      | 42.5   |
| เพศ  |         |        |
| ชาย  | 34      | 46.6   |
| หญิง                                       | 39      | 53.4   |
| ศาสนา                                      |         |        |
| พุทธ                                       | 70      | 95.9   |
| อิสลาม                                     | 3       | 4.1    |
| สถานภาพการสมรส                             |         |        |
| โสด  | 6       | 8.2    |
| คู่  | 52      | 71.2   |
| หม้าย/หยา/แยกกันอยู่                       | 15      | 20.6   |
| ระดับการศึกษา                              |         |        |
| ไม่ได้รับการศึกษา                          | 3       | 4.1    |
| ประถมศึกษา                                 | 33      | 45.2   |
| มัธยมศึกษา                                 | 14      | 19.2   |
| ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา                    | 8       | 11.0   |
| ปริญญาตรี                                  | 14      | 19.2   |
| สูงกว่าปริญญาตรี                           | 1       | 1.4    |
| อาชีพก่อนเข้ารับการรักษาด้วยเครื่องไฟเทียม |         |        |
| ไม่ได้ประกอบอาชีพ                          | 8       | 11.0   |
| รับจ้าง                                    | 5       | 6.8    |
| รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                      | 24      | 32.9   |
| เกษตรกรรม                                  | 17      | 23.3   |
| ค้าขาย                                     | 13      | 17.8   |
| ข้าราชการบำนาญ                             | 4       | 5.5    |

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

| ข้อมูลส่วนบุคคล  | ความถี่ | ร้อยละ |
|--|---------|--------|
| นักเรียน/นักศึกษา  | 1       | 1.4    |
| ธุรกิจส่วนตัว  | 1       | 1.4    |
| <b>อาชีพปัจจุบัน</b>   |         |        |
| ไม่ได้ประกอบอาชีพ  | 34      | 46.6   |
| รับจ้าง  | 2       | 2.7    |
| รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  | 20      | 27.4   |
| เกษตรกรรม  | 5       | 6.8    |
| ค้าขาย   | 4       | 5.5    |
| <b>ข้าราชการบำนาญ</b>  | 8       | 11.0   |
| <b>ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยเครื่องไฟเทียม</b>  |         |        |
| เบิกได้ทั้งหมด   | 65      | 89.0   |
| เบิกได้บางส่วน   | 6       | 8.2    |
| เบิกไม่ได้   | 2       | 2.7    |
| <b>ใช้สิทธิการเบิกจาก</b>  |         |        |
| ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  | 65      | 89.0   |
| ประกันสังคม  | 3       | 4.1    |
| พระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้า  | 3       | 4.1    |
| ไม่มีสิทธิในการเบิกเลย   | 2       | 2.7    |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางมาฟอกเลือด ค่าอาหารในขณะที่มารับการฟอกเลือด เป็นต้น แหล่งสนับสนุนคือ</b> |         |        |
| คู่สมรส  | 12      | 16.4   |
| บุตรสาว/บุตรชาย  | 31      | 42.5   |
| บิดา/มารดา   | 2       | 2.7    |
| ตนเอง  | 27      | 37.0   |
| พี่ชาย/น้องชาย/พี่สาว/น้องสาว  | 1       | 1.4    |
| <b>รายได้ปัจจุบันเฉลี่ยต่อเดือน</b>  |         |        |
| ไม่มีรายได้  | 34      | 46.6   |
| น้อยกว่า 4,999 บาท   | 5       | 6.8    |
| 5,000 – 9,999 บาท  | 6       | 8.2    |
| 10,000 – 15,999 บาท  | 11      | 15.1   |
| 16,000 – 19,999 บาท  | 4       | 5.5    |
| มากกว่า 20,000 บาท   | 13      | 17.8   |

### ตารางที่ 1 (ต่อ)

| ข้อมูลส่วนบุคคล                    | ความถี่ | ร้อยละ |
|------------------------------------|---------|--------|
| <b>ปัญหาด้านเศรษฐกิจ</b>           |         |        |
| ไม่มีปัญหา                         | 34      | 46.6   |
| มีปัญหาเล็กน้อย                    | 26      | 35.6   |
| มีปัญหาปานกลาง                     | 8       | 11.0   |
| มีปัญหามาก                         | 5       | 6.8    |
| <b>ระยะทางจากบ้านถึงหน่วยไฟฟ้า</b> |         |        |
| น้อยกว่า 10 กิโลเมตร               | 21      | 28.8   |
| 10 – 30 กิโลเมตร                   | 13      | 17.8   |
| มากกว่า 30 กิโลเมตร                | 39      | 53.4   |
| <b>ท่านเดินทางมาด้วย</b>           |         |        |
| รถมอเตอร์ไซด์ส่วนตัว               | 11      | 15.1   |
| รถยนต์ส่วนตัว                      | 33      | 45.2   |
| รถยนต์รับจ้าง                      | 28      | 38.4   |
| รถไฟฟ้า                            | 1       | 1.4    |
| <b>ผู้ดูแลขณะเดินทางมาฟอกเลือด</b> |         |        |
| ไม่มีผู้ดูแล                       | 22      | 30.1   |
| มีผู้ดูแล                          | 51      | 69.9   |
| ญาติสมรส                           | 24      | 32.9   |
| บุตรสาว/บุตรชาย                    | 21      | 28.8   |
| บิดา/มารดา                         | 2       | 2.7    |
| พี่ชาย/น้องชาย/พี่สาว/น้องสาว      | 3       | 4.1    |
| หลานสาว/หลานชาย                    | 1       | 1.4    |
| <b>ผู้ดูแลขณะที่กำลังฟอกเลือด</b>  |         |        |
| ไม่มีผู้ดูแล                       | 26      | 35.6   |
| มีผู้ดูแล                          | 47      | 64.4   |
| ญาติสมรส                           | 22      | 30.1   |
| บุตรสาว/บุตรชาย                    | 19      | 26.0   |
| บิดา/มารดา                         | 2       | 2.7    |
| พี่ชาย/น้องชาย/พี่สาว/น้องสาว      | 3       | 4.1    |
| หลานสาว/หลานชาย                    | 1       | 1.4    |

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

| ข้อมูลส่วนบุคคล                                       | ความถี่ | ร้อยละ |
|---|---------|--------|
| <b>บุคคลในครอบครัวที่ให้การดูแลช่วยเหลือมากที่สุด</b> |         |        |
| <b>ขณะอยู่บ้านคือ</b>                                 |         |        |
| คู่สมรส   | 39      | 53.4   |
| บุตรสาว/บุตรชาย                                       | 25      | 34.2   |
| บิดา/มารดา  | 6       | 8.2    |
| พี่ชาย/น้องชาย/พี่สาว/น้องสาว                         | 2       | 2.7    |
| หลานสาว/หลานชาย                                       | 1       | 1.4    |

## ตารางที่ 2

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุดต่ำสุด จำแนกตามระยะเวลาที่เจ็บป่วย ระยะเวลาที่ฟอกเลือดโรคประจำตัว (N=73)

| ข้อมูลส่วนบุคคล  | ความถี่ | ร้อยละ |
|--|---------|--------|
| ระยะเวลาที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรัง ( $\bar{x} = 5.17$ , SD = 3.94, Min=.70, Max=20)      |         |        |
| น้อยกว่า 1 ปี  | 1       | 1.4    |
| 1 – 5 ปี   | 46      | 63.0   |
| มากกว่า 5 ปี   | 26      | 35.6   |
| ระยะเวลาของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ( $\bar{x} = 3.61$ , SD = 2.57, Min= .40, Max=10) |         |        |
| น้อยกว่า 1 ปี  | 4       | 5.5    |
| 1 – 5 ปี   | 54      | 74.0   |
| มากกว่า 5 ปี   | 15      | 20.5   |
| จำนวนครั้งของการฟอกเลือด/สัปดาห์   |         |        |
| 2 ครั้ง/สัปดาห์  | 62      | 84.9   |
| 3 ครั้ง/สัปดาห์  | 11      | 15.1   |
| โรคประจำตัวอื่นๆนอกจากโรคไตวาย (ตอบได้มากกว่า 1 โรค)                                       |         |        |
| ไม่มี  | 9       | 12.3   |
| มี   | 64      | 87.7   |
| เบาหวาน  | 22      | 30.1   |
| ความดันโลหิตสูง  | 46      | 63.0   |
| เก้าท์   | 9       | 12.3   |
| หัวใจ  | 4       | 5.5    |
| ถุงน้ำที่ไต  | 3       | 4.1    |
| ไข้พูด   | 1       | 1.4    |
| ภูมิแพ้  | 1       | 1.4    |
| อาการขณะอยู่ที่บ้าน (ใน 1 เดือนที่ผ่านมา) (ตอบได้มากกว่า 1 อาการ)                          |         |        |
| อ่อนเพลีย  | 67      | 91.8   |
| ปวดศีรษะ   | 44      | 60.3   |
| คัน  | 42      | 57.5   |
| อาการขณะที่กำลังฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม   |         |        |
| ตะคริว   | 48      | 65.8   |
| ความดันโลหิตต่ำ  | 40      | 54.8   |
| ความดันโลหิตสูง  | 38      | 52.1   |

### ตารางที่ 3

ช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความนิ่ว ของคะแนน ความต้องการการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมตามการรับรู้ของผู้ป่วยโดยรวมและรายด้าน ( $N=73$ )

| ความต้องการ        | $\bar{x}$ | S.D. | Skewness | CV  | ระดับ   |
|--------------------|-----------|------|----------|-----|---------|
| <b>การสนับสนุน</b> |           |      |          |     |         |
| โดยรวม             | 1.38      | .35  | .49      | .25 | ปานกลาง |
| <b>รายด้าน</b>     |           |      |          |     |         |
| ด้านอารมณ์         | .92       | .63  | .32      | .68 | น้อย    |
| ด้านข้อมูลทั่วสาร  | 0.96      | .53  | .51      | .55 | น้อย    |
| ด้านการประเมินค่า  | 1.87      | .43  | -.63     | .23 | ปานกลาง |
| ด้านทรัพยากร       | 1.36      | .37  | .55      | .27 | ปานกลาง |

### ตารางที่ 4

ความต้องการการสนับสนุนตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 50 มีความต้องการการสนับสนุนอยู่ในระดับมากหรือลำดับต้นร้อยละของผู้ป่วยที่มีความต้องการ ( $N=73$ )

| ความต้องการการสนับสนุนข้อที่ผู้ป่วยร้อยละ 50 ขึ้นไปต้องการ                          | ร้อยละ |
|---|--------|
| <b>ในระดับมาก</b>   |        |
| การประเมินค่า   |        |
| 1. ครอบครัวเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และการรักษาที่กำลังได้รับอยู่    | 95.9   |
| 2. การได้รับความเห็นอกเห็นใจยอมรับในการทำงานจากบุคคลในครอบครัว                      | 91.8   |
| ทรัพยากร  |        |
| 1. การช่วยเหลือเมื่อป่วยหนักและจัดการกับภารกิจ                                      | 94.5   |
| 2. การเก็บօอมรายได้บางส่วนไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน                                    | 82.2   |
| 3. การช่วยหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้เพียงพอ                           | 80.8   |
| 4. การช่วยเหลือในเรื่องพาหนะเมื่อต้องเดินทางไปฟอกเลือด เช่น                         | 57.5   |
| การจัดรถรับส่งให้   |        |
| 5. การช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล  | 57.5   |
| 6. การเดินทางไปเป็นเพื่อนและช่วยดูแลในขณะที่ฟอกเลือด หรือเวลาที่ต้องพนแพบทื้ามันดัด | 54.8   |

### ตารางที่ 5

ช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเบี้ยวองคะแนนการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมตามการรับรู้ของผู้ป่วยโดยรวมและรายด้าน

| การได้รับการ       | $\bar{x}$ | S.D. | Skewness | CV  | ระดับ   |
|--------------------|-----------|------|----------|-----|---------|
| <b>การสนับสนุน</b> |           |      |          |     |         |
| โดยรวม             | 1.54      | .48  | .73      | .31 | ปานกลาง |
| <b>รายด้าน</b>     |           |      |          |     |         |
| ด้านอารมณ์         | 1.02      | .64  | .19      | .63 | ปานกลาง |
| ด้านข้อมูล่าวสาร   | 1.05      | .64  | .77      | .61 | ปานกลาง |
| ด้านการประเมินค่า  | 1.87      | .46  | -.55     | .25 | ปานกลาง |
| ด้านทรัพยากร       | 1.54      | .49  | .58      | .32 | ปานกลาง |

### ตารางที่ 6

การได้รับการสนับสนุนตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 50 รับรู้ว่าได้รับการสนับสนุนอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการสนับสนุน ( $N=73$ )

| การได้รับการสนับสนุนที่ผู้ป่วยได้รับในระดับมาก                                    | ร้อยละ |
|---|--------|
| ประเมินค่า  |        |
| 1. ครอบครัวเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และการรักษาที่กำลังได้รับอยู่  | 95.9   |
| 2. การได้รับความเห็นอกเห็นใจยอมรับในการทำงานจากบุคคลในครอบครัว                    | 94.5   |
| ทรัพยากร  |        |
| 1. การซ่วยเหลือเมื่อป่วยหนักและจัดการกับภารกิจ                                    | 90.4   |
| 2. การซ่วยหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้เพียงพอ                         | 70.4   |
| 3. การเก็บออมรายได้บังส่วนไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน                                  | 68.5   |
| 4. การซ่วยเหลือในการทำงานบ้าน   | 67.1   |
| 5. การซ่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล  | 61.6   |
| 6. การซ่วยเหลือในเรื่องพาหนะมีต้องดินทางไปฟอกเลือดชั่วคราวสั่งให้                 | 60.3   |
| 7. การจัดเตรียมอาหารที่ชอบรับประทานและเหมาะสมกับโรค เช่น อาหารรสจืด อาหารไขมันต่ำ | 60.3   |
| 8. การเดินทางไปเป็นเพื่อนและช่วยดูแลในขณะที่ฟอกเลือดหรือเวลาที่ต้องพนแพทย์ตามนัด  | 58.9   |

### ตารางที่ 7

เปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความต้องการและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมตามการรับรู้ของผู้ป่วย

| ความต้องการการสนับสนุน   | $\bar{x}$ | S.D. | (paired t-test)   |
|--------------------------|-----------|------|-------------------|
| <b>โดยรวมทุกด้าน</b>     |           |      |                   |
| ความต้องการการสนับสนุน   | 1.38      | .35  | -5.78**           |
| การได้รับการสนับสนุน     | 1.54      | .48  |                   |
| <b>รายด้านทุกด้าน</b>    |           |      |                   |
| <b>ด้านอารมณ์</b>        |           |      |                   |
| ความต้องการการสนับสนุน   | .92       | .63  | -2.04*            |
| การได้รับการสนับสนุน     | 1.02      | .64  |                   |
| <b>ด้านข้อมูลข่าวสาร</b> |           |      |                   |
| ความต้องการการสนับสนุน   | .96       | .53  | -2.10*            |
| การได้รับการสนับสนุน     | 1.05      | .64  |                   |
| <b>ด้านการประเมินค่า</b> |           |      |                   |
| ความต้องการการสนับสนุน   | 1.87      | .43  | .10 <sup>ns</sup> |
| การได้รับการสนับสนุน     | 1.87      | .46  |                   |
| <b>ด้านทรัพยากร</b>      |           |      |                   |
| ความต้องการการสนับสนุน   | 1.36      | .37  | -6.52**           |
| การได้รับการสนับสนุน     | 1.54      | .49  |                   |

\*p<.05 \*\*p<.01 ns = non significant

**Social Support : Needs and Received Responses of Chronic Renal Failure Patients Receiving  
Hemodialysis\***

Khongain Supap Pinthong\*\* Sunuttra Taboonpong\*\*\* Vipavee Khongain\*\*\*\*

**ABSTRACT**

The purposes of this study were to investigate needs for social support from family and received responses to the needs among chronic renal failure patients receiving hemodialysis at public hospital in southern Thailand. Seventy three patients who receiving hemodialysis were purposefully approached to participate in the study. Questionnaires used in data collection included patient's personal data forms, and social support needs and received responses questionnaires. The data were analyzed using descriptive statistics, paired t-test. The result were as follows.

1. Overall needs for social support from family, and needs for appraisal and instrumental support were at a medium level, needs for emotional and information support were at a low level.
2. Received responses to overall needs and all each of dimensions were at a medium level.
3. Received social support scored significantly higher than the needs for social support with regard to overall, emotional and instrumental support ( $p<.05$ ). There was no significantly difference in needs and received responses for appraisal.

The results indicate that the subjects needed appraisal and instrumental support more than emotional and information support. The patients received good social support from their families.

---

**Keywords:** Social Support, Needs, Received Responses, Chronic Renal Failure Patients Receiving Hemodialysis

---

\*Master of Nursimg Science, Faculty of Nursimg, Prince of Songkla University

\*\*Registerd Nurse, Songkhla Hospital, Songkhla Province

\*\*\* Associate professor, Faculty of Nursimg, Prince of Songkla University

\*\*\*\* Assistant, Faculty of Nursimg, Prince of Songkla University