

ภาคผนวก ก

แบบบันทึกข้อมูลเลขที่

แบบสัมภาษณ์แพทย์เกี่ยวกับการสั่งใช้ยาสำหรับบริหารทางสายชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะ ก่อนการแก้ปัญหาโดยเภสัชกร

เรียน

เนื่องจากกลุ่มงานเภสัชกรรมได้ริเริ่มดูแลผู้ป่วยที่มีการบริหารยาทางสายชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะ (Nasgastric tube , NG tube) ในการหาปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วย กลุ่มงานเภสัชกรรม จึงขอความร่วมมือท่านในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการนำไปพัฒนาการใช้ยาในผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่อไป

ด้วยความขอบคุณยิ่ง

	สำหรับผู้วิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	
1.1 เพศ () ()	1.1 ()
1.2 อายุปี	1.2 () ()
1.3 ท่านเป็น () แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ () แพทย์ประจำบ้าน สาขา	1.3 ()
() แพทย์ใช้ทุน	
1.4 ประสบการณ์ในการทำงานปี	1.4 () ()
1.5 ท่านเคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการสั่งใช้ยาทางสายชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะ จากแหล่งใดบ้าง เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ () หลักสูตรการเรียนการสอน () ตำรา / เอกสารทางวิชาการ / คู่มือต่าง ๆ () การประชุมวิชาการ () คำแนะนำจากเภสัชกร () อื่น ๆ โปรดระบุ	1.5 () () () () ()

ตอนที่ 2 ท่านเคยสั่งใช้ยาเหล่านี้สำหรับผู้ป่วยที่บริหารยา ทางสายชนิด สอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะหรือไม่	ใช่	ไม่ใช่	สำหรับผู้วิจัย
2.1 Voltaren [®] SR (diclofenac tablet , 75 mg)	()	()	2.1 () ()
2.2 Plendil [®] (felodipine tablet , 5 mg)	()	()	2.2 ()
2.3 Natrilix [®] SR (indapamide tablet , 1.5 mg)	()	()	2.3 ()
2.4 Imdur [®] , (Isosorbide mononitrate , 60 mg)	()	()	2.4 ()
2.5 Oruvail [®] (ketoprofen capsule , 100 mg)	()	()	2.5 ()
2.6 Prevacid [®] (lansoprazole capsule , 30 mg)	()	()	2.6 ()
2.7 MST Contnus [®] (morphine sulphate tablet , 10 mg)	()	()	2.7 ()
2.8 Adalat [®] CR (nifedipine capsule , 30 mg)	()	()	2.8 ()
2.9 Cardil [®] SR (diltiazem tablet , 120 mg)	()	()	2.9 ()
2.10 Trental [®] (pentoxifyllin tablet , 400 mg)	()	()	2.10 ()
2.11 Trivastal [®] retard (piribedil tablet , 50 mg)	()	()	2.11 ()
2.12 KCL หรือ Addi K [®] (potassium chloride tablet , 750 mg)	()	()	2.12 ()
2.13 Inderal [®] LA (propranolol HCL capsule , 80 mg)	()	()	2.13 ()

เฉลยภาคผนวก ก

ตอนที่ 2

ข้อ 2.1 - 2.27

ถ้าตอบ ใช่ ได้ 0 คะแนน

ถ้าตอบ ไม่ใช่ ได้ 1 คะแนน