

ภาคผนวก ช
แบบสัมภาษณ์พยาบาลเกี่ยวกับการบริหารยาทางสายให้อาหาร
หลังการแก้ปัญหาโดยเภสัชกร

เรียน

หลังจากเภสัชกรได้จัดประชุมและแจกเอกสารเกี่ยวกับการบริหารยาทางสายให้อาหาร แล้วท่านได้ปฏิบัติอย่างไร กรุณาตอบให้ตรงกับที่ท่านปฏิบัติงานจริงมากที่สุด

<p>ตอนที่ 1 ท่านได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีบริหารยาทางสายให้อาหาร จากเภสัชกรหรือไม่ () ได้() จากการเข้าร่วมประชุม () จากเอกสารที่ทำแจก () ไม่ได้</p> <p>ตอนที่ 2 กรณีสมมติ :ผู้ป่วยชาย อายุ 76 ปี เข้ารับรักษาด้วยอาการ recurrent CA esophagus ได้อาหารทางสายชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะ และแพทย์สั่งให้ยาดังนี้ Motilium 1 tab. t.i.d ac Ranitidine 1 tab. b.i.d pc</p> <p>2.1 กรณียา Motilium[®] ที่ "ให้ก่อนอาหาร หรือ ac" ท่านให้ยาก่อนให้อาหารทางสายเป็นระยะเวลาานานเท่าใด () ทันที () 15 - 30 นาที () มากกว่า 30 นาที</p> <p>2.2 ท่านได้ให้น้ำทางสายก่อนให้ยา Motilium[®] ที่ให้ "ก่อนอาหาร หรือ ac" หรือไม่ () ปฏิบัติ () ไม่ได้ปฏิบัติ *** ถ้าตอบ ไม่ได้ปฏิบัติ กรุณาทำต่อข้อ 2.4</p> <p>2.3 ถ้าท่านได้ให้น้ำทางสายก่อนให้ยา Motilium[®] กรุณาระบุปริมาณน้ำที่ให้ () น้อยกว่า 15 มล. () 15 - 30 มล. () มากกว่า 30 มล.</p>	<p>สำหรับผู้วิจัย</p> <p>2.1 ()</p> <p>2.2 ()</p> <p>2.3 ()</p>
--	---

ตอนที่ 2 (ต่อ)	สำหรับผู้วิจัย
<p>2.10 ถ้าท่านได้เจ็จางยาน้ำก่อนให้ทางสาย กรุณาระบุปริมาณน้ำที่ใช้เจ็จาง () น้อยกว่า 10 มล. () 10 - 30 มล. () มากกว่า 30 มล.</p>	2.10 ()
<p>2.11 ท่านปฏิบัติอย่างไร เมื่อต้องบริหารยาที่มีลักษณะเป็นเม็ด เช่น ยา paracetamol tablet หรือ B complex tablet () บดยาแต่ละตัว / ผสมน้ำ แล้วให้ทางสายทีละตัว () บดยาแต่ละตัว / นำรวมกัน / ผสมน้ำ แล้วให้ทางสาย () บดยาแต่ละตัว / ผสมน้ำแต่ละตัว / นำรวมกัน แล้วให้ทางสาย () บดยารวมกัน และผสมน้ำ แล้วให้ทางสาย</p>	2.11 ()
<p>2.12 ท่านปฏิบัติอย่างไร เมื่อต้องบริหารยาแคปซูลชนิดเจลลาตินแข็ง (hard gelatin capsule) ตัวอย่างเช่น amoxicillin capsule หรือ cloxacillin capsule ทางสายให้อาหาร () เปิดแคปซูล / ทิ้งเปลือกไป / เอาผงยาข้างในมาผสมน้ำ / ให้ทางสาย () เปิดแคปซูล / ทิ้งเปลือกไป / เอาผงยาข้างในมาให้ทางสาย / ให้น้ำตาม () เปิดแคปซูล / เอาผงข้างใน และเปลือกมาผสมน้ำ / ให้ทางสาย</p>	2.12 ()
<p>2.13 ท่านปฏิบัติอย่างไร เมื่อต้องบริหารยาเม็ดแคปซูลชนิดเจลลาตินนิ่ม (soft gelatin capsule) ตัวอย่างเช่น ยา Adalat ขนาด 10 mg ทางสายให้อาหาร () เจาะแคปซูลด้วยเข็ม/บีบยาข้างในมาผสมน้ำ/ให้ทางสาย/ทิ้งเปลือกไป () เจาะแคปซูลด้วยเข็ม/บีบยาข้างในลงในสายยาง/ให้น้ำตาม/ทิ้งเปลือกไป () ละลายยาทั้งหมดโดยแช่น้ำทิ้งไว้ให้เปลือกนิ่ม/ให้ทางสาย () เจาะแคปซูลด้วยเข็ม/บีบยาข้างในออกมาผสมน้ำพร้อมเปลือก/ให้ทางสาย</p>	2.13 ()
<p>2.14 ท่านเคยเติมยาลงในอาหารที่จะให้หรือไม่ () ปฏิบัติ () ไม่ได้ปฏิบัติ</p>	2.14 ()

ตอนที่ 3 หลังจากเภสัชกรได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารยาทางสายให้อาหาร ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2545 เป็นต้นมา ท่านได้บริหารยาเหล่านี้ทางสายให้อาหารอีกหรือไม่			สำหรับผู้วิจัย
3.1 Voltaren [®] SR (diclofenac tablet , 75 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.1 ()
3.2 Plendil [®] (felodipine tablet , 5 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.2 ()
3.3 Natrilix [®] SR (indapamide tablet , 1.5 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.3 ()
3.4 Imdur [®] (Isosorbide mononitrate , 60 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.4 ()
3.5 Oruvail [®] (ketoprofen capsule , 100 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.5 ()
3.6 Prevacid [®] (lansoprazole capsule , 30 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.6 ()
3.7 MST Contnus [®] (morphine sulphate tablet , 10 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.7 ()
3.8 Adalat [®] CR (nifedipine capsule , 30 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.8 ()
3.9 Cardil [®] SR (diltiazem tablet , 120 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.9 ()
3.10 Trental [®] (pentoxifyllin tablet , 400 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.10 ()
3.11 Trivastal [®] retard (piribedil tablet , 50 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.11 ()
3.12 KCL หรือ Addi K [®] (potassium chloride tablet , 750 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.12 ()

ตอนที่ 3 (ต่อ)			สำหรับผู้วิจัย
3.14 Theodur [®] (theophylline tablet , 200 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.14 ()
3.15 Aspent [®] (aspirin tablet , 300 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.15 ()
3.16 Dulcolax [®] (bisacodyl tablet , 5 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.16 ()
3.17 Hydergine FAS [®] (codergocrine tablet , 4.5 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.17 ()
3.18 Voltaren [®] (diclofenac tablet , 25 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.18 ()
3.19 Erythromycin tablet , 250 mg	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.19 ()
3.20 Premarin [®] (conjugated estrogen tablet)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.20 ()
3.21 Losec [®] (omeprazole capsule , 20 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.21 ()
3.22 Depakine [®] (sodium valproate tablet , 200 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.22 ()
3.23 Isordil [®] (สำหรับอมใต้ลิ้น) (isosorbide dinitrate tablet , 5 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.23 ()
3.24 Dilantin [®] (phenytoin capsule , 100 mg)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.24 ()
3.25 Metamucil powder (psyllium)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.25 ()
3.26 Kayexalate [®] (sodium polystyrene sulfonate)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.26 ()
3.27 Alum milk [®] (aluminium – containing antacid)	() ปฏิบัติ	() ไม่ได้ปฏิบัติ	3.27 ()

เฉลยภาคผนวก ช

ตอนที่ 2

2.1 ตอบ () 15 - 30 นาที หรือ () มากกว่า 30 นาที	ได้	1	คะแนน
2.2 ตอบ ปฏิบัติ	ได้	1	คะแนน
2.3 ตอบ () 15 - 30 มิลลิลิตร หรือ () มากกว่า 30 มิลลิลิตร	ได้	1	คะแนน
2.4 ตอบ () 15 - 30 นาที หรือ () มากกว่า 30 นาที	ได้	1	คะแนน
2.5 ตอบ ปฏิบัติ	ได้	1	คะแนน
2.6 ตอบ ข้อใดข้อหนึ่ง	ได้	1	คะแนน
2.7 ตอบ ปฏิบัติ	ได้	1	คะแนน
2.8 ตอบ () 3 - 10 มิลลิลิตร หรือ () 30 - 50 มิลลิลิตร หรือ () มากกว่า 50 มิลลิลิตร	ได้	1	คะแนน
2.9 ตอบ ปฏิบัติ	ได้	1	คะแนน
2.10 ตอบ 10 - 30 มิลลิลิตร หรือ มากกว่า	ได้	1	คะแนน
2.11 ตอบ บดยาแต่ละตัว / ผสมน้ำ แล้วให้ทางสายที่ละตัว	ได้	1	คะแนน
2.12 ตอบ เปิดแคปซูล / ทิ้งเปลือกไป / เอาผงยาข้างในมาผสมน้ำ / ให้ทางสาย	ได้	1	คะแนน
2.13 ตอบ เจาะแคปซูลด้วยเข็ม / บีบยาข้างในมาผสมน้ำ / ให้ทางสายอาหาร / ทิ้งเปลือกไป	ได้	1	คะแนน
2.14 ตอบ ไม่ได้ปฏิบัติ	ได้	1	คะแนน
ตอนที่ 3			
ข้อ 3.1 - 3.27 ตอบ ไม่ได้ปฏิบัติ	ได้	1	คะแนน
ตอบ ปฏิบัติ	ได้	0	คะแนน