

ภาคผนวก จ

แบบสัมภาษณ์แพทย์เกี่ยวกับการสั่งใช้ยาสำหรับบริหารทางสายให้อาหาร
หลังการแก้ปัญหาโดยเภสัชกร

เรียน

หลังจากเภสัชกรได้พูดคุยและแจกเอกสารเกี่ยวกับการสั่งใช้ยาทางสายให้อาหาร
กับท่านแล้วท่านได้สั่งใช้ยาเหล่านี้ทางสายให้อาหารอีกหรือไม่ ถ้าสั่งใช้กรุณาระบุเหตุผลที่เลือกใช้
ยาดังกล่าว

			สำหรับผู้วิจัย
1 Voltaren [®] SR (diclofenac tablet , 75 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล.....	1 ()
2 Plendil [®] (felodipine tablet , 5 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล.....	2 ()
3 Natrilix [®] SR (indapamide tablet , 1.5 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	3 ()
4 Imdur [®] (Isosorbide mononitrate , 60 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	4 ()
5 Oruvail [®] ketoprofen capsule , 100 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	5 ()
6 Prevacid [®] (lansoprazole capsule , 30 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	6 ()
7 MST Continus [®] (morphine sulphate tablet , 10 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	7 ()
8 Adalat [®] CR (nifedipine capsule , 30 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	8 ()
9 Cardil [®] SR (diltiazem tablet , 120 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	9 ()

			สำหรับผู้วิจัย
10 Trental® (pentoxifyllin tablet , 400 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	10 ()
11 Trivastal® retard (piribedil tablet , 50 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	11 ()
12 KCL หรือ Addi K® (potassium chloride tablet , 750 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	12 ()
13 Inderal® LA (propranolol HCL capsule , 80 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	13 ()
14 Theodur® (theophylline tablet , 200 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	14 ()
15 Aspent® (aspirin tablet , 300 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	15 ()
16 Dulcolax® (bisacodyl tablet , 5 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	16 ()
17 Hydergine FAS® (cergocrine tablet , 4.5 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	17 ()
18 Voltaren® (diclofenac tablet , 25 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	18 ()
19 Erythromycin tablet , 250 mg	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	19 ()
20 Premarin® (conjugated estrogen tablet)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	2.20 ()
21 Losec® (omeprazole capsule , 20 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	21 ()
22 Depakine® (sodium valproate tablet , 200 mg)	() สั่งใช้ () ไม่สั่ง	เหตุผล	22 ()

			สำหรับผู้วิจัย
23 Isordil® (สำหรับอมใต้ลิ้น)	() สั่งใช้	เหตุผล	23 ()
(isosorbide dinitrate tablet , 5 mg)	() ไม่สั่ง		
24 Dilantin®	() สั่งใช้	เหตุผล	24 ()
(phenytoin capsule , 100 mg)	() ไม่สั่ง		
25 Metamucil powder	() สั่งใช้	เหตุผล	25 ()
(psyllium)	() ไม่สั่ง		
26 Kayexalate®	() สั่งใช้	เหตุผล	26 ()
(sodium polystyrene sulfonate)	() ไม่สั่ง		
27 Alum milk	() สั่งใช้	เหตุผล	27 ()
(aluminium - containing antacid)	() ไม่สั่ง		

เฉลยภาคผนวก จ

ข้อ 1 - 27 ตอบ สั่งใช้
ตอบ ไม่สั่ง

ได้ 0 คะแนน

ได้ 1 คะแนน