

## ภาคผนวก ข

แบบบันทึกข้อมูลเลขที่ .....

แบบสัมภาษณ์พยาบาลในลักษณะสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับการบริหารยาทางสาย  
ชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะ ก่อนการแก้ปัญหาโดยเภสัชกร

เรียน .....

เนื่องจาก กลุ่มงานเภสัชกรรม ได้ริเริ่มดูแลผู้ป่วยที่มีการบริหารยาทางสายชนิดสอดเข้า  
จมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะ ในการหาปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วย กลุ่มงานเภสัชกรรมจึงขอความ  
ร่วมมือท่านในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการนำไป  
พัฒนาการใช้ยาในผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่อไป

ด้วยความขอบคุณยิ่ง

กลุ่มงานเภสัชกรรม

	สำหรับผู้วิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	
1.1 เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง	1.1 ( )
1.2 อายุ .....ปี	1.2 ( ) ( )
1.3 ท่านเป็น ( ) พยาบาลวิชาชีพ ( ) พยาบาลเทคนิค	1.3 ( )
1.4 ประสบการณ์การทำงาน .....ปี	1.4 ( ) ( )
1.5 เคยปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยที่มีการให้ยาทางสายชนิดสอดเข้าจมูกปลายสาย อยู่ที่กระเพาะจนถึงปัจจุบันรวม .....ปี	1.5 ( ) ( )
1.6 ท่านเคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการให้ยาทางสายชนิดสอดเข้าจมูกปลาย สายอยู่ที่กระเพาะจากแหล่งใดบ้าง เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ	1.6
( ) หลักสูตรการเรียนการสอนในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย	( )
( ) ตำรา / เอกสารทางวิชาการ / คู่มือต่าง ๆ	( )
( ) การประชุมวิชาการต่าง ๆ	( )
( ) คำแนะนำจากแพทย์	( )
( ) คำแนะนำจากเภสัชกร	( )
( ) คำแนะนำรุ่นพี่พยาบาล / เพื่อนร่วมงาน	( )
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ .....	( )

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารยาทางสาย ชนิดสอดเข้าจมูก  
 ปลายสายอยู่ที่กระเพาะ  
 กรุณาตอบคำถามดังเช่นท่านปฏิบัติจริงให้ละเอียดมากที่สุดเท่าที่ท่านทำได้

ผู้ป่วยชาย อายุ 76 ปี เข้ารับรักษาด้วยอาการ recurrent CA esophagus  
 ได้อาหารทางสายชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะ และแพทย์สั่งใช้ยาดังนี้

Motilium 1 tab. t.i.d ac  
 Ranitidine 1 tab. b.i.d pc

- จากสถานการณ์สมมติข้างบน กรุณาตอบคำถามข้อ 2.1 - 2.6
- 2.1 กรณียา Motilium ที่ "ให้ก่อนอาหาร หรือ ac" ท่านให้ยาก่อนให้อาหารทางสาย เป็นระยะเวลาานเท่าใด (ระบุเป็นนาที)..... 2.1 ( ) ( )
- 2.2 ท่านได้ให้น้ำทางสายยกก่อนให้ยา Motilium หรือไม่ 2.2 ( )
- ( ) ปฏิบัติ
- ( ) ไม่ได้ปฏิบัติ
- 2.3 จาก 2.2 ถ้าตอบ "ปฏิบัติ" กรุณาระบุปริมาณน้ำที่ท่านให้ทางสายในหน่วย มิลลิลิตร ..... 2.3 ( ) ( )
- .....
- 2.4 กรณี Ranitidine ที่มีคำสั่ง "ให้หลังอาหาร หรือ pc" ท่านให้ยาหลังให้อาหารแล้ว เป็นระยะเวลาานเท่าใด( ระบุเป็นนาที)..... 2.4 ( ) ( )
- 2.5 ท่านได้ให้น้ำทางสายหลังให้ยา Ranitidine หรือไม่ 2.5 ( ) ( )
- ( ) ปฏิบัติ
- ( ) ไม่ได้ปฏิบัติ
- 2.6 จาก 2.5 ถ้าตอบ "ปฏิบัติ" กรุณาระบุปริมาณน้ำที่ท่านให้ทางสาย เป็น มิลลิลิตร ..... 2.6 ( )
- .....
- 2.7 กรณีที่มียาหลาย ๆ ตัว ในมือเดียวกัน ท่านมีการให้น้ำทางสายระหว่าง ให้ยาแต่ละตัวหรือไม่ 2.7 ( )
- ( ) ปฏิบัติ
- ( ) ไม่ได้ปฏิบัติ
- 2.8 จาก 2.7 ถ้าตอบ "ปฏิบัติ" กรุณาระบุปริมาณน้ำที่ท่านให้ในหน่วยมิลลิลิตร ..... 2.8 ( )
- .....

	สำหรับผู้วิจัย
2.9 ในกรณีที่ต้องให้น้ำ ท่านได้เจือจางยาน้ำก่อนให้ทางสายหรือไม่ ( ) ปฏิบัติ ( ) ไม่ได้ปฏิบัติ	2.9 ( ) ( )
2.10 จากข้อ 2.8 ถ้าตอบ "ปฏิบัติ" กรุณาระบุปริมาณน้ำที่ท่านใช้เจือจางในหน่วยมิลลิลิตร .....	2.10 ( ) ( )
2.11 ท่านปฏิบัติอย่างไร เมื่อต้องบริหารยาที่มีลักษณะเป็นเม็ด เช่น ยา paracetamol tablet หรือ B complex tablet ..... ..... .....	2.11 ( )
2.12 ท่านปฏิบัติอย่างไร เมื่อต้องบริหารยาแคปซูลชนิดเจลลาตินแข็ง ( hard gelatin capsule ) ตัวอย่างเช่น amoxicillin capsule หรือ cloxacillin capsule ..... ..... .....	2.12 ( ) ( )
2.13 ท่านปฏิบัติอย่างไร เมื่อต้องบริหารยาเม็ดแคปซูลชนิดเจลลาตินนิ่ม ( soft gelatin capsule ) ตัวอย่างเช่น ยา Adalat ขนาด 10 mg ..... ..... .....	2.13 ( )
2.14 ท่านเคยเติมยาลงในอาหารที่จะให้หรือไม่ ( ) ปฏิบัติ ( ) ไม่ได้ปฏิบัติ	2.14 ( )
2.15 ถ้าตอบ "ปฏิบัติ" กรุณาระบุชื่อยา ..... .....	

ตอนที่ 3 ท่านเคยบริหารยาต่อไปนี้ ทางสายชนิดสอดเข้าจมูกปลาย สายอยู่ที่กระเพาะหรือไม่		ใช่	ไม่ใช่	สำหรับผู้วิจัย
3.1 Voltaren <sup>®</sup> SR (diclofenac tablet , 75 mg)	( )	( )	3.1 ( )	
3.2 Plendil <sup>®</sup> (felodipine tablet , 5 mg)	( )	( )	3.2 ( )	
3.3 Natrilix <sup>®</sup> SR (indapamide tablet , 1.5 mg)	( )	( )	3.3 ( )	
3.4 Imdur <sup>®</sup> (Isosorbide mononitrate , 60 mg)	( )	( )	3.4 ( )	
3.5 Oruvail <sup>®</sup> (ketoprofen capsule , 100 mg)	( )	( )	3.5 ( )	
3.6 Prevacid <sup>®</sup> (lansoprazole capsule , 30 mg)	( )	( )	3.6 ( )	
3.7 MST Contnus <sup>®</sup> (morphine sulphate tablet , 10 mg)	( )	( )	3.7 ( )	
3.8 Adalat <sup>®</sup> CR (nifedipine capsule , 30 mg)	( )	( )	3.8 ( )	
3.9 Cardil <sup>®</sup> SR (diltiazem tablet , 120 mg)	( )	( )	3.9 ( )	
3.10 Trental <sup>®</sup> (pentoxifyllin tablet , 400 mg)	( )	( )	3.10 ( )	
3.11 Trivastal <sup>®</sup> retard (piribedil tablet , 50 mg)	( )	( )	3.11 ( )	
3.12 KCL หรือ Addi K <sup>®</sup> (potassium chloride tablet , 750 mg)	( )	( )	3.12 ( )	
3.13 Inderal <sup>®</sup> LA (propranolol HCL capsule , 80 mg)	( )	( )	3.13 ( )	

	ใช่	ไม่ใช่	สำหรับผู้วิจัย
3.14 Theodur <sup>®</sup> (theophylline tablet , 200 mg)	( )	( )	3.14 ( )
3.15 Aspent <sup>®</sup> (aspirin tablet , 300 mg)	( )	( )	3.15 ( )
3.16 Dulcolax (bisacodyl tablet , 5 mg)	( )	( )	3.16 ( )
3.17 Hydergine FAS <sup>®</sup> (codergocrine tablet , 4.5 mg)	( )	( )	3.17 ( )
3.18 Voltaren (diclofenac tablet , 25 mg)	( )	( )	3.18 ( )
3.19 Erythromycin tablet , 250 mg	( )	( )	3.19 ( )
3.20 Premarin <sup>®</sup> (conjugated estrogen tablet )	( )	( )	3.20 ( )
3.21 Losec <sup>®</sup> (omeprazole capsule , 20 mg)	( )	( )	3.21 ( )
3.22 Depakine <sup>®</sup> (sodium valproate tablet , 200 mg)	( )	( )	3.22 ( )
3.23 Isordil (สำหรับอมใต้ลิ้น) (isosorbide dinitrate tablet , 5 mg)	( )	( )	3.23 ( )
3.24 Dilantin <sup>®</sup> (phenytoin capsule , 100 mg)	( )	( )	3.24 ( )
3.25 Metamucil powder (psyllium)	( )	( )	3.25 ( )
3.26 Kayexalate <sup>®</sup> (sodium polystyrene sulfonate)	( )	( )	3.26 ( )
3.27 Alum milk <sup>®</sup> (aluminium – containing antacid)	( )	( )	3.27 ( )

## เฉลยภาคผนวก ข

## ตอนที่ 2

2.1	ตอบ ตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป	ได้	1	คะแนน
2.2	ตอบ ปฏิบัติ	ได้	1	คะแนน
2.3	ตอบ มากกว่าหรือเท่ากับ 15 มิลลิลิตร	ได้	1	คะแนน
2.4	ตอบ มากกว่าหรือเท่ากับ 15 นาที	ได้	1	คะแนน
2.5	ตอบ ปฏิบัติ	ได้	1	คะแนน
2.6	ตอบ มากกว่าหรือเท่ากับ 15 มิลลิลิตร	ได้	1	คะแนน
2.7	ตอบ ปฏิบัติ	ได้	1	คะแนน
2.8	ตอบ มากกว่าหรือเท่ากับ 3 มิลลิลิตร	ได้	1	คะแนน
2.9	ตอบ ปฏิบัติ	ได้	1	คะแนน
2.10	ตอบ มากกว่าหรือเท่ากับ 3 มิลลิลิตร	ได้	1	คะแนน
2.11	ตอบ บดให้ละเอียดในโถรงบดยาแล้วผสมน้ำ	ได้	1	คะแนน
2.12	ตอบ เปิดฝาแคปซูลแล้วเทผงยาข้างในออกมาผสมน้ำทิ้งเปลือกแคปซูลไป	ได้	1	คะแนน
2.13	ตอบ ใช้เข็มเจาะแล้วบีบของเหลวออกมา หรือใช้ Syring ดูดออกมา	ได้	1	คะแนน
2.14	ตอบ ไม่ได้ปฏิบัติ	ได้	1	คะแนน

## ตอนที่ 3

## ข้อ 3.1 - 3.27

ตอบ ใช่	ได้	0	คะแนน
ตอบ ไม่ใช่	ได้	1	คะแนน