

ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ *Xanthomonas axonopodis* pv. *dieffenbachiae* สาเหตุโรคใบไหม้ของหน้าวัว

ผู้เขียน นางสาวพนิดา แก้วมณี

สาขาวิชา โรคพืชวิทยา

ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งเฉพาะ และการผลิตแอนติซีรัมเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ *Xanthomonas axonopodis* pv. *dieffenbachiae* สาเหตุโรคใบไหม้ของหน้าวัว

สำรวจและเก็บตัวอย่างโรคใบไหม้ของหน้าวัวทางภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างเดือนธันวาคม 2544 - สิงหาคม 2545 จำนวน 90 ตัวอย่างแยกได้เชื้อแบคทีเรียจาก 54 ตัวอย่าง ได้เชื้อบริสุทธิ์จำนวน 120 สายพันธุ์ เมื่อทำการทดสอบความสามารถในการทำให้เกิดโรคกับหน้าวัวสายพันธุ์ Tropical โดยการฉีดพ่นที่ใบพบว่าทุกสายพันธุ์ทำให้เกิดโรคได้ จากการจำแนกชนิดของเชื้อพบว่าเชื้อทุกสายพันธุ์ คือ *Xanthomonas axonopodis* pv. *dieffenbachiae* (Xad) (McCulloch and Pirone) Vauterin et al., 1995

Semi-selective media for Xad (SXE) เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งเฉพาะเพื่อใช้ตรวจแยกเชื้อ *X. axonopodis* pv. *dieffenbachiae* ซึ่งพัฒนามาจากอาหาร SX (semi-selective media for *Xanthomonas*) โดยใช้ esculin เป็นแหล่งคาร์บอนแทนแป้ง ลักษณะโคโลนีบนอาหารนี้กลม ผิวหน้านูน ขอบเรียบ สีตรงกลางโคโลนีมีสีม่วง สีของอาหารรอบ ๆ โคโลนีเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล หลังจากบ่มเลี้ยงไว้ 3 วัน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเชื้อในอาหารชนิดนี้ การตรวจแยกเชื้อ Xad จากใบหน้าวัวที่ฉีดพ่นด้วยแบคทีเรียที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่าสามารถตรวจพบเชื้อบนใบหน้าวัวได้ต่ำสุดที่ 10^3 cfu/มิลลิลิตร เมื่อนำมาตรวจแยกเชื้อ Xad จากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ใบหน้าวัวและใบบอนสีที่แสดงอาการโรคใบไหม้ วัสดุปลูก และน้ำจากแปลงปลูก พบว่าสามารถตรวจแยกเชื้อ Xad ได้

การผลิตแอนติซีรัมจากกระต่ายที่ฉีดด้วยชิ้นส่วนเซลล์ของเชื้อ Xad ซึ่งได้จากการปั่นแยกชิ้นส่วนด้วยคลื่นเสียง (sonicated cell) แอนติซีรัมที่ได้มีระดับไตเตอร์สูงถึง 1:2560 เมื่อนำแอนติซีรัมมาตรวจสอบความจำเพาะเจาะจงโดยการทำปฏิกิริยา agglutination กับเชื้อแบคทีเรียสกุลอื่น ๆ พบว่า เชื้อ *Erwinia* sp. 1 สายพันธุ์ *Bacillus* sp. 2 สายพันธุ์ *Pantoea* sp. 2 สายพันธุ์ และ *Escherichia coli* 1 สายพันธุ์ ไม่เกิดปฏิกิริยา เชื้อ *Pseudomonas fluorescens* 3 สายพันธุ์ เชื้อ *Ralstonia solanacearum* 5 สายพันธุ์ *X. axonopodis* pv. *citri* 3 สายพันธุ์ และ *X. oryzae* pv. *oryzae* 2 สายพันธุ์ พบว่าเกิดปฏิกิริยาที่ระดับไตเตอร์ 1:40, 1:80, 1:80 และ 1:80 ตามลำดับ

จากการทดสอบความจำเพาะเจาะจงของแอนติบอดีด้วยวิธี indirect immunofluorescent staining (IF) โดยทดสอบกับเชื้อ Xad และแบคทีเรียสาเหตุโรคพิษอื่น ๆ พบว่าเชื้อ Xad ทุกสายพันธุ์ เกิดการเรืองแสงมากทั้งหมด ส่วนเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพิษอื่น ๆ มีการเรืองแสงน้อยหรือไม่มีการเรืองแสงเลย เมื่อนำแอนติซีรัมมาตรวจหาเชื้อ Xad บนใบหน้าวัวที่ฉีดพ่นด้วยเชื้อ Xad ด้วยวิธี IF สามารถตรวจหาเชื้อ Xad ในปริมาณเชื้อต่ำสุด 10^3 cfu/มิลลิลิตร

sp., one strain of *Escherichia coli*, three strains of *Pseudomonas fluorescens*, five strains of *Ralstonia solanacearum*, three strains of *X. axonopodis* pv. *citri* and two strains of *X. oryzae* pv. *oryzae*. The antiserum showed a slight cross-reaction with *P. fluorescens*, *R. solanacearum*, *X. axonopodis* pv. *citri* and *X. oryzae* pv. *oryzae* at titers 1:40, 1:80, 1:80 and 1:80 respectively.

The specificity of the antiserum was also confirmed by testing with Xad and other plant disease-causing bacteria using indirect immunofluorescent staining (IF). It was found that every strain of Xad showed strongly positive result. Other plant disease-causing bacteria showed low immunofluorescence or none at all. The minimal dose of Xad which can be diagnosed from anthurium leaves was conducted by spraying the leaves with different concentrations of bacterial suspension. It was found that the lowest concentration of Xad that was recoverable from the anthurium leaves was 10^3 cfu/ml.