

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมผสมน้ำสับปะรัดพาสเจอร์ไรส์ที่มีการย่อยโปรตีนบางส่วน Development of Pasteurized Pineapple Juice Mixed Milk Product Having Partial Proteolysis

ภากร ปราชญากิจ Pakorn Prachyakit

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Master of Science Thesis in Food Technology

Prince of Songkla University

Λ ₁	
тачну ТР5b2.5. +5b 2162 2019	2.1
Bib Key DANGALO	
/ 2 3 N.A. 2547	

ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมผสมน้ำสับปะรดพาสเจอร์ไรส์ที่มีการย่อย

โปรตีนบางส่วน

ผู้เขียน

นายภากร ปราชญากิจ

สาขาวิชา

เทคโนโลยีอาหาร

ปีการศึกษา

2546

บทคัดย่อ

จากผลการศึกษาสภาวะการผลิตนมผสมน้ำสับปะรดพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านการ ย่อยโปรตีนบางส่วน (Pasteurized Pineapple Juice Mixed Milk Product Having Partial Proteolysis; PMPP) ที่เหมาะสมโดยพิจารณาผลของความเข้มข้นของโบรมิเลน ในน้ำสับปะรดและเวลาในการดำเนินกิจกรรมการย่อยโปรตีนของเอนไซม์ ต่อระดับการ ย่อยโปรตีนในนมและระดับรสขม พบว่าน้ำสับปะรดที่มีโบรมิเลน 0.25 ยูนิต/มก.โปรตีน ผสมกับนมดิบและส่วนผสมอื่นๆ ที่ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที เป็นสภาวะที่ เหมาะสม จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า คะแนนความยอมรับรวม ไม่แตกต่างจากPMPPที่ไม่ผ่านการย่อยด้วยโบรมิเลน(p>0.05)เมื่อศึกษารูปแบบโปรตีน ด้วยอิเลกโทรโฟรรีซีสและตรวจสอบปริมาณโปรตีนที่ลดลง ด้วยเครื่องวัดความทึบแสง พบว่าปริมาณเคชีนลดลงร้อยละ 24 และจากการศึกษาผลของปริมาณน้ำสับปะรด ร้อยละ 22 ได้รับคะแนนความชอบสูงสุด นอกจากนี้ยังพบว่า PMPP ที่ผสมด้วยเพกติน ไม่ทำให้เกิดการแยกชั้นตลอดอายุการเก็บรักษา จากผลการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ ทั้งหมด พบว่าPMPP สามารถเก็บรักษาที่ 4 องศาเซลเซียส ได้ถึง 20 วัน เมื่อทำการ ทดสอบผู้บริโภคพบว่าผู้บริโภคร้อยละ 100 ให้การยอมรับ PMPP

Thesis Title

Development of Pasteurized Pineapple Juice Mixed Milk

Product Having Partial Proteolysis

Author

Mr. Pakorn Prachyakit

Major Program

Food Technology

Academic Year

2003

Abstract

Technical preparation of Pasteurized pineapple juice mixed milk product having partial proteolysis (PMPP) was studied. The effect of pineapple juice with different concentration of complex bromelain and the reaction time on degree of hydrolysis and the level of bitter taste were used to optimize the process. The optimum condition to incubate a mixture of active bromelain pineapple juice as 0.25 Pu/mg protein, raw milk and other component at 35 °C for 5 min was achieved. Organoleptic evaluation pointed out that overall acceptability of the PMPP was not different from control. Casein was partially hydrolyzed approximately 24% as evaluated by SDS-PAGE followed by densitometric analysis. Flavor and odor of PMPP influenced on the acceptability the result indicated that PMPP containing 22% pineapple juice thad highest score for overall acceptability. In addition, PMPP contained pectin, no precipitation of PMPP was observed throughout the storage at 4 °C. Microbiological analysis showed PMPP could be storage at 4 °C for 20 days. The consumer's attitude show 100% accepted the PMPP.