

## ภาคผนวก ง

## ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตาราง 20 จำนวน และร้อยละของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จำแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	จำนวน	ร้อยละ
1. ลักษณะข้อใด <u>ไม่ถูกต้อง</u> สำหรับโรคเอดส์	228	52.8
2. การกระทำข้อใดที่จะติดเชื้อเอดส์ได้	389	90.0
3. พฤติกรรมข้อใดที่ไม่ทำให้ติดเชื้อเอดส์	237	50.9
4. ผู้ติดเชื้อเอดส์ในข้อใด ที่แพร่เชื้อเอดส์ไปยังบุคคลอื่นได้	265	61.3
5. จะตรวจว่ามีเชื้อเอดส์ในร่างกายได้อย่างไร	435	98.4
6. การรักษาโรคเอดส์ในปัจจุบันได้ผลเป็นอย่างไร	369	85.4
7. การป้องกันโรคเอดส์สามารถทำได้อย่างไร	412	95.6
8. ข้อความใดต่อไปนี <u>ถูกต้อง</u> เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์	359	83.1
9. ข้อความใดต่อไปนี <u>ถูกต้อง</u> สำหรับการใช้ถุงยางอนามัย	272	63.0
10. ข้อความใดต่อไปนี <u>ไม่ถูกต้อง</u> สำหรับการใช้ถุงยางอนามัย	287	66.4
11. ข้อความใดต่อไปนี <u>ถูกต้อง</u> เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอดส์	337	78.0
12. การป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อเอดส์แพร่ไปสู่ผู้อื่น ควรให้คำแนะนำอย่างไรแก่ผู้ติดเชื้อ	189	43.8

ตาราง 21 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงมาตรฐานของการรับรู้โอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์  
ของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

การรับรู้โอกาสเสี่ยง	ค่าเฉลี่ย	S.D.	การรับรู้
<b>สรุปการรับรู้โอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์</b>	<b>2.60</b>	<b>0.28</b>	<b>ระดับดี</b>
1. ผู้ชายแข็งแรงเมื่อเที่ยวหญิงบริการไม่น่าจะติดเชื้อไวรัสเอดส์	2.78	0.51	ระดับดี
2. ผู้หญิงที่ติดเชื้อไม่น่าถ่ายถอดไปยังทารกที่อยู่ในครรภ์	2.44	0.79	ปานกลาง
3. เที่ยวหญิงบริการราคาแพง ไม่น่ามีโอกาสติดเชื้อไวรัสเอดส์	2.76	0.54	ระดับดี
4. การสัมผัสเลือดหรือบาดแผลของผู้ติดเชื้อในขณะที่ตนเอง มีแผลที่มีโอกาสติดเชื้อเอดส์	2.74	0.53	ระดับดี
5. การเปลี่ยนถุงนอนบ่อยๆ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อไวรัสเอดส์ได้มากขึ้น	2.78	0.52	ระดับดี
6. การดื่มสุรา จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ต่อการติดเชื้อไวรัสเอดส์	2.50	0.64	ระดับดี
7. การใช้ยาเสพติด จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ ปลอดภัยต่อการติดเชื้อไวรัสเอดส์	2.61	0.61	ระดับดี
8. ถึงแม้มีการทำความสะอาด สะอาดอวัยวะเพศทันทีหลังการมีเพศสัมพันธ์มี โอกาสติดเชื้อไวรัสเอดส์	2.55	0.61	ระดับดี
9. หญิงขายบริการเท่านั้นที่มีโอกาสเป็นเอดส์	2.54	0.70	ระดับดี
10. แม้ว่าจะใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ก็มีโอกาสดูด เชื้อเอดส์ได้ ถ้าถุงยางอนามัยรั่วหรือแตก	2.77	0.49	ระดับดี
11. กรณีมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากการร่วมเพศ ก็มีโอกาสเสี่ยง ต่อการติดเชื้อไวรัสเอดส์	2.41	0.56	ปานกลาง
12. จะติดเชื้อไวรัสเอดส์กรณีใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์	2.37	0.65	ปานกลาง

ตาราง 22 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงมาตรฐานของการรับรู้ความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสเอดส์ ของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

การรับรู้ความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสเอดส์	ค่าเฉลี่ย	S.D.	การรับรู้
<b>สรุปการรับรู้ความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสเอดส์</b>	<b>2.50</b>	<b>0.25</b>	<b>ระดับดี</b>
1. เมื่อติดเชื้อไวรัสเอดส์ ท่านจะไม่มาเรียนหนังสือ	1.99	0.80	ปานกลาง
2. โรคเอดส์เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	2.54	0.65	ระดับดี
3. ถ้าไม่มีการป้องกันโรคเอดส์จะมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมาก	2.70	0.57	ระดับดี
4. โรคเอดส์สามารถแพร่เชื้อได้ ก่อนปรากฏอาการ	2.67	0.51	ระดับดี
5. โรคเอดส์มีผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน	2.72	0.55	ระดับดี
6. ผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์ ต้องตายในระยะอันสั้นทุกคน	2.13	0.74	ปานกลาง
7. ผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์ เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ จะมีอาการรุนแรง และรักษาได้ยากกว่าผู้ไม่ติดเชื้อไวรัสเอดส์	2.56	0.61	ระดับดี
8. ผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์ จะมีความทรมาณทั้งร่างกายและจิตใจ	2.77	0.48	ระดับดี
9. การติดเชื้อไวรัสเอดส์ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ	2.81	0.45	ระดับดี
10. ถ้ามีการติดเชื้อไวรัสเอดส์จะทำให้เป็นมะเร็งได้ง่าย	2.24	0.62	ปานกลาง
11. ผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์ จะเป็นครอบครัวที่ถูกรังเกียจจากสังคม	2.34	0.76	ปานกลาง
12. คนที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเกิดเจ็บป่วย	2.47	0.62	ปานกลาง

ตาราง 23 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการป้องกันโรคเอดส์ ของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการป้องกันโรคเอดส์	ค่าเฉลี่ย	S.D.	การรับรู้
<b>การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการป้องกันโรคเอดส์</b>	<b>2.45</b>	<b>0.29</b>	<b>ปานกลาง</b>
1. โรคเอดส์ติดต่อได้ยาก ถ้ามีการป้องกันที่ถูกต้อง	2.75	0.52	ระดับดี
2. ผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์ ถ้าดูแลร่างกายตัวเองได้ถูกต้อง มีชีวิตยืนยาวได้	2.73	0.52	ระดับดี
3. บุคคลที่ได้รับเชื้อไวรัสเอดส์ ถ้าสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสสามารถป้องกันการติดเชื้อไปยังคู่สมรสได้	2.35	0.61	ระดับดี
4. การระบายความรู้สึกทางเพศมีหลายวิธีไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์	2.62	0.56	ระดับดี
5. การป้องกันโรคเอดส์ทำได้ง่ายกว่าการรักษา	2.70	0.58	ระดับดี
6. การใช้ถุงยางอนามัย สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอดส์เมื่อมีเพศสัมพันธ์	2.60	0.55	ระดับดี
7. ฉันจะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่เมาเหล้า	2.56	0.60	ระดับดี
8. เพื่อนจะสบประมาท หากรู้ว่ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	2.17	0.81	ปานกลาง
9. เพื่อนจะสบประมาท หากรู้ว่ามีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย	2.26	0.78	ปานกลาง
10. ฉันรู้สึกอาย หากจะพกถุงยางอนามัยติดตัว แม้ไม่มีใครรู้ก็ตาม	2.13	0.83	ปานกลาง
11. ฉันรู้สึกอายที่จะไปซื้อจากร้าน หรือขอถุงยางอนามัยที่หน่วยงานสาธารณสุข	2.00	0.89	ปานกลาง
12. กรณีฉันจะมีเพศสัมพันธ์ ฉันมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย แม้จะถูกหยอกล้อเพื่อนก็ตาม	2.52	0.60	ระดับดี