



ผลของวิธีการต่อนไก่ต่อผลกระทบทางชาก ส่วนประกอบของชาก
และสารเคมีติดค้างในชากไก่ต่อน

Effects of Caponization Procedures on Capon Conformation, Body Composition
and Chemical Residue in Capon Carcass

พัชรี รัตนรงค์

Phatcharee Rattanarong

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Master of Science Thesis in Animal Science

Prince of Songkla University

2547

เลขที่ง...	SF 149 1-73 3044 ๑๖
Bib Key...	244396
25 ม.ค. 2547	

(1)

ชื่อวิทยานิพนธ์	ผลของวิธีการตอนไก่ต่อลักษณะชา gek ส่วนประกอบของชา gek และสารเคมีตอกค้างในชา gekไก่ตอน
ผู้เขียน	นางสาวพัชรี รัตนรงค์
สาขาวิชา	สัตวศาสตร์
ปีการศึกษา	2546

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของวิธีการตอนไก่ต่อลักษณะชา gek ส่วนประกอบของชา gek และสารเคมีตอกค้างในชา gekไก่ตอนประกอบด้วย 2 การทดลอง คือ

การทดลองที่ 1 : ผลของการตอนไก่แบบฝังยอดโนนและแบบผ่าตัดต่อคุณภาพชา gek ไก่ต่อไก่รุ่นลูกของไก่สายพันธุ์ Hubbard Golden Comet อายุ 10 สปดาห์ เพศผู้ จำนวน 72 ตัว แบ่งไก่ทดลองเป็น 3 กลุ่ม (treatment) ประกอบด้วย กลุ่มควบคุม กลุ่มตอนแบบฝังยอดโนน และ กลุ่มตอนแบบผ่าตัด และไก่เพศเมียจัดเป็นทริมเมนต์อิสระ จากผลการทดลองพบว่า ระยะเวลาการทดลอง 10 สปดาห์ ไก่กลุ่มที่ตอนแบบฝังยอดโนน สามารถเพิ่มน้ำหนักตัวได้มากกว่าไก่กลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($P<0.01$) ขณะที่ในช่วงสปดาห์แรกของการทดลอง ไก่กลุ่มที่ตอนแบบผ่าตัดมีน้ำหนักตัวเพิ่มน้อยกว่าไก่กลุ่มควบคุม (133.75 และ 141.25 กรัม ตามลำดับ, $P>0.05$) แต่ เมื่อเข้าสู่สปดาห์ที่ 2 จนสิ้นสุดการทดลอง ไก่ตอนแบบผ่าตัดสามารถเพิ่มน้ำหนักตัวได้มากกว่าไก่กลุ่มควบคุมแต่ไม่แตกต่างทางสถิติ ($P>0.05$) สรุนไก่เพศเมียเพิ่มน้ำหนักตัวต่ำกว่าไก่เพศผู้ทั้งสาม กลุ่มตลอดระยะเวลาทำการทดลอง

ปริมาณอาหารที่กิน ไก่ตอนแบบฝังยอดโนนกินอาหารมากกว่าไก่กลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($P<0.01$) ตลอดการทดลอง ในช่วง 0-2 สปดาห์ ไก่กลุ่มที่ตอนแบบผ่าตัดกินอาหารได้น้อยกว่า ไก่กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($P<0.01$) แต่หลังสปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไป ไก่กลุ่มที่ตอนแบบผ่าตัดจะได้รับมากกว่าไก่กลุ่มควบคุมกินอาหารไม่แตกต่างกัน ($P>0.05$) ในด้านอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว ตั้งแต่สปดาห์ที่ 2 จนสิ้นสุดการทดลอง ไก่กลุ่มที่ตอนแบบผ่าตัดมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวต่ำที่สุด รองลงมาคือไก่กลุ่มควบคุมและไก่กลุ่มที่ตอนแบบฝังยอดโนน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตั้นทุนค่าอาหาร พบร่วาตั้นทุนค่าอาหารในการเพิ่มน้ำหนักตัวไก่ 1 กิโลกรัมของไก่กลุ่มที่ตอนแบบผ่าตัดต่ำที่สุด รองลงมาคือไก่กลุ่มควบคุมและไก่ตอนแบบฝังยอดโนน ตามลำดับ ส่วนไก่เพศเมีย มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวต่ำอยู่ที่สุดและมีตั้นทุนค่าอาหารสูงที่สุด

ผลของวิธีการต่อนต่อลักษณะของไก่กลุ่มที่ต่อนแบบผึ้งยอร์โนน มีลักษณะคุณภาพซากตรงตามความต้องการของตลาดไก่ต่อน คือ มีความอ้วน สะสมไข้มันในขาสูง มีรูปทรงคล้ายไก่เพศเมีย แต่มีขนาดใหญ่กว่าไก่เพศเมีย สรุวไก่กลุ่มที่ต่อนแบบผ้าตัด แม้ในช่วงแรกลักษณะคุณภาพซากไม่ดีเท่าไก่กลุ่มที่ต่อนแบบผึ้งยอร์โนน แต่มีอัลลัยไปทางขึ้นก็จะมีความอ้วนและการสะสมไข้มันในขาตื้น มีลักษณะคุณภาพซากที่ดีตรงตามความต้องการของตลาดไก่ต่อน สรุวไก่เพศเมียแม้จะมีตัวขนาดเล็ก แต่มีลักษณะรูปร่างที่อ้วนและมีการสะสมไข้มันในขาสูง ตรงตามความต้องการของตลาดไก่ต่อน เช่นกัน

การทดลองที่ 2 : การสกัดและวิเคราะห์เยกเอสตรอลด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดยใช้ไดเอทอฮิลสติลเบสต์รอลเป็น internal standard และนำวิธีการไปประยุกต์ใช้ตรวจหาสารตกค้างในเนื้อยื่อกล้ามเนื้อและตับของไก่หลังการต่อนด้วยวิธีผึ้งยอร์โนนได้ หนังศีรษะ พบว่าเพสเคลื่อนที่ (mobile phase) ที่เหมาะสมในการแยกสารประกอบทั้งสองด้วย คอลัมน์ Nova Pak C₁₈ ขนาด 3.9 x 150 มิลลิเมตร โดยไม่มีผลกระทบจากสารสอดแทรก (interferences) คือ 37% อะซีโตในไทรลสิน้ำ และรัตค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 225 นาโนเมตร ผลการทดลองประสิทธิภาพวิธีการตรวจหาสารตกค้างจากเนื้อยื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถสกัดเยกเอสตรอลออกมา (percent recovery) ร้อยละ 93.30 ค่า CV เท่ากับ 3.96

หลังการผึ้งยอร์โนนซึ่งมีส่วนประกอบของ เยกเอสตรอล 19.64±3.70 มิลลิกรัมต่อเม็ด ($n = 7$) พบว่าปริมาณเยกเอสตรอลที่ไม่ถูกดูดซึมและยังคงเหลือในบริเวณที่ผึ้งเป็นเวลา 6 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์ คือ 10.88±1.64 และ 1.11±0.27 มิลลิกรัม ($n = 4$) ตามลำดับ หรือปริมาณที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย 8.76 และ 18.76 มิลลิกรัม (44.60 และ 94.35 เปอร์เซ็นต์) ตามลำดับ ผลการตรวจวิเคราะห์ซึ่งให้เห็นว่าเยกเอสตรอลที่ตกค้างในกล้ามเนื้อและตับไก่หลังการต่อนที่ระยะเวลาดังกล่าวมีระดับต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้ในการทดลองนี้ (62.5 นาโนกรัมต่อกรัมน้ำหนักเปียกของตัวอย่าง)

Thesis Title Effects of Caponization Procedures on Capon Conformation,
 Body Composition and Chemical Residue in Capon Carcass

Author Miss Phatcharee Rattanarong

Major Program Animal Science

Academic Year 2003

Abstract

Two experiments were conducted to compare the effect of caponization procedures on capon conformation, body composition and chemical residue in capon carcass.

From the experiment 1, the effect of hormonal and surgical caponization on carcass conformation of capon were studied. Ten weeks old Hubbard Golden Comet cockerels were used in 3 treatments (control, hormonal implantation and surgical castration) experiment and pullets used with free treatment. The result showed that body weight gain, feed intake and carcass conformation of hormonal implantation capon were significantly greater than the surgical castration capon and the control group ($p<0.01$). During 0-2 weeks of experiment, the control group showed higher body weight gain and feed intake than the surgical castration capon. However, after 2 week until the end of experiment surgical castration capon tend to be gaining weight better than the control group. Surgical castration capon had the best of feed conversion ratio followed by the control group . Feed costs for the surgical castration capon were lower than the control group and hormonal implantation capon, respectively. Hormonal implantation group has the best carcass conformation while the surgical castration group revealed a moderate conformation. Nevertheless, both groups showed better conformation than the control group. Pullet group had lower body weight gain when compared to other groups but its carcass conformation was acceptable.

From the experiment 2, a method for determination of hexestrol by high performance liquid chromatography (HPLC) using diethylstilbestrol as internal standard was investigated. This procedure was used to detect the residues in muscle and liver of

hormonal caponization. Thirty seven percent acetonitrile in water was designed as the suitable mobile phase for the two compounds separated by 3.9 x 150 ml. Nova Pak C₁₈ column for which no interferences appeared in chromatogram. An absorbance at 225 nm was used for detection. The results of the analysis show that the percent of recovery and CV was 93.30 and 3.96, respectively.

The residues after 19.64 \pm 3.70 mg hexestrol implanted were measured. Data showed that the levels of residues in the site after implantation of 6 and 8 weeks were 10.88 \pm 1.64 and 1.11 \pm 0.27 mg. (n = 4), respectively. This indicated that the amount of hexestrol 8.76 and 18.76 mg were absorbed (44.60 and 94.35%), respectively. However, It is suggested that hexestrol residues detected in muscle and liver were less than 62.5 ng/g wet weight of tissue at these implanting periods.