

ตารางภาคผนวกที่ 4 เปรียบเทียบไก่เทศเมียและไก่เทศผู้ไม่ตอน ด้านลักษณะของคุณภาพซากในไก่ที่อายุการตอน 4, 6, 8 และ 10 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ย)

หลังตอน (สัปดาห์)	ทรีทเมนต์	ลักษณะคุณภาพซาก							
		นน. เริ่มต้น (กรัม)	นน. ก่อนฆ่า (กรัม)	นน. ซากถอนขน (กรัม)	% (1)	นน. ซากกินได้ (กรัม)	% (2)	นน. ไขมันหน้าท้อง (กรัม)	% (3)
4	เทศเมีย	1154.58 ^b	1487.50 ^b	1312.25 ^b	113.66	911.03 ^b	78.91	22.80	1.54
	ไม่ตอน	1226.25 ^a	1761.50 ^a	1530.25 ^a	124.79	1056.25 ^a	86.14	19.32	1.00
	นัยสำคัญ	0.0000	0.0088	0.0241	0.1134	0.0420	0.1706	0.5243	0.2300
6	เทศเมีย	1154.58 ^b	1765.00 ^b	1524.35 ^b	132.02 ^b	1025.83 ^b	88.85 ^b	29.43 ^a	1.66
	ไม่ตอน	1226.25 ^a	2087.50 ^a	1783.25 ^a	145.42 ^a	1266.20 ^a	103.26 ^a	15.53 ^b	0.73
	นัยสำคัญ	0.0000	0.0030	0.0018	0.0172	0.0016	0.0084	0.0030	0.0300
8	เทศเมีย	1154.58 ^b	1845.00 ^b	1590.00 ^b	137.71 ^b	1033.23 ^b	89.49 ^b	55.12 ^a	2.99
	ไม่ตอน	1226.25 ^a	2307.50 ^a	1966.25 ^a	160.35 ^a	1405.25 ^a	114.60 ^a	36.82 ^b	1.60
	นัยสำคัญ	0.0000	0.0045	0.0073	0.0281	0.0029	0.0076	0.0014	0.0000
10	เทศเมีย	1154.58 ^b	1767.00 ^b	1536.31 ^b	133.06 ^b	1037.50 ^b	89.86 ^b	46.45 ^a	2.62
	ไม่ตอน	1226.25 ^a	2310.00 ^a	1988.76 ^a	162.18 ^a	1461.12 ^a	119.15 ^a	23.18 ^b	1.00
	นัยสำคัญ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0003	0.0000

หมายเหตุ ตัวอักษรในสคริปต์เดียวกันในอายุที่เท่ากันต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

% (1) = เปอร์เซนต์น้ำหนักหลังถอนขนต่อน้ำหนักตัวเริ่มต้น

% (2) = เปอร์เซนต์น้ำหนักซากกินได้ต่อน้ำหนักตัวเริ่มต้น

นัยสำคัญ

% (3) = เปอร์เซนต์น้ำหนักไขมันหน้าท้องต่อน้ำหนักตัวก่อนฆ่า

% (4) = เปอร์เซนต์น้ำหนักตับต่อน้ำหนักตัวก่อนฆ่า

ตารางภาคผนวกที่ 5 เปรียบเทียบไก่เทศเมียและไก่เทศผู้ตอนแบบฟิงฮอร์โมน ด้านลักษณะของคุณภาพซากในไก่ที่อายุการตอน 4, 6, 8 และ 10 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ย)

หลังตอน (สัปดาห์)	ทรีทเมนต์	ลักษณะคุณภาพซาก							
		นน. เริ่มต้น (กรัม)	นน. ก่อนฆ่า (กรัม)	นน. ซากถอนขน (กรัม)	% (1)	นน. ซากกินได้ (กรัม)	% (2)	นน. ไขมันหน้าท้อง (กรัม)	% (3)
4	เทศเมีย	1154.58 ^b	1487.50 ^b	1312.25 ^b	113.66	911.03 ^b	78.91	22.80	1.54
	ตอนแบบฟิงฮอร์โมน	1227.50 ^a	1782.50 ^a	1571.75 ^a	128.05	1074.15 ^a	87.51	33.85	1.80
	นัยสำคัญ	0.0000	0.0082	0.0207	0.0805	0.0370	0.1374	0.1404	0.3900
6	เทศเมีย	1154.58 ^b	1765.00 ^b	1524.35 ^b	132.02 ^b	1025.83 ^b	88.85 ^b	29.43 ^b	1.66
	ตอนแบบฟิงฮอร์โมน	1227.50 ^a	2137.50 ^a	1884.13 ^a	153.49 ^a	1357.65 ^a	110.60 ^a	69.63 ^a	3.20
	นัยสำคัญ	0.0000	0.0091	0.0086	0.0318	0.0038	0.0108	0.0297	0.0500
8	เทศเมีย	1154.58 ^b	1845.00 ^b	1590.00 ^b	137.71 ^b	1033.23 ^b	89.49 ^b	55.12 ^b	2.99

	ตอนแบบฝังฮอร์โมน	1227.50 ^a	2390.00 ^a	2129.75 ^a	173.50 ^a	1475.58 ^a	120.21 ^a	101.92 ^a	4.26
	นัยสำคัญ	0.0000	0.0009	0.0008	0.0025	0.0003	0.0008	0.0008	0.0000
10	เพศเมีย	1154.58 ^b	1767.00 ^b	1536.31 ^b	133.06 ^b	1037.50 ^b	89.86 ^b	46.45 ^b	2.62
	ตอนแบบฝังฮอร์โมน	1227.50 ^a	2585.00 ^a	2298.77 ^a	187.27 ^a	1666.61 ^a	135.77 ^a	122.28 ^a	4.72
	นัยสำคัญ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ ตัวอักษรในสดมภ์เดียวกันในอายุที่เท่ากันต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

% (1) = เปอร์เซนต์น้ำหนักหลังถอนขนต่อน้ำหนักตัวเริ่มต้น

% (2) = เปอร์เซนต์น้ำ

หนักซากกินได้ต่อน้ำหนักตัวเริ่มต้น

% (3) = เปอร์เซนต์น้ำหนักไขมันหน้าท้องต่อน้ำหนักตัวก่อนฆ่า

% (4) = เปอร์เซนต์น้ำ

หนักต่อน้ำหนักตัวก่อนฆ่า

ตารางภาคผนวกที่ 6 เปรียบเทียบไก่เพศเมียและไก่เพศผู้ตอนแบบผ่าตัด ด้านลักษณะของคุณภาพซากในไก่ที่อายุการตอน 4, 6, 8 และ 10 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ย)

หลังตอน (สัปดาห์)	ทรีทเมนต์	ลักษณะคุณภาพซาก							
		นน. เริ่มต้น (กรัม)	นน. ก่อนฆ่า (กรัม)	นน. ซากถอนขน (กรัม)	% (1)	นน. ซากกินได้ (กรัม)	% (2)	นน. ไขมันหน้าท้อง (กรัม)	% (4)
4	เพศเมีย	1154.58 ^b	1487.50 ^b	1312.25 ^b	113.66	911.03	78.91	22.80	1.54
	ตอนแบบผ่าตัด	1233.33 ^a	1675.00 ^a	1431.00 ^a	116.03	975.88	79.12	16.32	0.91
	นัยสำคัญ	0.0000	0.0034	0.0359	0.5466	0.0817	0.9369	0.2440	0.1717
6	เพศเมีย	1154.58 ^b	1765.00	1524.35	132.02	1025.83	88.85	29.43 ^a	1.66
	ตอนแบบผ่าตัด	1233.33 ^a	1950.00	1628.08	132.00	1148.88	93.15	11.00 ^b	0.59
	นัยสำคัญ	0.0000	0.0827	0.1797	0.9973	0.0935	0.4314	0.0197	0.0111
8	เพศเมีย	1154.58 ^b	1845.00 ^b	1590.00 ^b	137.71 ^b	1033.23 ^b	89.49 ^b	55.12 ^a	2.99
	ตอนแบบผ่าตัด	1233.33 ^a	2267.50 ^a	1905.75 ^a	154.52 ^a	1350.35 ^a	109.49 ^a	18.58 ^b	0.82
	นัยสำคัญ	0.0000	0.0009	0.0070	0.0428	0.0012	0.0049	0.0010	0.0000
10	เพศเมีย	1154.58 ^b	1767.00 ^b	1536.31 ^b	133.06 ^b	1037.50 ^b	89.86 ^b	46.45 ^a	2.62
	ตอนแบบผ่าตัด	1233.33 ^a	2190.00 ^a	1843.14 ^a	149.45 ^a	1366.70 ^a	110.81 ^a	28.77 ^b	1.32
	นัยสำคัญ	0.0000	0.0002	0.0004	0.0067	0.0000	0.0001	0.0302	0.0000

หมายเหตุ ตัวอักษรในสดมภ์เดียวกันในอายุที่เท่ากันต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

% (1) = เปอร์เซนต์น้ำหนักหลังถอนขนต่อน้ำหนักตัวเริ่มต้น

% (2) = เปอร์เซนต์น้ำหนักซากกินได้ต่อน้ำหนักตัวเริ่มต้น

% (3) = เปอร์เซนต์น้ำหนักไขมันหน้าท้องต่อน้ำหนักตัวก่อนฆ่า

% (4) = เปอร์เซนต์น้ำหนักต่อน้ำหนักตัวก่อนฆ่า