



หญ้าตีนกา

ชื่อสามัญไทย หญ้าตีนกา เยอคุม หญ้าปากคอก

ชื่อสามัญอังกฤษ Goosegrass, Wire grass

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Eleusine indica* (L.) Gaertn.

วงศ์ Gramineae

ลักษณะสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

หญ้าตีนกาเป็นพืชล้มลุก และมีการแตกกอมาก ทรงพุ่มสูง 20-60 เซนติเมตร ลำต้นสีเขียวอ่อน อวบน้ำ ใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบแคบเรียวยาวประมาณ 6-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ส่วนล่างของใบแผ่นหุ้มลำต้นสีเขียวอ่อน ดอกเป็นดอกช่อ ก้านดอกสีเขียว ช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อย 4-7 朵 แต่ละดอกยาว 7-15 เซนติเมตร ลักษณะตรงหรือโค้งเล็กน้อย ดอกย่อยมีกลีบนอกคล้ายกลีบประดับ รูปไข่ ปลายกลีบแหลม ผลรูปไข่ค่อนข้างยาวสีน้ำตาลแดงถึงสีดำ

หญ้าตีนกาพบได้ทั่วไปตามสนามหญ้าริมถนนทางเดิน

ประโยชน์ทางยา

หญ้าตีนกาทั้งต้นใช้รักษาอาการปวดบวม บิด อาเจียน ฝี ถอนพิษบวม แก้อักเสบ แก้ไข้ ประโยชน์ในตำรับยาของหมอพื้นบ้าน

หญ้าตีนกาทั้งต้นพอประมาณเต้มกินนำ้แก้ไข้ร้อน



หญ้าปากควาย

ชื่อสามัญไทย หญ้าปากควาย หญ้าปากกล้วย

ชื่อสามัญอังกฤษ Crowfootgrass, Beach wiregrass

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv

วงศ์ Gramineae

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

หญ้าปากควายเป็นพืชล้มลุก ลำต้นเรียบตั้งตรง มีไหล่แตกจากโคนเพื่อเจริญเป็นต้นใหม่ ทรงพุ่มสูงประมาณ 20-50 เซนติเมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกจากต้นแบบสลับ แผ่นใบเรียบยาว ประมาณ 6-18 เซนติเมตร มีดอกย่อย 2-7 ช่อ ช่อดอกมีดอกย่อยจำนวนมาก มีเส้นใยปน้ำตาล ผลรูปทรงกลม สีน้ำตาลภายนอกมีเมล็ดจำนวนมาก

หญ้าปากควายพบได้ทั่วไปตามเรือกสวน ไร่นา พื้นที่เพาะปลูกและที่กร้างว่างเปล่า ประโยชน์ทางยา

หญ้าปากควายทั้งต้นใช้ขับปัสสาวะ แก้ร้อนใน แก้พิษไข้ ประโยชน์ในการรับยาของหมอดื้ันบ้าน

หญ้าปากควายทั้งต้นพอประมาณต้มกินน้ำแก้ไข้ร้อน



คนทีสอทะเล

ชื่อสามัญไทย คนทีสอทะเล คนทีสอขา ฝีเสือน้อย ดินสอ สีสอ มุดเพิง

ชื่อสามัญอังกฤษ Indian Privet Indian Wild Paper

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Vitex trifolia* L. var. *simplicifolia* cham.

วงศ์ Labiateae

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

คนทีสอทะเล เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นลักษณะค่อนข้างกลม ผิวเรียบ ลำต้นสีเทา และอาจมีลายสีเขียวแซมบ้าง ในเมื่อขนาดเล็กด้านหน้าใบสีเขียว ด้านท้องใบสีขาวนวล ดอกจะออกบริเวณปลายกิ่ง ออกอ่อนลักษณะกลม เมื่อดอกบานกลับดอกจะเป็นสีม่วงอ่อน ผลลักษณะกลม

คนทีสอทะเล พับได้ทั่วไปตามริมถนน โดยจะขึ้นได้ดีในที่ดินรายชาวยังคงปลูก

ประโยชน์ทางยา

ดอกใช้ขับพยาธิ เปลือกใช้รักษาอาการคลื่นไส้ เหิน เมล็ดเป็นยาแรงบัวด

ประโยชน์ในตำรับยาของหมอพื้นบ้าน

หั้งดันคนทีสอทะเล ต้มกินน้ำรักษาวิริดสีดวง



นมสารค์

ชื่อสามัญไทย นมสารค์ สาวสารค์ เข็มฉัตร เย็บขาด พวงพีเหลือง หัวลิง
ชื่อพื้นเมืองปัตตานี สร้อยทอง

ชื่อสามัญอังกฤษ Clerodendrum

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Clerodendrum paniculatum* L.

วงศ์ Labiateae

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

นมสารค์เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ทรงพุ่มสูง 2-3 เมตร ลำต้นลักษณะเป็นเหลี่ยม ใบเป็นใบเดี่ยวเป็นหยักโถ ดอกเป็นดอกช่อ ออกปลายยอดมีลักษณะเป็นฉัตรดอกสีแดง ผลมีสีดำรูปทรงกลม นมสารค์พับได้ทั่ว ไปตามที่รกร้างว่างเปล่า ป่าละเมะทั่วไป

ประโยชน์ทางยา

ใบแก้ลมในอก ฝีดาษ ดอกแก้แมลงสัตว์กัดต่อย รากใช้รักษาวันโรค
ประโยชน์ในตำรับยาของหมอพื้นบ้าน

นมสารค์ทั้งต้นต้มกินสำหรับไข้



แมงลักقا

ชื่อสามัญไทย แมงลักقا แมงลักป่า กระเพราฝี

ชื่อพื้นเมืองบัตตา尼 แมงลักป่า

ชื่อสามัญอังกฤษ Wild spikenard

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hyptis suaveolens* (L.) Poit.

วงศ์ Labiatae

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

แมงลักقاเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ทรงพุ่มสูง 30 – 60 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรงและแตกกิ่งก้านสาขา
มาก ลำต้นและกิ่งมีขนขึ้นปกคลุม มีกลิ่นหอม ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่ ขอบใบหยักดอกเป็นดอกซ้ออกตามซอกใบ
กลับเลี้ยงเรียวแหลมลักษณะคล้ายหนาม กลีบดอกสีม่วง ผลมีกลีบห่อหุ้มภายในมีเมล็ดสีดำน้ำตาลหรือสีดำแมงลัก
คาดไปได้ทั่วไปตามที่รกร้าง พื้นที่ทำการเกษตรและริมถนน

ประโยชน์ทางยา

ใบ ใช้แก้หวัด ขับลม แก้ท้องร่วง เมล็ดใช้เป็นยา nhuận

ประโยชน์ในตำรับยาของหมอพื้นบ้าน

ทั้งต้นพอประมาณต้มกินน้ำ ใช้ขับลมในกระเพาะอาหาร