

damping-off /ແດມ-ຝຶ່ງ ອອົບ/ n ໂຣຄນ່າຄອດິນ ມັກເກີດກັບຕັ້ນກລ້າໃໝ່ປໍລັງເພະະ ໄດຍມີຮາສກຸລ Pythium

ແລະ Rhizoctonia ເປັນເຫື້ອສາເໜຸ່ງຂອງໄຣຄ To avoid losses from damping-off, it

is desirable to treat the soil or soil mix before uses.

dasheen /ಡಡ-ชින/ n เพือก(พีช) (ตู taro)

deciduous /ಡි-භි-ඇ-ඩු-ເටිස්/ adj ไม้ผลัดใบ Para rubber is a deciduous tree.

n ไม้ผลัดใบ A deciduous in temperate region shed its leaves in fall.
(ตู evergreen)

decompose /ଡී-ධේම-පිය්ස්/ v ย่อยสลาย เน่าเปื่อย Green manure decomposes and releases organic matters to the soil. **decomposition** /ଡී-කොම-පෙකු-ඩේම්/ n การย่อยสลายเน่าเปื่อย Decomposition of soil mulches is accellerated by microbial activities.

deficiency disease /ଡි-ෆි-ඡේන්-ඩීසි දි-භිය්ස්/ n โรค อาการผิดปกติของพืชที่มีสาเหตุมาจากการขาดธาตุอาหาร เช่น โรคใบแก้วของส้มจากการขาดธาตุสังกะสี ฯลฯ Hollow stem in cauliflower is a deficiency disease caused by a lack of boron.

deficient /ଡි-ෆි-ඡේන්/ adj พร่อง ไม่สมบูรณ์ ขาดลักษณะหรือความสามารถบางประการ Chlorosis is obvious with corn growing on soil deficient in nitrogen.

defoliate /ดิ-ไฟ-ลี-เอท/ v 1) ปลิดใบ ทำให้ใบร่วง Farmers defoliate their sugar apples to induce early flowering. (2) หักใบ Para rubber defoliates in summer. adj ใบร่วง ใบไกร้น defoliate tree **defoliation** /ดิ-ไฟ-ลี-เอท-เดิน/ n 1) การปลิดใบ การทำให้ใบร่วง defoliation by dilute herbicide application 2) การหักใบ(ตามธรรมชาติ) defoliation of teak **defoliant** /ดิ-ไฟ-เลียน/ n สารเคมีที่ใช้ทำให้ใบร่วง Defoliant is applied in the cotton field 2 weeks prior to harvesting time.

dehisce /ดิ-ชีซ/ v แตก ออก ถ้า The mature orchid pod dehisces and expel seeds far away from the mother plant. **dehiscent** /ดิ-ชีซ-เช็น/ adj ซึ่งสามารถแตกออก ออกได้ dehiscent poppy capsule **dehiscence** /ดิ-ชีซ-เชนซ/ n การแตก (ของฝัก แคปซูล อันเรณ)

dehiscent fruit /ดิ-ชีซ-เช็น/ ฟรุกต์ n ผลแห้งซึ่งเปลือกผลจะแตกออกถ้าออกเมื่อผลสุกแก่ เช่น ถั่ว, ต่างๆ แครอท (คือ dry fruit)

dehusker /ดิ-ชัก-เคอส/ n เครื่องสิ่งหรือกระบวนการเปลือก (คือ husk)

deltoid /เดล-ทอย/ adj เป็นรูปสามเหลี่ยม (คือ leaf form)

deposit /ดิ-พอด-ชิก/ v สะสม ตกค้าง sand deposited by the water current n สิ่งที่ถูกพัดพาให้มาทับลงกัน the deposit of thin ore **deposition** /เด-เพอช-ชิก-เดิน/ n การสะสม The deposition of hyacinth choked the canal.

detassel /ดี-แทล-เซลล์/ v เอาช่อเดอกตัวผู้ของข้าวโพดออก (ห้ามให้ผสมตัวเองกรณีต้องการผสมพันธุ์) โดยใช้เกสรตัวผู้จากต่างสายพันธุ์ In cross breeding, the corns were detasselled at the earlier stage of tassel development to prevent them from selfing. (ดู tassel)

deteriorate /ดี-เตียร์-เรีย-เรท/ v เสื่อมสภาพ Tropical fruits deteriorate more quickly under hot and humid condition. deterioration /ดี-เตียร์-เรีย-เรต-เดอเรชัน/ n การเสื่อมสภาพ postharvest deterioration

determinate /ดี-เทอ-มิ-เนท/ adj ชื้นเมืองการกำหนดแน่นอน determinate plant ต้นพืชชั่งเมื่อเจริญเตกถึงก้านไปถึงระยะหนึ่งแล้วปลายสุดของกิ่งจะเปลี่ยนเป็นตาดอกรและหยุดการต่อยอดต่อ กิ่ง The determinate variety of tomato help safe pruning and training cost required for the indeterminate varieties. (ดู indeterminate)

diagnose /ได-เอิก-โนซ/ v วินิจฉัยโรค วิเคราะห์สาเหตุ The pathologist diagnosed the diseases. diagnosis /ได-เอิก-โน-ზิส/ n การวินิจฉัยโรคหรือที่มาของปัญหา

dicot /ได-ค็อก/ n ย่อมาจาก Dicotyledon พืชใบเลี้ยงคู่ พืชใน Subclass Angiospermae ชั้นต้นจะมีใบเลี้ยงหนึ่งคู่ เช่น ส้ม ถั่ว Citrus and legume are dicots. dicotyledonous /ได-ค็อก-泰考-ลิ-เดอ-นิซ/ adj เป็นหรือเกี่ยวข้องกับพืชใบเลี้ยงคู่ Dicotyledonous weeds are sometime called broad-leaf weeds. (ดู monocot)

differentiate /ดิฟ-เฟอ-กรี-ชิ-ເອກ/ vi แปรสภาพ (รูปร่าง โครงสร้าง หน้าที่) ไปจากเดิม

Cells in root initials differentiate and form root primodium. vt ชี้ให้เห็นความ

แตกต่าง to differentiate pure breeds from hybrids differentiation

/ดิฟ-เฟอ-เร็น-ชิ-ເອ-ເຄີນ/ n การแปรสภาพ The cytokinin has a significant role in cell differentiation.

dioecious /ໄດ-ເອະ-ເວີຍຊ/ adj มีดอกผู้และดอกเมียต่างต้น The asparagus is a dioecious herb 4 to 10 feet tall. (ตู monoecious)

diploid /ดີ (ໄດ)-ພລອຍ໌/ adj เป็นดีพლอยด์ ประกอบด้วยโครโมโซมสองชุดในเซลล์ There are two haploid sets of chromosomes in each diploid cell. n พิชหรือสัตว์ที่เป็นดีพโลยด์ (ตู haploid และ polyploid)

disinfectant /ດີ-ອິນ-ເຟີ-ເຕີນ/ n สารที่มีผลกำจัดเชื้อสาเหตุของโรค การฆ่าเชื้อ Disinfectant eliminates organisms within the seed.

distal /ດີ-ເທີລ/ adj ห่างอยู่ไกลจากศูนย์กลางของต้น (ศูนย์กลางในที่สืบคันต้นบริเวณที่ลำต้นบรรจบกับราก) In top grafting, the proximal end of scion is attached to the distal end of stock. (ตู proximal)

division /ດີ-ວິ-ເຄີນ/ n 1) ไฟลัม (phylum) การแบ่งกลุ่มภylum ในอาณาจักรพืช Division Bryophyta comprises mosses and liverworts. 2) การขยายพันธุ์แบบไม่ออาศัยเพศโดยการตัดแบ่งส่วนหน้า กอหรือหน่อใบปะلوก division of lemongrass crown 3) การแบ่ง เช่น การแบ่งเซลล์ The ordinary somatic nuclear division is called mitosis.

domesticate /เดอะ-เมช-ทิ-เดก/ v ปลูกเลี้ยงเป็นไมบ้าน Indian corn has been domesticated for more than a thousand years.

dominant /ด็อก-เมิน-/ adj (ในกรณีของคุณ) เด่น dominant gene n 1) ลักษณะเด่น In crossing peas, long-stem are dominant to short-stem. 2) ต้นพืชที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่สุด ลักษณะหรือมากกว่า (ดู recessive)

dormant /ดอ-เมิน-/ adj พักตัว The dormant buds will sprout next spring.

dormancy /ดอ-เมิน-ชี/ n การพักตัว Seed dormancy is one of the plant mechanisms for survival.

dorsal /ดอร์-เชิล/ adj ด้านหลัง ส่วนหลัง Gardener put the sticker brand on the dorsal side of the mango fruits. (ดู ventral)

drought /ดราught/ n ความแห้งแล้ง Long spell of drought causes a crop failure.

drupe /ด្បูฟ/ n ผลสดชนิดที่มีเมล็ดแข็งหนึ่งเมล็ดต่อผลและมีเนื้อนิ่มกินได้ เช่น พุทรา มะม่วง มะปราง (ดูภาพประกอบใน fleshy fruit)

dry fruit /ดราย ฟรุ๊ก/ n ผลแห้ง เนื้อผลจะแห้ง (ไม่มีเนื้อในแบบผลสด) เช่นผล ผัก ยาง นนทรี แบ่งเป็นสองพวกคือ ชนิดที่ผลแตกอ้าออกเมื่อแห้ง (dehiscent) และชนิดที่ผลไม่แตกอ้าเมื่อแห้ง (inindehiscent)

early variety /ເອົາ-ຈີ ເວລະ-ໄຣ-ເວລະ-ທີ/ n ພັນຍຸເບາ ພັນຍຸທີ່ອອກດອກກ່ອນພັນຍຸອື່ນແລະນັກໃຫ້ເວລາ
ຕິ່ງແຕ່ເຮົ່ມອອກດອກຈົນຄິ່ງແກ່ເກີບເກີ່ວສິນກວ່າພັນຍຸອື່ນໆໃນສກາວະແລະເຫັນທີ່ປູກເຕີຂວາກັນ The early varieties of durian bloom earlier in the season and requires only 95-105 days from full bloom to harvest. (ມູນ late variety)

ecology /ອື່-ເຄາະ-ເລອະ ຈີ/ n ນິວເສດຖະກິດ, ດຽວມື້ນພັນຍຸຮະຫວາງລົງມື້ວິດແລະສກາພແວດລ້ອນ
Tillage alters soil ecology. **ecological** /ອື່-ເຄອະ-ລອ-ຈີ-ເດີລ/ adj ເກີ່ວຫ້ອງ
ກັບນິວເສດຖະກິດ ecological disturbance

edible /ເອົດ-ເຕອະ-ເບີລ/ adj ໃຫ້ເປັນອາຫານໄດ້ In addition to the edible asparagus,
the genus contains ornamental plants known as "asparagus ferns".
(ມູນ inedible)

element /ເອົລ-ລີ-ເນີນ/ n ຜາຊຸ ສາຮັ້ນໄຟອາຈະແຍກເປັນໜ່ວຍຢ່ອຍຕ່ອໄປໄດ້ອີກດ້ວຍວິທີກາງກາງເຄີມເຊັ່ນ
ອອກນິຈົນ ໃນໂຕຣເຈນ Nitrogen is the element used the most in fertilization
programme.

elliptic /ອິລ-ລີຟ-ທິຄ/ adj ຮູບຮີ ເຫັນ elliptic leaf ໃນຮູບຮີທີ່ອີກໃນນັກຕີ (ມູນພະກອນໃນ
leaf form)

emarginate /ອີ-ແມ-ຈີ-ເນກ/ adj ເປັນຫັກເວົາ emarginate leaf apex (ມູນພະກອນໃນ
leaf form)

embryo /'em-bri-ō/ n ตัวพก ต้นอ่อนของพืชจะมีข้างอยู่ในเมล็ด Most seeds have only one embryo per seed. (ดู ovary)

emerge /'em-erj/ v โผล่ The viable corn seeds emerge within a week.

emergence /'em-erj-əns/ n การโผล่ Rotary hoeing not only helps controls weeds, but often aids crop emergence where the soil is crusted.

endogenous /eon-dē-ō-jē-nēs/ adj มาจากภายใน The cuttings rooted easily and this was partly due to the endogenous auxins. (ดู exogenous)

endosperm /eon-dē-sperm/ n ส่วนของเมล็ดที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับตัวพก The endosperm of soybean seed is high in oils, carbohydrates and proteins.

epidermis /eo-pi-dē-m̄is/ n ผิวชั้นนอก เป็นเนื้อเยื่อถาวรสีขาว ปกติหนาเพียงเซลล์ชั้นเดียว ไม่มีคลอโรฟลาส มีคิติน (cutin) ชั้นอยู่ที่ผิวชั้นนอกเพื่อป้องกันการคายน้ำและป้องกันเซลล์ที่อยู่ภายใน Leaf has one or more layers of palisade cells beneath the upper epidermis.

epidermal /eo-pi-dē-m̄al/ adj เกี่ยวกับผิวชั้นนอก epidermal cells

erode /ē-rōd/ v กัดกร่อน กัดเซาะ Water runoff has eroded the bare ground for 3 years. **erosion** /ē-rō-zēn/ n การกร่อน, กัดเซาะ Severe erosion occurs on hilly terrain.

ethiolate /ເອ-ຖີ-ໄໂລ-ເຕ/ n การทำให้กิ่งและใบฟื้นໄວได้รับแสง ทำให้เติบโตช้าและมีลักษณะ
ໃນໄຟຄລ້ອອກຕາມປັດ (ຫິ່ນພວ່າຂ່າຍໃຫ້ກິ່ງອອກຮາກວິສາມໝູໄດ້ຈ່າຍຫົ້ນໃນກາຮ່າຍພັນຫຼຸ່ມແບ່ນໄຟໃຫ້ເພື່ອ)

Ethiolation increases adventitious root formation in stem tissue.

ethylene /ເຢີກ-ຖີ-ລິນ/ n ເອກທີ່ສືນ ມີຄຸນສົມບົດເປັນເສອງໂມນິຟີ່ Ripening of papaya in the storage room could be induced by ethylene application.

evaporate /ອີ-ແວພ-ເພອະ-ເຮອ/ v ຮະເໜຍ ເບີ່ຍິນສ່າວະຈາກຂອງເຫລວເປັນໄອ Water evaporate at 100 °C. **evaporation** /ອີ-ແວພ-ເພອະ-ເຮ-ເມີນ/ n ກາຮຮະເໜຍ Evaporation of water is influenced by light, temperature and wind velocity. **evaporometer** /ອີ-ແວພ-ເພອະ-ໄຣ-ນີ-ເທອະ/ n ເຄື່ອງນື້ອຕຽວຈັດອັດຕາກາຮຮະເໜຍ

everbearing /ເອ-ເວອ-ແບ-ຈິງ/ adj ທຍອຍໃຫ້ຕອກຜລຕລອດນີ້ (ໄຟອອກເແພະຖຸກາລ) , Coconut, papaya and jackfruit are everbearing plants. (ຊູ annual bearing และ biennial bearing)

evergreen /ເອ-ເວອ-ກົງນ/ adj ໄຟຜລດໃນ evergreen forest n ພີ້ໃໝ່ຜລດໃນ The evergreens such as fir and cypress do not shed leaves even in winter. (ຊູ deciduous)

exogenous /ເອັກ-ໄຟ-ເຈອະ-ເນີ້ນ/ adj ຫີ້ມາຈາກການອົກ A short and compact pot marigold can be produced by three applications of exogenous inhibitor to the marigold seedling during the first two months. (ຊູ endogenous)

exotic /ək'sɔ:tɪk/ adj 1) ของ外國 ของต่างแดน Kiwi fruit and avocado are exotic plants. 2) นำ้ทิ้ง สวายงาม หาดูได้ยาก exotic ornamental plants (ตู้ native)

family /'fæmili/ n วงศ์ (บางทีใช้ ตรรกะล) การจำแนกชั้นทางพฤกษศาสตร์ในระดับที่ใหญ่กว่าสกุล แต่เล็กกว่าอันดับ Peas and beans belong to the legume family or Leguminosae. (ตู้ genus และ order)

farm /fɑ:m/ vi ทำการเกษตรกรรม He has farmed for 20 years. vt ให้เชื้อเพลี้ยทำการเกษตรกรรม He farmed 20 rais last year. n พื้นที่ที่ให้ทำเกษตรกรรม dairy farm farming n การทำเกษตรกรรม prawn farming

farmer /'fɑ:mər/ n เกษตรกร dairy farmer เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม rice farmer ชาวนา กลิ่น

fertile /'fer:tɪl/ adj 1) อุดมสมบูรณ์ fertile land 2) ให้สืบพันธุ์ได้ (ไม่เป็นพัน) fertile stamen fertility /'fer:tɪl-ɪ'tɪl/ n 1) ความอุดมสมบูรณ์ the land of high fertility 2) ความแข็งแรง ความสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ Durian pollen can maintain fertility for at least 24 hours. (ตู้ infertile)

fertilize /เฟอร์-ทิ-ไลз/ v 1) ปฏิสนธิ, เซลล์สีบักซ์ในผู้และเมศเมื่อผสมกันและหักมาต่อไปเป็น

ตัวพังค์ A sperm cell from pollen fertilizes an ovule and forms a zygote.

2) ให้ปุ๋ย Farmers fertilized the fields with cattle manure. fertilization

/เฟอร์-ทิ-ไล-เซช-ເຕິນ/ n 1) การปฏิสนธิ Without fertilization, the flowers drop.

2) การให้ปุ๋ย Fertilizations of paddy field should be done twice, the first time at 45 days after transplanting and the second time about 60 days before harvesting time.

fertilizer /เฟอร์-ทิ-ໄລ-ເຊອ/ n ปุ๋ย (ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยฟีฟัสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี และรวมถึงปุ๋น้ำที่ใช้ปรับความเป็นกรดด่างของดินด้วย) The principal phosphorus fertilizer material at the present time is superphosphate.

filament /fila-ເລອະ-ເມີນ/ n ก้านอับเรณู (ดูภาพประกอบใน flower)

flesh /เฟลชม/ n เนื้อ เช่น เนื้อของผลไม้ ผัก yellow fresh of pumpkin fleshy /ເຟຣັດ-ຄີ/

adj มีเนื้อหุ้มเมล็ดเมื่อจ้ำน้ำ (มักจะใช้เป็นอาหารได้) Chestnut is a dry fruit whereas banana, tomato and grape are freshy fruit.

fleshy fruit /ເຟຣັດ-ຄີ ຝຽກ/ n ผลไม้ที่มีเนื้อเมื่อจ้ำน้ำ ส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหารได้ ได้แก่ผลประทุม

berry drupe hesperidium pepo pome ແລະ

ກາພທີ່3

floral /ฟลอ-เริล/ adj ชีวะเกี่ยวกับดอกไม้ floral biology floret /ฟลอ-รีท/ n

ดอกย่อยในช่อดอกหรือในดอกรวม The chrysanthemum flower consists of several florets arranged in one inflorescence called a cyme. florist /ฟลอ-ริสต์/ n คนขายดอกไม้ หรือเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก experienced florist

floriculture /ฟลอ-ริ-คัล-เชอ/ n สาขาวิชาหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

Floriculture involves cultivation and management of ornamental and flowering plants.

flower /ฟลา-เวอ/ v 1) ให้ดอก Mangosteen commonly flowers once a year.

2) ทำให้ดอกดอก The farmers in Central Thailand use water stress to flower their citrus orchards. n ดอกน้ำ อวัยวะเพื่อการสืบพันธุ์ของพืช Hermaphrodite flowers have both pistil and stamen. **flowering** /ฟลา-เวอ-ริง/ n การออกดอก Cycocel is used to induce flowering of longan in the North.

ภาพที่ 4

flush /ฟลัช/ v แตกใบอ่อน Mature mango usually flushes 3-4 times a year esp. during rainy season. n. ยอดอ่อนใบอ่อนที่แตกออกมา The new flushes are subjected to insect damage until the leaves are fully expanded and turn dark green.

follicle /เฟลิ-เดิล/ n ผลแท้ทั้งชนิดหนึ่ง ผลพัฒนาจากรังไข่เดียวซึ่งเปลี่ยนแปลงตามรุขณะเป็นเดียวด้านหนึ่งของผล (เมื่อผลแก่จัด ดูภาพประกอบใน dry fruit)

fresh /เฟรช/ adj สด Consumers prefer to buy fresh and green vegetable from farms rather than from the supermarket.

fruit /ฟรุต/ vi ให้ผล ออกผล Guava fruits satisfactorily all year round if well tended. vt ทำให้ออกผล It is not recommended to fruit the young mandarin during the first two years of establishment. n ผลไม้ อวัยวะเพื่อการสืบ受けพันธุ์ ของพืชที่พัฒนาจากรังไข่และ/หรือส่วนอื่นๆของดอก ภายในมีเมล็ดหนึ่งเมล็ดหรือมากกว่า ด้านนอก เป็นส่วนเปลือกที่แห้งหรืออาจเป็นเนื้อผลที่ใช้รับประทานได้ (ดู dry fruit และ fleshy fruit)

fume /ฟิวม/ n ควัน ไอ (มักจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือเป็นพิษ) poisonous fumes

fumigate /ฟิว-มิ-เกท/ v ผ่าเชื้อด้วยการรม to fumigate the tobacco seed beds with methyl bromide **fumigation** /ฟิว-มิ-เก-เดิน/ n การรม การผ่าเชื้อด้วยการรม Fumigation was used to control pests in corn storage. **fumigant** /ฟิว-มิ-เกิน/ n สารเคมีที่ใช้รม

fungus /ฟัง-เกิช/ n รา มีรูปร่างเป็นเลี้นไช บางชนิดเป็นสาเหตุของโรค fungicide /ฟัง-จิ-ไซด์/ n ยาผ่าเชื้อรา Benomyl is a common fungicide.

fusarium /ฟิว-ชา-เรียม/ n 1. ชื่อสกุลของเชื้อรา 2. เชื้อราสาเหตุของโรคเหี่ยวนินิดหนึ่ง Fusarium wilt disease in potato is caused by Fusarium oxysporum.
(ดู damping-off)

gamete /แคม (เกล)-เมท/ n เซ่น ไห้หรือสเปร์ม The gametes of a sexually reproducing individual contain half the usual number of chromosomes.
(ดู zygote)

gene /เจน/ n จีน หน่วยของการพัฒนากรรม เป็นตัวกำหนดลักษณะอันไดอันหนึ่งในพืช เช่น ลักษณะต้นเตี้ย ต้นสูง ดอกสีขาว ดอกสีขาว ฯลฯ A unit of heridity, for example, the element that controls the stem-length character in pea, is called a gene. **genetic** /เจน-เน-ติก/ หรือ **genetical** /เจน-เน-ติ-เคล/ adj ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนากรรม genetic engineering genetics n พันธุศาสตร์ (ดู genome, chromosome และ germplasm)

genome /เจ-โนม/ n ชุดและผลลัพธ์ของโครโมโซม ชุดโครโมโซมที่รวมเอา จีน ที่ควบคุมลักษณะทางพัฒนากรรมของพืชหนึ่ง ๆ ไว้ครบชุด The specific term for the haploid set of chromosomes is genome. (ดู gene, chromosome และ germplasm)

genotype /เจน-โนอะ-ไท/^๒ n องค์ประกอบทางพันธุกรรม ผลรวมของลักษณะจากเจนที่มีในพืชนั้น ๆ

Each of marcots propagated from the same tree has the same genotype.

(ดู phenotype)

genus /จี-เนิส/^๒ n สกุล การจำแนกชั้นของพืชในระดับที่ใหญ่กว่าชนิด(species)แต่รองลงมาจากระดับ (หรือตระกูล) Citrus is a genus comprises orange, pummello, lime, lemon, grape fruit etc. (ดู species และ family)

germinate /เจอะ-มี-เนท/ vi ของ Corn seeds germinate within a week. vt เพาะ

Nursery man germinates flower seeds in a portable flat. germination

/เจอะ-มี-เน-เดิน/^๒ n การเพาะ 1) Germination of rare species was done with care under the laboratory condition. 2) การงอก The seed germination was poor because of the hard crust on the soil surface.

germplasm /เจม-พลาซ-ເเซມ/^๒ n เชื้อพันธุ์, เซลล์สืบพันธุ์และองค์ประกอบทุกชนิดที่เป็นตัวกำหนดหรือควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม Gene bank is where all forms of germplasm are collected and preserved in a very sophisticated manner for long term uses. (ดู gene, genome และ chromosome)

gibberellins /จิบ-โนอะ-เรล-ลิน^๒/ n ฮอร์โมนกลุ่มจิบเบอร์ลิน มีผลในการควบคุมการขึ้นตัวของเซลล์และปรากម្មการเจ้างสรีริวิทยาที่สำคัญของพืชหลายอย่าง Gibberellins are responsible for cell elongation in plants. (ดู growth regulator)

glabrous /เกล-เบรช/^๒ adj ผิวนี้ย (ไม่มีขนปกคลุม) glabrous leaves (ดู pubescent)

glasshouse /กลาช-เฮา^{ส์}/ n เรือนกระจก โรงเรือนสำหรับปลูกพืชชนิดฝ่าและหลังคาทำด้วยกระจกหรือวัสดุโปร่งใสสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ Glasshouse is required for all-year-round tomato production in the temperate zone. (ตู้ greenhouse)

globose /โกล-บีซ/^{ส์} adj เป็นทรงกลม the globose fruits of pomegranates

globular /โกลบ-เยอะ-เลอะ/^{ส์} adj เป็นทรงกลม globular shape

graft /กราฟ^ท/ vt เชื่อมต่อส่วนของพืชให้สมานเข้าด้วยกันเช่นการต่อ กิง เสียงกิง The propagator grafted the mandarin scion onto the trifoliate orange rootstock.

vi ต่อ สมานเข้าด้วยกัน Plant grafts better upon its own species rather than upon the different ones. n 1) การเชื่อมสมานเข้าด้วยกัน the sucessful graft 2) บริเวณรอยต่อของต้นต่อ กับยอดพันธุ์ the strong graft 3) ต้นเสียงกิง ทابกิง He sold many grafts of longan last year. grafting n การต่อ ทاب หรือ เสียงกิง Grafting is an alternative to cutting in the difficult-to-root species.

graft union /กราฟ^ท อู-เนียน/^{ส์} n รอยต่อของต้นต่อ กับยอดพันธุ์ The new grafts should be handled carefully since the graft unions are not yet strong enough.

grain /เกรน/ n 1) เม็ด เช่นเม็ดดินเม็ดกราด grains of coarse sand 2) หน่วยน้ำหนักกิโลกรัม จากน้ำหนักของเมล็ดข้าวสาลี มีค่า = 0.0648 กรัม 3) ลายไม้ เนื้อไม้ wood grain 4) เมล็ดข้าวพืช ข้าวพืช (ตู้ cereal)

gramineae /เกรอ-มีน-น/^{ส์} n 1) ตระกูลหญ้า พืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบแคน ผลแห้งแบบ caryopsis ได้แก่หญ้าต่าง ๆ ข้าวพืช อ้อย ฯลฯ 2) พืชตระกูลหญ้า Bamboo is the biggest gramineae.

grassland /กราส-แลนด์/ n 1) ทุ่งหญ้าธรรมชาติ หรือสภาพนิเวศที่มีหญ้าขึ้นอยู่เป็นล่วงไป
2) แปลงปลูกหญ้าและฟืชอาหารสัตว์ the luxuriant grassland (ดู rangeland และ pasture)

green manure /กรีน เมน-นัร/ n ปูยพืชสด Sweet sorghum had been sown and was ploughed under the soil at flowering stage as a green manure. (ดู manure และ fertilizer)

greenhouse /กรีน-เฮาส์/ n เรือนกระจก อาคารสำหรับปลูกพืช (ดู glasshouse)

growth regulator /ไกรซ์ รี-กู-เล-เกอ/ n สารควบคุมการเจริญเติบโตได้แก่ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนพืช Indolebutyric acid is the effective growth regulator used in rooting of cutting. (ดู hormone)

gymnosperm /จิม-เนอส-ไซเบอร์ม/ n จิมโนเปริม พืชในกลุ่ม Gymnospermae ได้แก่พวงสนและปรงทึ่ง เมล็ดจะไม่มีรังไข่ห่อหุ้ม Conifer and cycas are gymnosperms. (ดู angiosperm)

haploid /แฮป-เพลอด/ adj ซึ่งมีโครโมโซมหนึ่งชุดเป็นองค์ประกอบในเซลล์ The basic haploid number of chromosomes in an organism or group of organism is the lowest number containing a complete set of genes. (ดู diploid และ polyploid)

harden /hardt-đen/ v ทำให้ทนทาน ทำให้แกร่งขึ้น Farmers harden the seedlings by gradually expose them to the strong sunlight and rough environment.

hardening /hardt-đen-ing/ n การทำให้ทนทานขึ้น แกร่งขึ้น Hardening is a treatment that result in a firming of a tissue of the plant, thus enabling them to withstand unfavourable conditions. **hardy** /hardt-di/ adj แกร่ง พนอสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้ hardy plants **hardiness** /hardt-di-nes/ n ความทนทาน การทนต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้ (ดู tender)

hardpan /hardt-pen/ n ชั้นดินดาน ตินซึ่งจับตัวแข็งเป็นชั้นทำให้น้ำซึมผ่านไม่ได้หรือไม่สะดวก (ส่วนมากเป็นตินเหนียวหรือดินลูกรัง) Sub soiler broke the hardpan and improve drainage.

heartwood /hart-woođ/ n แก่น(ไม้) ส่วนของไซเลม (xylem) ที่ไม่มีชีวิตแล้ว (ดู sapwood)

herbaceous /herb-e-üs/adj มีลำต้นอ่อนแบบลำต้นของหญ้า อ้อย (ไม่มีเนื้อไม้แนบ ไม่เต็ง ไม่สัก ไม่จำล่า) Banana and pineapple are herbaceous perennial. **herb** /herb/ n 1) พืชที่มีลำต้นอ่อนแบบต้นอ้อตี้แซน ไม่มีเนื้อไม้ Sugar cane is a herb. 2) พืชสมุนไพร เครื่องเทศ Ginger and pepper are used both as spices and medicinal herbs. (ดู woody)

hermaphrodite /her-maf-ro-dit/ n คอกรรມเพศ (ดู bisexual)

hesperidium /he-sper-i-düüm/ n ผลประเทา berry ซึ่งมีเปลือกนิ่มแบบส้ม ส้มโอ มะนาว (ดู กานประกาบใน freshy fruit)

heterogeneous /ເຫຼັກ-ເທອະ-ໄຣ-ჸີ-ເນຍີ້/ adj 1) ວິວິພັນໝູ 2) ໄຟເປັນເນື້ອເດືອກັນ hetero
geneous soil (ດູ homogeneous)

heterozygous /ເຫຼັກ-ເທອະ-ໄຣ-ໄກ-ເກີ້/ adj 1) ມີຈົນຕ່າງສ່ານ ມີຄູ່ຈົນຂຶ່ງມີຈົນທີ່ໄຟເໜືອນກັນໂຍ່ງນີ້ຍ
ໜີ້ງຕູ່ອ່ອຽນໃນໂຄຣໂນໂຄນ 2) ສ້າງເໜີລ໌ລືບພັນຍູໍໃຫ້ລັກໝະກາງພັນຫຼຸກຮຽມທີ່ຕ່າງກັນສອງໝືດ All
hybrids are heterozygous in nature. (ດູ homozygous)

hill /ຫີ່ລ/ v 1) ຍກໂດກ, ພູນເນີນ to hill up soil around the mango trees 2) ພູນຕິນ
ກລມໄຄນ to hill the cassava n 1) ເນີນ ເນີນຫາ high hill 2) ພຸ້ມປຸ້ກ The
gardener plants 8-10 seeds of cucumber per hill.

homogeneous /ໄກ-ເນຂະ-ໄກ-ເນຍີ້/ adj 1) ເຄພັນໝູ 2) ເປັນເນື້ອເດືອກັນ Structure of
the flower members of this subfamily is very homogeneous and easy to
recognize. (ດູ heterogeneous)

homozygous /ໄກ-ເນຂະ-ໄກ-ເກີ້/ adj ມີສ່ານຈົນເໜືອນກັນ ມີຈົນທີ່ໃຫ້ລັກໝະກາງພັນຫຼຸກເໜືອນກັນ
ອຍ່າງນອຍທີ່ຈົນ The color of this mungbean seeds is very uniform and con-
sidered to be homozygous in term of seed color. (ດູ heterozygous)

hormone /ຫອ-ໄມິນ/ n ສາຮັກ໌ສ້າງຂຶ້ນສາມາດເຄີ່ນຍ້າຍຈາກຈຸດທີ່ຄູກສ້າງແລະໄປມີຜລຄວນຄຸມກາງເຈົ້າ
ເຕີບໂຕແລະຂບວນກາງທາງສີຮິວຍາໃນອົກລ່ວນທີ່ຂອງຟື້ອມແມ້ຈະມີຄວາມເຂັ້ມ້າຫຼຳມາກາ Indole acetic
acid is one of the hormones produced in plants. hormonal /ຫອ-ໄມ-ເນີລ/ adj
ຂຶ້ນເກົຍວ້ອງກັນອ່ອຽນ hormonal activities (ດູ growth regulator)

horticulture /հօր-ի-տլ-եօ/ n 1) วิชาฟืชสวน (ผัก ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ) Horticulture is a natural science. 2) ธุรกิจฟืชสวน Horticulture makes more money per unit area than agronomy. **horticultural** /հօր-ի-տլ-եօ-րէլ/ adj ซึ่งเกี่ยวข้องกับฟืชสวน Litchi, rose, lettuce, coffee, pepper and mint are all horticultural crops. **horticulturist** /հօր-ի-տլ-եօ-րիչ/ n ชาวสวน, ผู้ประกอบธุรกิจทางฟืชสวน (ดู agronomy)

host /հօս/ n พืชหรือสัตว์มีชีวิตซึ่งเป็นที่พำนักอาศัยของปรสิตหรือตัวเนื้ชน (ดู parasite)

humid /հիւ-միդ/ adj ชื้น hot humid climate in the tropics **humidity** /հիւ-միդ-է-ի/ n ความชื้น relative humidity

humidify /հիւ-միդ-է-փ/ v ทำให้ชื้น Orchid growers humidify their nurseries during a noon time using a high-pressure misting equipment. **humidifier** /հիւ-միդ-է-փայ-էօ/ n เครื่องทำความชื้น Humidifier maintain a high relative humidity in vegetable storage. **humidification** /հիւ-միդ-է- ֆ-կէ-դէն/ n การทำให้ชื้น Storage of fresh vegetables requires both refrigeration and humidification.

humus /հիւ-մէշ/ n ทุกอินทรีย์, ริวมัส, สารอินทรีย์ในดิน ได้มาจากการเน่าเปื่อยผังของพืชหรือสัตว์ **humic** /հիւ-միկ/ adj เกี่ยวข้องหรือมาจากทุกอินทรีย์ humic acid

husk /հսկ/ v ปลอกเปลือก to husk a coconut n 1) เปลือกหุ้มเมล็ดมักจะแห้งหรือเหี่ยว เช่นกลบ rice husk 2) เปลือกหุ้มฝักข้าวโพด corn husk

hybridize /ไฮ-บริด-ไดซ/ v ผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์ เพื่อผลิตลูกผสม to hybridize two purebreds

hybrid /ไฮ-บริด/ n ลูกผสม adj ซึ่งเป็นลูกผสม hybrid corn

hybridization /ไฮ-บริด-ได-เจริญ-เดิน/ n การผสมพันธุ์เพื่อผลิตลูกผสม (ดู crossing)

hybrid vigor /ไฮ-บริด วิ-เกอ/ n ความแข็งแรงและการเจริญเติบโตได้ดีกว่าเกณฑ์ปกติอันเป็น

ผลของการผสมข้ามพันธุ์ If two different inbred lines of corn are crossed, the hybrid progeny display hybrid vigor.

hydroponic /ไฮ-เดรอ-พอน-นิค/ adj ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลูกพืชในสารละลายน้ำยา hydroponic

culture of tomato hydroponics /ไฮ-เดรอ-พอน-นิคซ/ n การปลูกพืชในสารละลายน้ำยา

hygrometer /ไฮ-ไฮกร-เมโระ-เทอเร/ n เครื่องวัดความชื้นในอากาศ Hygrometer is

installed in the glasshouse to monitor the relative humidity of the air.

hygroscopic /ไฮ-เกรอ-ซิโค-พิค/ adj ซึ่งดูดซึมน้ำหรือดูดซึมความชื้นไว้ hygroscopic water

n น้ำที่ดูดซึบไว้เป็นจำนวนมากที่ผิวของอนุภาคดิน Hygroscopic water is not available to plants. (ดู capillary)

illuminate /อิ-ลู-เมน-เนท/ v ส่องแสง ให้แสงสว่าง The technician used incandescent

and fluorescent lamps to illuminate lettuce seedling in the laboratory.

immature /อิม-เมอะ-ชัว adj อ่อน เยาว์ (ผลไม้) ยังไม่สุกแก่ This seed lot is poor in term of quality because it consists of immature seeds.

immaturity /อิม-เมอะ-ชัว-ເອະ-ที/ n ความอ่อนเยาว์ (ดู mature)

immunize /อิม-มิว-ไนซ്/ v สร้างภูมิคุ้มกัน **immune** /อิม-มิว恩/ adj มีภูมิคุ้มกัน Root knot cause by nematodes can be controlled by rotation of immune crops such as corn, wheat and barley. **immunization** /อิม-มิว-ไน-ເຊ-ເଡີນ/ n การสร้างภูมิคุ้มกัน **immunity** n ภูมิคุ้มกัน **immunology** n ภูมิคุ้มกันวิทยา, อิมมูโนวิทยา

imperfect flower /อิม-ເພອ-ຟິດ/ ໜລາວ-ເຂອ/ n ดอกไม้สมบูรณ์เพศ (มีเนืองเพศเดียวในหนึ่งดอก) Male papaya has the imperfect flowers which contain no pistil. (ดู incomplete flower)

impervious /อิม-ເພອ-ເວິຍກ/ adj ชึง (แสง, น้ำ ฯลฯ) ไม่สามารถผ่านได Hardpan in certain soil is impervious to water and root penetration.

incomplete flower /ອິນ-ເຄີມ-ຟິກ/ n ดอกไม้ครบส่วน ขาดองค์ประกอบของดอกส่วนหนึ่งส่วนใดไป (ดู complete flower)

inconspicuous /ອິນ-ເດີນ-ຫຼື-ດົວ-ເອີ້ນ/ adj เพ็นได้ไม่ชัดเจน Certain genotype is inconspicuous. (ดู conspicuous)

indeterminate /ອິນ-ດີ-ເທອະ-ມີ-ນິກ/ adj สามารถเจริญเติบโตແຕກกิ่งก้านสาขาไปไดเรื่อยๆ Pruning is neccessary in growing indeterminate tomato. (ดู determinate)

inedible /อิน-เอนดิ-บิล/ adj ใช้เป็นอาหารไม่ได้ กินไม่ได้ (ถ้า edible)

infertile /อิน-เฟอ-ไทล์/ adj 1) ไร่ดูดสมบูรณ์ infertile land 2) เป็นพันธุ์
infertile stamen (ถ้า fertile)

inflorescence /อิน-ฟลอร์-เรช-เอ็นซ์/ n ช่อดอก Wheat's inflorescence is spike.

ภาษาที่ 5

Inhibit /อิน-ไฮบ-บิท/ v ขับยั้ง B-nine is used to induce dwarfing effect since it inhibits cell elongation in plant. inhibitor /อิน-ไฮบ-บิ-เทกอะ/ n ตัวขับยั้ง B-nine is an effective growth inhibitor used to produce short and compact pot chrysanthemums. (ถ้า growth regulator)

inoculate /อ-นัค-เคอะ-เลท/ v ใส่เชื้อ When introducing legumes into new area, it is advisable to inoculate them with the correct strain of Rhizobium. inoculation /อ-นัค-เคอะ-เล-เดิน/ n การใส่เชื้อ An inoculation of mosaic virus was done on tomato leaves for disease resistance trial.

inoculum /อ-นัค-เคอะ-เลิม/ n สารเชื้อ เช่น สปอร์ ของเชื้อราที่สักดามาจากส่วนที่เป็นโรคและมีเชื้อ สารเหตุเชื้อ Inoculum was made from crude extract of the infected caterpillars.

intercrop /อิน-เทโค-ครอป/ vt ปลูกแซม to intercrop coconuts with cacaos vi

ปลูกฟืชแซม ปลูกฟืชสองชนิดหรือมากกว่าพร้อมกันในพื้นที่เดียวกัน This orchard was intercrop during the first three years. n พืชแซม The intercrops used in rubber plantation are pineapple, banana and peanut. intercropping n การปลูกฟืชแซม (ดู cropping system)

internode/อิน-เทโค-โนಡ/ n ปล้อง ส่วนของลำต้น (หรือกิ่ง) ที่อยู่ระหว่างชื่อของพืช a hollow internode of bamboo internodal adj เกี่ยวข้องอยู่กับส่วนปล้อง (ดู node)

inter-row /อิน-เทโค-ไร/ adj ระหว่างแถว The inter-row spacing of 1 meter was used to facilitate weeding in cotton field.

interstock /อิน - เทโค-ช็อต/ n ส่วนของพืชที่นำมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างต้นตอ กับยอดพันธุ์ (ใช้ในการเพลี้ยงและยอดพันธุ์ ไม่สามารถเชื่อมกันได้โดยตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น บังคับให้ต้นเตี้ย ฯลฯ) Paradise apple is used as an interstock to induce precocity in apple trees grown on crabapple rootstocks. (ดู rootstock และ scion)

isolate /ไอ-เชอ-เลอ/ v ไปอยู่เป็นการเฉพาะ แยกไปอยู่โดยเดียว The purebred was isolated 3 miles away from any other corn plots to avoid crossing. หรือ คัดแยกออกจากเดียว to isolate Aspergillus from the rotten fruit isolation /ไอ-เชอ-เล-เมิน/ n การแยกไปอยู่อย่างโดดเดียว หรือห่างไกล

juvenile /จู-เวโล-ไนฟ/ adj สัมภาร์ อังไน่สามารถให้ตอผลได้ Plant can not reproduce sexually during juvenile phase. juvenility n ความเยาว์วัย (ดู adult)

kernel /ເຄົ້າ-ນີລ/ n 1) เม็ดໃນ, ส่วนເນື້ອໃນເມັດຂອງຜລປະເກຫ nut, drupe ຊລ່າ ເຊັ່ນເນື້ອຈາກເມັດທີ່ກະເທເກແລ້ວຂອງມະມ່ວງທີມພາຫີ່ ເກາລັດ kernel of cashew nut 2) ເມັດຫຼັບໝື້ນເຊັ່ນ ຫ້າວໂໄຕ ຫ້າວຝ່າງ kernel of corn

lanceolate /ແລນ-ຈີ-ເອຂະ-ເລກ/ adj ວຸປ່ອກ (ດູກາພປະກອບໃນ leaf form)

late variety /ເລກ ວາ-ໄຣ-ເອຂະ-ກີ/ n ພັນຍຸ້ນັກ ພັນຍຸ້ນຳກີ່ອກດອກຫລັງ ແລະ ໃຊ້ເວລາຕັ້ງແຕ່ດອກບານຈຸນແກ່ເກີບເກີຍວານກວ່າພັນຍຸ້ນຳປົກຕິກ້ວາໄປ Late varieties of durian require 120-140 days from full bloom to harvest. (ດູ early variety)

lateral /ແລກ-ເທອ-ເຮີລ/ adj ເກີດຈາກຫົ່ວອອກມາທາງດ້ານໜ້າ Guava has a lateral fruit bearing habit while longan has a terminal one. (ດູ terminal)

latex /ເລ-ເກເກຊ/ n ນໍ້າຍາງ, ຂອງເລວສີຂາວໜ້າ ມີໃຟ້າໝາຍໜິດຮາມກີ່ງຢາງພາກາ Rubber latex was collected and processed into rubber sheets.

lawn /ລອນ/ v ກຳສາມໜັງ to lawn the terrace in the begining of rainy season n ສາມໜັງ The lawn was mown every month. (ດູ turf)

layer /ເລ-ເອຂະ/ v (ຂໍາຍພັນຍຸ້ນຳໂດຍກາຣ) ໂັ້ມກົງຫົ່ວອຕອນ ກຳໃຫ້ກົງອອກຮາກໃນໜະກິ່ນຕົດອຸ່ງກັບຕັ້ນແມ່ແລະຕັດແຍກໄປປຸລຸກເນື້ອກົງອອກຮາກແລ້ວ layering n ກາຣ(ຂໍາຍພັນຍຸ້ນຳໂດຍກາຣ) ໂັ້ມກົງຫົ່ວອຕອນ The quick and simple means of jasmine propagation is by layering. (ດູ air layering)

leaf /ลีฟ/ n ใบ ส่วนที่เจริญมาจากลำต้นส่วนใหญ่เป็นแผ่นแบนหนาที่หลักคือปุ่งอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์แสง The parallel venation of monocots leaves make them quite distinguished from the dicots. **leaflet** /ลีฟ-ลิต/ n 1) ใบย่อย(แต่ละใบของใบประกอบ) 2) ใบไม้ขนาดที่ยังเล็กอยู่ 3) ใบที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก

ภาพที่ 7

leaf form /ลีฟ ฟอร์ม/ n รูปทรงของใบ

ภาพที่ 8

lime /ไลม/ v ใส่ปูนขาว Seed drill can be used to lime the field instead of hand application. n 1) มะนาว cooking lime 2) ปูนขาว two bags of lime
liming n การใส่ปูนขาว Liming requirement depends on soil reaction, the crop or crops to be grown, the kind of soil, and the form of lime.

loam /โลэм/ n ดินร่วน มักมีชุขอินทรีย์สูง Most soils of agricultural importance are some type of loam. **loamy** /โลэм-มี/ adj ร่วน Cultivation is much easier with loamy soil.

lobe /lob/ v กิดเป็นแฉก กลีบ พุ หรือ ลอน leaf prominently lobed n กลีบ พุ ลอน ของผลไม้, แยกของใบไผ่ The fruit of star apple has 5 conspicuous lobes.

luxuriant /ลัก-ชิว-เรียน/ adj เจริญงอกงาม the luxuriant growth of the rain forest

macronutrient /มา-โค-นิว-เทเรย์น/ n ชาตุหลัก ชาตุอาหารที่เพื่องต้องการในปริมาณมาก เช่น ไนโตรเจน แคลเซียม แมกนีเซียม ในโครงสร้าง ฟอสฟอรัส และกำมะถัน Nitrogen and phosphorus are macronutrients almost always present in small amount in mineral soils. (ดู micronutrient)

macropore /มา-โค-พอ/ n โพรงหรือช่องว่างในเนื้อดินซึ่งมีขนาดใหญ่ เกินกว่าที่แรงของการซึมตามรูเล็ก (capillary action) จะขัดขวางน้ำให้ขังอยู่ในโพรงนั้นได้ และจะระบายน้ำสู่เบื้องล่างด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก Macropores allow the ready movement of air and percolating water in soil. (ดู micropore)

manure /เมอ-นัว/ v ให้ปุ๋ยคอก ใส่ปุ๋ยคอก to manure the pasture n ปุ๋ยคอก Stable manure or barnyard manure is a good fertilizing material to be used in vegetable growing. (ดู green manure และ fertilizer)

marcot /มา-คอท/ v ตอน ขยายพันธุ์โดยครั้งเดียวเปลือกและเขื่องเจริญออกพร้อมหุ้มแพลตัวข่าวสุดปลูกเพื่อให้กึ่งออกراك to marcot the trees n 1) กึ่งที่ใช้ตอน The suitable marcot should not be too young or too old. 2) กึ่งตอน(ที่ตัดแยกจากต้นแม่แล้ว) The rooted marcots have to be planted in pots or polyethylene tubes and watered well. **marcottage** /มา-คอท-ทิจ/ n การตอน **marcotton** /มา-คอท-ทิจ/ n การตอน (ดู layer)

mature /เมอะ-ชัว/ adj 1) (พืช) ที่โตเต็มวัยสามารถออกดอกออกผลได้ Mature plant is capable of producing fruits. 2) (ผล)แก่ Mature fruits will develop a favourable quality after ripening. **maturity** /เมอะ-ชัว-รี-ทิ/ n การโตเต็มวัย (ดู immature และ juvenile)

meiosis /ไม-อิว-ชิส/ n ไมโอดิส กระบวนการแบ่งเซลล์และการเปลี่ยนแปลงในพืช เพื่อผลิตเซลล์ลึบพันธุ์ที่มีจำนวนครึ่งโมโนซิมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ The evolution of meiosis was the most significance for the development of sexual reproduction in plants. (ดู mitosis)

meristem /เม-เรอะ-ชเต้ม/ n เขื่องเจริญ เป็นกลุ่มเซลล์ ที่มีการแบ่งตัวแบบไมโอดิสอย่างรวดเร็วพบมากที่ส่วนปลายยอด ปลายรากและแคนเนียม In leaf cutting of african violet, new plants may developed from secondary meristem at the base of the leaf blade or petiole. **meristematic** /เม-เรอะ-ชเตอะ-แม-ทิก/ adj เกี่ยวข้องหรือเกิดจากเขื่องเจริญ meristematic cells at shoot apex and root cap

micronutrient /ไม-ไคร-นิว-เทรียน/ n ธาตุอาหารเสริม ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส สังกะสี กองแคลง ไบرون โนลิบิตัม และคลอรินซึ่งมีความสำคัญต่อพืชแต่พืชต้องการใช้ในปริมาณที่ไม่มากนัก Lack of micronutrients can impair growth and development of plant. (ดู macro-nutrient)

micropore /ไม-ไคร-โพร/ n ไ反感หรือช่องว่างขนาดเล็กในเดิน Only capillary water can pass through micropores, aeration through these passages is very limited. (ดู macropore)

mitosis /ไม-ไท-ซิส/ n ไมโตกอส การแบ่งเซลล์ของเซลล์ร่างกายเพื่อการเจริญเติบโตตามปกติซึ่งองค์ประกอบบางพันธุกรรมของเซลล์ที่เกิดใหม่จะเหมือนกับเซลล์ที่ให้กำเนิด In mitosis, each chromosome duplicates itself, and the duplicates are separated from each other at cell division. **mitotic** /ไม-ท็อก-ทิก/ adj เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ร่างกาย (ดู meiosis)

modified parts /มอด-ดิ-ไฟ พาท/ n ส่วนของพืชที่ปรุงร่างลักษณะไปเพื่อทำหน้าที่พิเศษ เช่น สะสมอาหารหรือใช้ขยายพันธุ์ เช่น bulb, corm, rhizome, tuber, runner, ฯลฯ

moisture /มอยส์-เมอ/ n 1) ความชื้น (ทึ้งที่กระจายอยู่ในอากาศในรูปของไอน้ำหรือหมอก ความชื้นที่แทรกอยู่ในมวลของแข็ง เช่น เนื้อดิน เนื้อผลไม้ ก็ไม่สด หรือที่รวมตัวกันเป็นหยดน้ำที่เย็น) soil moisture 2) ไอน้ำในบรรยากาศ air moisture (ดู humid)

monocot /ไม-เนอะ-ค็อก/ n พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใน subclass Angiospermae ซึ่งคัพเพลน์ใบเลี้ยงใบเดียว เช่น หญ้า ข้าวฟ่าง ปาล์ม Palms, bamboos, and grasses are monocots.

monocotyledonous /ไม-เนอะ-ค็อก-เทอะ-ลี-เดิน-เนิฟ/ adj เป็นหรือเกี่ยวข้องกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ดู dicot)

monoecious /เมอะ-นี-เดิฟ/ adj มีดอกผู้ตอกรเมียร่วมต้น Corn is monoecious. n พืชที่มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน (ดู dioecious)

morphology /มอ-ഫะ-เลอะ-จี/ n สัณฐานวิทยา สาขาของชีววิทยาว่าด้วยรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของพืชหรือสัตว์ The morphology and chemistry of chromosomes have been intensively studied by scientists. **morphological** /เมอะ-ফะ-ลี-จี-เดิล/ adj เกี่ยวข้องกับรูปร่างสัณฐาน morphological study of flowers **morphologist** n /มอ-ฟะ-เลอะ-จี"/ นักสัณฐานวิทยา

mottled /มอท-เกิล/ adj เป็นด่างดาว Mottled leaves are caused by viruses.

muck /มัค/ n ดินอินทรีย์ชนิดหนึ่ง เกิดจากการทับถมของทรายอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายจนพั่นระยะที่เรียกว่าดินพู (peat) และ Peat and muck, when properly drained, are good for vegetable production. (ดู peat)

mulch /มัลช്/ v คลุมดินด้วยวัสดุ เช่น ฟาง แกลบ เพื่อช่วยป้องกันวัชพืชและรักษาความชื้นในดิน
to mulch with straw n วัสดุที่ใช้คลุม mulches such as rice hull, saw dust,
bagasse **mulching** n การคลุมดินด้วยวัสดุ Mulching is helpful in reducing
evaporational loss from the soil.

multiple cropping /มัล-ที-เพล ครอป-พิง/ n การปลูกพืชแบบพืชแท่น ๆ ในรอบปีให้เก็บเกี่ยว
ได้สองรุ่นหรือมากกว่านี้ Multiple cropping is feasible in this area where
the ample rainfall is well distributed throughout the year.

(ดู cropping system)

mycoplasma /ไม-โค-พลาก-เมอะ/ n จุลินทรีย์ที่มีลักษณะก้าวกระโดดระหว่างบакเตเรียและไวรัส ส่วนมากเป็น^{ตัวเมี้ยนหรือปรสิต} A number of plant diseases formerly thought to be caused
by viruses are now known to be caused by mycoplasmas. (ดู virus)

native /內-ทีฟ/ adj ของถิ่น ของพื้นบ้าน Mangosteen, rambutan and durian are
native to Thailand. (ดู exotic)

nitrification /ไน-เกรอะ-ฟี-เค-เคน/ n กระบวนการตรึงไนโตรเจน การออกซิไดส์เกลือ
แอมโมเนียมเป็นไนโตรท์ และจากไนโตรท์เป็นไนโตรฟิโลแบคทีเรีย Nitrtfication in soil
is affected by nitrogen fixing bacteria.

node /โนด/ n ช้อ ตำแหน่งบนลำต้นหรือกิ่งที่ติดและใบล็อกกันแน่นมา For successful
propagation of roses, the cuttings should have at least three to four
nodes. **nodal** adj เกิดจากหรือเกี่ยวกับช้อ (ดู internode)

nodule /โนด-ยูล/ n ปม(บนรากของพืชตระกูลถั่วซึ่งแบคทีเรียที่สามารถสร้างไนโตรเจนจากอากาศอาศัยอยู่) In the tropics, legumes have the ability to produce nodules on more acid soils than in temperate zone. (ดู rhizobium)

non-climacteric /น่อน-คลิ-แมค-เทอ-ริค/ adj ซึ่งไม่เป็นไคลเมคเทอเริค คือไม่มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นมากในช่วงการสุกของผล Lime, lemon and orange are non-climacteric fruits. (ดู climacteric)

nonpathogenic /น่อน-เพอะ-ธอ-เจ-นิก/ adj ไม่ก่อให้เกิดโรค A single nonpathogenic virus may cause no symptom in a given clone, but will produce a severe reaction when present in combinations of two or three.

nonpathogenic disease n โรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อสาเหตุแต่อาจเกิดจากเหตุอื่น เช่น การขาดธาตุอาหาร ความผิดปกติทางพัณฑุกรรมหรือทางสรีรวิทยา (ดู pathogen)

nut /นัท/ n 1) ผลแห้งเปลือกแข็งภายในเมล็ดเดียวและผลไม้แตกร้าวออกเมื่อสัก เช่น ผลเกาลัด nuts of chestnut 2) ผล (ซึ่งไม่ใช่ nut ที่แห้งจริงในทางพฤกษศาสตร์) ที่เปลือกและเนื้อในแยกออกจากกันได้ เช่น ผล(เมล็ด)ถั่วลิสงและเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ground nut and cashew nut (ดูภาพประกอบใน dry fruit)

nutrient /นิว-เกรียน/ n สารอาหาร Fertilizers supply the neccessary nutrients to plants. (ดู macronutrient และ micronutrient)

oblanceolate /อับ-แลน-ชี-ເອଓ-ລେ-ଟ/ adj รูปใบอกกลับพิเศษ (ดูภาพประกอบใน leaf form)

oblong /อ้อบ-ล็อง/ adj รูปขอบผืน มีความยาวมากกว่าความกว้าง (ดูภาพประกอบใน leaf form)

ovovate /อ้อบ-ไอ-เวท/ adj รูปไข่กลับ (ส่วนกว้างที่สุดของใบอยู่ค่อนไปทางปลายใบ) (ดูภาพประกอบใน leaf form)

obtuse /อ้อบ-ทูซ/ adj ป้าน มัน (ดูภาพประกอบใน apex)

offset /อ้อฟ-เช็ก/ n หน่อ ส่วนของพืชที่แตกออกใกล้โคนต้นใช้ขยายพันธุ์ได้ Pineapple is propagated by offsets. (ดู sucker และ ratoon)

offspring /อ้อฟ-สปริง/ n ลูกหลาน (ดู progeny)

olericulture /โอล-ເອລະ-ເຮອະ-ຄັລ-ເຊອະ/ / n สาขาวิชาหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผัก

order /อ้อ-เดอ/ n อันดับ การจำแนกชั้นในทางพฤกษศาสตร์ในระดับที่ใหญ่กว่า วงศ์แต่รองลงมา จาก ชั้น (class) Legumes belong to order Rosales. (ดู family)

ornamental /ออ-เนอ-เม้น-เทิล/ adj ชั้งสวยงาม ชั้งใช้เพื่อการประดับประดา ornamental plants n ไม้ประดับ พืชที่ปลูกเพื่อความสวยงามของดอก ใน รุปทรง ฯลฯ African violet and begonia are among the most cultivated ornamentals.

ovary / อโ-เวอะ-รี / n รังไข่, ส่วนของเกสรตัวเมียซึ่งห่อหุ้มไข่อยู่ภายใน และจะพัฒนาเป็นผลต่อไป An ovary of mangosteen has 4-8 carpels. (ดู flower)

กานที่ 10

ovule / อโ-วูล / n ไข่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียที่อยู่ในรังไข่ เมื่อได้รับการถ่ายทอดของเกสรและเกิดการปฏิสนธิแล้วจะพัฒนาเป็นเมล็ดต่อไป Papaya ovary contains many ovules. (ดู ovary)