

รายงานการวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อความครอบคลุมของการสร้างเสวินภูมิคุ้มกันโภคยาดทะยักในหญิงตั้งครรภ์
กราฟิกษาจังหวัดสงขลา

Factors Affecting Tetanus Toxoid Coverage in Pregnancy :
Study in Songkla Province



วรรณ จันทร์สว่าง

เลขที่	46577/000 2534	- ๑๘. ๑
เลขทะเบียน	015997	
เดือน	๗	ปี
ปี	2533	

จังหวัดสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ชื่อโครงการ	ปัจจัยที่มีผลต่อความครอบคลุมของการสร้าง เสริมภูมิคุ้มกัน โรคบาดทะยักในหญิงตั้งครรภ์ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา Factors affecting Tetanus Toxoid Coverage in Pregnancy Study in Songkla Province
ผู้วิจัย	นางวรารัตน์ จันทร์ลว่าง
หน่วยงานที่สังกัด	คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 246874
ได้รับทุนคุณภาพนักการทำวิจัยประเภท	ทั่วไป ประจำปี 2533
จำนวนเงิน	38,827 บาท ระยะเวลาทำการวิจัย 1 ปี
ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2533 ถึง กุมภาพันธ์ 2534	

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
ที่มีผลต่อความครอบคลุมของการสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรคบาดทะยักในหญิงตั้งครรภ์ โดยได้
ทำการศึกษาในจังหวัดสงขลา หลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่調查ลักษณะความครอบคลุมการ
ได้รับภูมิคุ้มกันโรคสูงและต่ำ ได้คัดเลือกมา 14 ตำบล วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิง
สำรวจ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มมารดาที่มีบุตรระหว่าง 0-1 ปี และใช้แบบสอบถาม
กับกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ซึ่งผลการวิจัยมีดังนี้

กลุ่มมารดาที่มีบุตรระหว่าง 0-1 ปี พนักงานกลุ่มที่ได้รับการบริการครอบคลุมสูง
อายุ ศานนา ระดับการศึกษา และรายได้ มีผลต่อการได้รับวัคซีน ความรู้มีความ
สัมพันธ์กับการได้รับวัคซีนเฉพาะกลุ่มที่ได้รับบริการครอบคลุมสูง ความเชื่อไม่มีผลต่อ
การได้รับวัคซีนทั้งในกลุ่มที่ได้รับบริการสูงและต่ำ ตัวแบบบริการที่มีอยู่ และการเข้าถึง
บริการนั้น การฝากครรภ์ การได้รับคำแนะนำและข่าวสารมีผลต่อการได้รับวัคซีนเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
บริการครอบคลุมต่ำ

กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล พนบว่า มีความแตกต่างด้านอายุระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลุ่มที่ให้บริการครอบคลุมสูงและต่ำ ทั้งสองกลุ่มมีความรู้เกี่ยวกับโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคบาดทะยักในหญิงตั้งครรภ์อยู่ในระดับสูง มีทัศนคติต่องานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอยู่ในระดับต่ำและมีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในเรื่องการนัดหมายและติดตามหญิงตั้งครรภ์ให้มารับบริการ ส่วนการส่งเสริมการปฏิบัติงาน กลุ่มที่ให้บริการได้ครอบคลุมสูงได้รับการส่งเสริมมากกว่ากลุ่มที่ให้บริการครอบคลุมต่ำ

To study factors affecting tetanus toxoid coverage in Pregnancy, the study was carried out in Songkla province using statistics of high and low immunization coverage as the criteria in selected fourteen subdistricts. The method of study was a survey study by interview the group of mothers with children aged up to 0-1 year old and health care personals.

For The high service coverage group; age, religious, education, income and knowledge affect tetanus toxoid vaccination. Belief has no effect on vaccination for both groups. Both groups rely on antenatal care advice and information. Distance and fare have an effect on the low service coverage group.

Age of health care personals in the area of high and low service coverage are different. Both groups well recognize tetanus neonatorum and immunization in pregnant woman but have low attitude forward immunization. Their practice for appointment and follow up of immunization for pregnant woman are different. For support, the high service coverage group has delivered more than the low one.