

5. ผลการวิจัยและวิจารณ์

5.1 ระดับการทำลายมิ่งคุดของเพลี้ยไฟในภาคใต้

5.1.1 ระดับการทำลายของเพลี้ยไฟในมิ่งคุดจากตลาด

ผลประเมินการทำลายของเพลี้ยไฟพบว่า เปอร์เซนต์พื้นที่ผิวผลลายอยู่ในช่วง 18.7-54.2% (เฉลี่ย 33.9%) จำนวนผลยางไหลอยู่ในช่วง 30-49 ผล (เฉลี่ย 40.5 ผล) หรือประมาณ 80% ของจำนวนผลทั้งหมด และพบรอยขีดบนกลีบเลี้ยงทุกผล (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1. การทำลายของเพลี้ยไฟในมิ่งคุดจากตลาดในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และแผงจำหน่ายและรับซื้อมิ่งคุด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2548

วันที่เก็บตัวอย่าง	สถานที่เก็บตัวอย่าง	แหล่งที่มาของมิ่งคุด	#ผลที่สุ่ม	การทำลายของเพลี้ยไฟ		
				%พื้นที่ผิวผลลาย	#ผลยางไหล	#รอยขีดบนกลีบเลี้ยง
26/6/48	ตลาดนัดเกษตร มอ.	จ. ยะลา	50	32.7	45	50
29/6/48	ตลาดนัดเกษตร มอ.	อ. จะนะ จ. สงขลา	50	34.4	45	50
2/7/48	แผงมิ่งคุด ต. พรหมโลก	อ. พรหมคีรี จ. นครศรีฯ	50	31.5	35	50
2/7/48	แผงมิ่งคุด อ. พรหมคีรี	อ. พรหมคีรี จ. นครศรีฯ	50	36.1	38	50
2/7/48	แผงมิ่งคุด อ. ร่อนพิบูลย์	อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีฯ	50	44.8	41	50
16/7/48	แผงมิ่งคุด อ. จุฬารักษ์	อ. จุฬารักษ์ จ. นครศรีฯ	50	31.2	41	50
16/7/48	แผงมิ่งคุด อ. ร่อนพิบูลย์	อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีฯ	50	32.1	39	50
16/7/48	แผงมิ่งคุด อ. ลานสกา	อ. ลานสกา จ. นครศรีฯ	50	54.2	41	50
18/7/48	ตลาดนัดเกษตร มอ.	อ. ลานสกา จ. นครศรีฯ	50	32.5	41	50
18/7/48	ตลาดนัดเกษตร มอ.	อ. จะนะ จ. สงขลา	50	24.0	38	50
29/7/48	ตลาดคลองเรียน	จ. นครศรีฯ	50	37.2	38	50
29/7/48	แผงประตู 108	จ. นครศรีฯ	50	33.8	45	50
30/7/48	ตลาดนัดเกษตร มอ.	อ. จะนะ จ. สงขลา	50	25.2	42	50
30/7/48	แผงสามแยกสวนผัก อ. ร่อนพิบูลย์	อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีฯ	50	18.7	30	50
30/7/48	แผงมิ่งคุด อ. ร่อนพิบูลย์	อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีฯ	50	40.4	49	50
เฉลี่ย			50	33.9	40.5	50

เมื่อพิจารณาการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟของมิ่งคุดขนาดต่างๆ ตามเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร ช่วงต้นฤดูในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2548 กลางฤดูในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และปลายฤดูในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 พบว่า 3 ช่วงดังกล่าวที่มิ่งคุดออกสู่ท้องตลาดพบการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟไม่แตกต่างกันมากนัก โดยเปอร์เซนต์พื้นที่ผิวผลลายเฉลี่ยในมิ่งคุดทุกขนาดทั้ง 3 ช่วงอยู่ระหว่าง 31.0-35.9 (ตารางที่ 2) พบจำนวนผลที่มีรอยขีดบนกลีบเลี้ยงทุก

ผลหรือ 100% ทั้ง 3 ช่วงการเก็บเกี่ยว (ตารางที่ 3) และเปอร์เซ็นต์จำนวนผลยางไหลเฉลี่ยระหว่าง 80.0-81.6 (ตารางที่ 4) เมื่อพิจารณาขนาดของผลมังคุดต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟพบว่า ไม่มีผลต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ

ตารางที่ 2. เปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายของมังคุดจากตลาดในช่วงต้นฤดู กลางฤดู และปลายฤดูเก็บเกี่ยว

น้ำหนัก (g)	เปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลาย (Mean±SE) ^v		
	ต้นฤดู (26/06/48)	กลางฤดู (16/07/48)	ปลายฤดู (29/07/48)
>125	25.0±3.9 (n=4)	-	30.0 (n=1)
101-125	34.3±3.9 (n=23)	37.0±3.2 (n=5)	31.6±5.0 (n=12)
76-100	34.3±1.8 (n=83)	41.4±3.2 (n=58)	33.6±2.3 (n=68)
51-75	36.8±1.6 (n=124)	32.8±1.8 (n=154)	31.3±1.8 (n=133)
30-50	42.2±4.6 (n=16)	31.9±3.9 (n=33)	25.3±4.4 (n=36)
เฉลี่ย	35.9±1.1 (n=250)	34.8±1.4 (n=250)	31.0±1.3 (n=250)

ตารางที่ 3. จำนวนผลและเปอร์เซ็นต์จำนวนผลที่มีรอยขีดบนกลีบเลี้ยงของมังคุดจากตลาดในช่วงต้นฤดู กลางฤดู และปลายฤดูเก็บเกี่ยว

น้ำหนัก (g)	จำนวนผลที่มีรอยขีดบนกลีบเลี้ยง			% จำนวนผลที่มีรอยขีดบนกลีบเลี้ยง		
	ต้นฤดู (26/6/48)	กลางฤดู (16/7/48)	ปลายฤดู (29/7/48)	ต้นฤดู (26/6/48)	กลางฤดู (16/7/48)	ปลายฤดู (29/7/48)
>125	4 (n=4)	-	1 (n=1)	100	-	100
101-125	23 (n=23)	5 (n=5)	12 (n=12)	100	100	100
76-100	83 (n=83)	58 (n=58)	68 (n=68)	100	100	100
51-75	124 (n=124)	154 (n=154)	133 (n=133)	100	100	100
30-50	16 (n=16)	33 (n=33)	36 (n=36)	100	100	100
รวม	250 (n=250)	250 (n=250)	250 (n=250)			

ตารางที่ 4. จำนวนผลยางไหลของมังคุดจากตลาด ในช่วงต้นฤดู กลางฤดู และปลายฤดูเก็บเกี่ยว

น้ำหนัก (g)	จำนวนผลยางไหล			%จำนวนผลยางไหล		
	ต้นฤดู (26/6/48)	กลางฤดู (16/7/48)	ปลายฤดู (29/7/48)	ต้นฤดู (26/6/48)	กลางฤดู (16/7/48)	ปลายฤดู (29/7/48)
>125	4 (n=4)	-	1 (n=1)	100.0	-	100.0
101-125	20 (n=23)	3 (n=5)	11 (n=12)	86.9	60.0	91.7
76-100	70 (n=83)	54 (n=58)	56 (n=68)	84.3	93.1	82.3
51-75	98 (n=124)	118 (n=154)	110 (n=133)	79.0	76.6	82.7
30-50	12 (n=16)	25 (n=33)	26 (n=36)	75.0	75.7	72.2
รวม	204 (n=250)	200 (n=250)	204 (n=250)	เฉลี่ย 81.6	เฉลี่ย 80.0	เฉลี่ย 81.6

5.1.2 ระดับการทำลายของเพลี้ยไฟในมังคุดจากสวนเกษตรกร

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำลายของเพลี้ยไฟในมังคุดจากสวนเกษตรกรจำนวน 3 สวนที่อำเภอพรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช ในฤดูการเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 2-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 พบเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายอยู่ในช่วง 18.7-42.6% (เฉลี่ย 33.9%) จำนวนผลยางไหลอยู่ในช่วง 71-96 ผล (เฉลี่ย 84 ผล) หรือคิดเป็น 84% ของจำนวนผลทั้งหมด และพบรอยขีดบนกลีบเลี้ยงทุกผลที่สำรวจ (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5. การทำลายของเพลี้ยไฟในมังคุดจากสวนเกษตรกร อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราชระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548

วันที่เก็บ ตัวอย่าง	สถานที่เก็บตัวอย่าง	#ผลที่สุ่ม	ความเสียหายเฉลี่ย		
			%พื้นที่ผิว ผลลาย	#ผลยาง ไหล	#รอยขีดบน กลีบเลี้ยง
2/7/48	สวนที่ 1 ม. 5 ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี จ. นครศรีฯ	100	26.7	75	100
2/7/48	สวนที่ 2 ม. 3 ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี จ. นครศรีฯ	100	35.4	91	100
2/7/48	สวนที่ 3 ม. 4 ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี จ. นครศรีฯ	100	18.7	92	100
16/7/48	สวนที่ 1 ม. 5 ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี จ. นครศรีฯ	100	42.6	74	100
16/7/48	สวนที่ 2 ม. 3 ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี จ. นครศรีฯ	100	37.7	71	100
16/7/48	สวนที่ 3 ม. 4 ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี จ. นครศรีฯ	100	35.3	89	100
30/7/48	สวนที่ 2 ม. 3 ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี จ. นครศรีฯ	100	41.0	96	100
เฉลี่ย		100	33.9	84	100

เมื่อพิจารณานาขนาดของผลมังคุดและฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟในมังคุดจากสวนเกษตรกรให้ผลในทำนองเดียวกันกับมังคุดที่จำหน่ายในท้องตลาดกล่าวคือทั้ง 2 บัญชีดังกล่าวไม่มีผลต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ

จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผลผลิตมังคุดในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัด นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นแหล่งผลิตมังคุดมากที่สุดในภาคใต้ ยังไม่มีการจัดการเรื่องคุณภาพของผลมังคุด ที่เกิดจากการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟรวมทั้งขนาดของผลซึ่งมังคุดที่ผลิตได้ส่วนใหญ่มีน้ำหนักผลระหว่าง 51-75 กรัม ซึ่งขนาดมังคุดที่ส่งออกต้องมีน้ำหนักมากกว่า 70 กรัม (Department of Agriculture, 2003 cited by Sdoodee and Phonrong, 2006) ดังนั้นการพัฒนาการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออกจึงมีโอกาสสูงในอนาคต เนื่องจากมังคุดที่ได้คุณภาพทั้งผลขนาดใหญ่และปราศจากการทำลายของ เพลี้ยไฟมีราคาสูงกว่ามังคุดทั่วไป 3-4 เท่า



5.2 การเปลี่ยนแปลงประชากรเพลี้ยไฟในช่วงเวลาต่างๆ ในรอบปี

จากการสำรวจพบจำนวนเพลี้ยไฟตลอดทั้งปี แต่จำนวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย/กับดักเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 และถึงจุดสูงสุดในเดือนเมษายน 2548 ซึ่งมีจำนวนเพลี้ยไฟสูงสุดถึง 889.9 ตัว/กับดัก หลังจากนั้นจำนวนลดลง (ภาพที่ 9) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประชากรเพลี้ยไฟในรอบปี พบประชากรเพลี้ยไฟตลอดทั้งปีที่ทำการทดลอง จำนวนประชากรเพิ่มสูงสุดเพียง 1 ครั้งในรอบ 1 ปี (ภาพที่ 9) โดยประชากรเพลี้ยไฟเริ่มเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 จนกระทั่งสูงสุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ปริมาณจึงลดลง จนกระทั่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 พบประชากรเพียง 31.46 ตัว/กับดัก (ตารางภาคผนวกที่ 3) และในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรเพลี้ยไฟภายในสวนเพิ่มขึ้นและลดลงเล็กน้อย หลังจากนั้นจำนวนประชากรจะค่อยๆ ลดลง จนกระทั่งต่ำสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ซึ่งพบเพียง 4.01 ตัว/กับดัก (ตารางภาคผนวกที่ 3)

การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรเพลี้ยไฟในสวนมังคุดในรอบ 1 ปี มีความสัมพันธ์กับระยะ การพัฒนาของมังคุดโดยพบปริมาณเพลี้ยไฟเริ่มสูงขึ้นในระยะแตกใบอ่อน และเพิ่มขึ้นระดับสูงสุดเมื่อ มังคุดเข้าสู่ระยะออกดอกและติดผลอ่อน ซึ่งจากภาพที่ 9 พบว่ามังคุดเข้าสู่ระยะดอกตูมในช่วงประมาณ กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ระยะดอกบานในช่วงประมาณกลางเดือน มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ระยะติดผลอ่อนประมาณเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งช่วงดังกล่าวพบปริมาณเพลี้ยไฟสูง และเมื่อเข้าสู่ระยะผลแก่ถึงระยะเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือน มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ประชากรเพลี้ยไฟลดลง ในการศึกษาครั้งนี้พบมังคุดแตกใบ อ่อน 2 ช่วง คือช่วงแรกแตกใบอ่อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2548 และครั้งที่ 2 ประมาณเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548

เกรียงไกร และคณะ (2542) กล่าวว่าในสภาพความเป็นจริง มังคุดทุกต้นในสวนหนึ่งมีความ สมบูรณ์ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้มังคุดแต่ละต้นแตกใบอ่อนไม่พร้อมกัน บางต้นอาจแตก 2 ครั้ง ตรงกับ ระยะเวลาที่กล่าวมาข้างต้น แต่บางต้นอาจแตกใบอ่อนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป ซึ่งระยะการพัฒนาดัง กล่าวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรเพลี้ยไฟ โดยช่วงที่มังคุดเริ่มแตกใบอ่อนครั้งแรกในเดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2548 มีจำนวนประชากรเพลี้ยไฟอยู่ในสวน พบติดกับดักกวางเหนียวเฉลี่ย 7.80 ตัว/กับดัก (ตารางภาคผนวกที่ 3) ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ เกรียงไกร และคณะ (2544) กล่าวว่า

ทุกครั้งที่ในสวนมีต้นมังคุดแตกใบอ่อนจะเป็นตัวดึงดูดให้เพลี้ยไฟเข้าทำลายโดยเฉพาะเมื่อมังคุดมีการทยอยแตกใบอ่อนจะเกิดการระบาดของเพลี้ยไฟอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งอาจมีการระบาดถึงระยะที่มังคุดออกดอกและติดผลอ่อน ในทำนองเดียวกันกับเกรียงไกร และคณะ (2546) กล่าวว่า การแตกใบอ่อนของมังคุดทำให้ตัวเต็มวัยเคลื่อนย้ายเข้าแปลงและเพิ่มปริมาณขณะมังคุดมีการพัฒนาในระยะใบอ่อน และพบมังคุดแตกใบอ่อนสูงสุดก่อนพบปริมาณเพลี้ยไฟสูงสุดบนต้น อีกทั้งเพลี้ยไฟเป็นแมลงที่มีการแพร่ขยายพันธุ์โดยการวางไข่และฟักเป็นตัวอ่อน ระยะไข่ถึงตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 12-17 วัน (เกรียงไกร และคณะ, มมป.) การเพิ่มจำนวนประชากรของเพลี้ยไฟจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นภายในสวนมีระยะการพัฒนาของมังคุดในระยะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากระยะแตกใบอ่อน ระยะดอกตูม ระยะดอกบาน และเข้าสู่ระยะติดผลอ่อน ซึ่งระยะดังกล่าวเป็นระยะที่มีความสำคัญต่อเพลี้ยไฟเนื่องจากเป็นแหล่งอาหารอย่างดี สอดคล้องกับรายงานของพิสมัย (2531) พบว่าเพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากพืช โดยเฉพาะส่วนอ่อนหรือส่วนเจริญ เช่น ตา ใบอ่อน ดอก จึงทำให้การเพิ่มจำนวนประชากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสูงสุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 การพัฒนาของมังคุดภายในสวนเข้าสู่ระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว ส่งผลให้เพลี้ยไฟภายในสวนไม่มีอาหาร จำนวนเพลี้ยไฟจึงลดลง เมื่อมังคุดแตกยอดอ่อนรอบที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 (ภาพที่ 9) จึงมีการเพิ่มจำนวนประชากรเพลี้ยไฟขึ้นแต่ในปริมาณเล็กน้อย เนื่องจากต้นมังคุดภายในสวนที่แตกยอดอ่อนครั้งที่ 2 มีจำนวนวันต้นที่แตกใบอ่อนไม่มาก และไม่มีการพัฒนาต่อสู่ระยะอื่นๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ใบอ่อนดังกล่าวจึงการพัฒนาสู่ระยะใบแก่ทำให้เพลี้ยไฟภายในสวนไม่มีอาหารส่งผลให้จำนวนประชากรลดลงในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549



ภาพที่ 9. ความสัมพันธ์ของปริมาณเพลี้ยไฟกับอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และระยะการพัฒนามังคุด ในรอบ 1 ปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมกราคมพ.ศ. 2549 ที่สวนมังคุด เกษตรกร อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อพิจารณาผลของอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และความชื้นสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรเพลี้ยไฟพบว่า อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของเพลี้ยไฟ กล่าวคือ ปริมาณของเพลี้ยไฟที่ติดกับดักสูงสุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 นั้นเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด และปริมาณฝนต่ำสุดในรอบปี (ภาพที่ 9)

ผลการทดลองครั้งนี้สอดคล้องกับการรายงานของ Velayudhan *et al.* (1985), Varadharajan and Veeravel (1995), Gupta *et al.* (1997), Lingeri *et al.* (1998) อ้างโดย Venette and Davis (2004) กล่าวว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลต่อการเพิ่มจำนวนของประชากรเพลี้ยไฟในทางบวก และปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นมีผลต่อการเพิ่มจำนวนประชากรเพลี้ยไฟในทางลบ ในทำนอง


เดียวกัน Anonymous (2006) กล่าวว่า การแพร่กระจายและเพิ่มจำนวนของเพลี้ยไฟพริกจะลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนและจะเพิ่มจำนวนขึ้นในฤดูร้อน นอกจากนี้ ปิยรัตน์ และคณะ (2541) รายงานว่า อุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโตของเพลี้ยไฟ โดยเพลี้ยไฟจะมีวงจรชีวิตสั้นลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และความสามารถในการวางไข่ของเพศเมีย ที่อุณหภูมิ 30, 25 และ 20 องศาเซลเซียส พบเฉลี่ย 17, 17 และ 7 ฟอง/วัน ตามลำดับ ดังนั้นสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะในฤดูร้อนจึงเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการระบาดของเพลี้ยไฟ ทั้งนี้เนื่องจากเพลี้ยไฟมีวงจรชีวิตสั้นและอัตราในการรอดที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์

5.3 จำนวนและชนิดของเพลี้ยไฟที่เข้าทำลายมังคุด

จากการศึกษาการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟชนิดต่างๆ ในบริเวณใบอ่อน ดอกตูม ดอกบาน และผลอ่อนของมังคุดในสวนเกษตรกรอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 สวน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 โดยเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 สุ่มเฉพาะใบอ่อนจากสวนมังคุดอายุ 13 ปี พบเพลี้ยไฟจำนวน 20 ตัว และในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 สุ่มใบอ่อน ดอกตูม ดอกบาน และผลอ่อนของมังคุดอายุ 10 ปี จำนวน 3 สวน พบเพลี้ยไฟทุกระยะการพัฒนาของมังคุดจำนวนทั้งสิ้น 247 ตัว โดยพบที่ใบอ่อนรวมทั้งสิ้น 210 ตัว ดอกตูม 2 ตัว ดอกบาน 2 ตัว และผลอ่อน 33 ตัว (ตารางที่ 6) ภาพที่ 10 แสดงปริมาณเพลี้ยไฟที่พบในส่วนของใบอ่อน ดอกตูม ดอกบาน และผลอ่อนของมังคุดในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 พบว่า ปริมาณเพลี้ยไฟแตกต่างกันในแต่ละระยะการพัฒนาของมังคุด เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมังคุดภายในสวนมีการทยอยแตกยอดอ่อนโดยเริ่มแตกใบอ่อน 2-3 ต้น จนกระทั่งภายในสวนมีระยะใบอ่อนทั่วทั้งสวน ทำให้พบเพลี้ยไฟทุกครั้งที่สุ่มใบอ่อนและปริมาณเพลี้ยไฟในการสุ่มในแต่ละครั้งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุด 2 ช่วง คือ วันที่ 13 และ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 มีปริมาณถึง 35 และ 66 ตัว ตามลำดับ

ตารางที่ 6. จำนวนเพลี้ยไฟในส่วนต่างๆ ของมังคุดในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 และระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2549


ระยะการเจริญเติบโตของมังคุด	จำนวนเพลี้ยไฟ (ตัว)		รวม
	มี.ค. 48	พ.ค. -มิ.ย. 49	
ใบอ่อน	20	210	230
ดอกตูม		2	2
ดอกบาน		2	2
ผลอ่อน		33	33
รวม	20	247	267



ภาพที่ 10. จำนวนเพลี้ยไฟที่พบในส่วนต่างๆ ของมังคุดในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549

จำนวนชนิดของเพลี้ยไฟที่พบจากการศึกษาค้างนี้จำแนกได้ 2 อันดับย่อย คือ อันดับย่อย Terebrantia และ Tubulifera โดยดูจากลักษณะของปลายปล้องท้องปล้องที่ 10 ถ้ามีลักษณะเป็นรูปท่อ (tubular type) จัดอยู่ในอันดับย่อย Tubulifera แต่ถ้าปลายปล้องท้องปล้องที่ 10 มีลักษณะรูปถ้วย (conical type) จัดอยู่ในอันดับย่อย Terebrantia (ศิริณี, 2535) โดยพบเพลี้ยไฟในอันดับย่อย Tubulifera วงศ์ Phaeothripidae จำนวน 3 ชนิดซึ่งยังไม่สามารถจำแนกชนิดได้ คือ unknown 1 unknown 2 และ unknown 3 และพบเพลี้ยไฟในอันดับย่อย Terebrantia จำนวน 7 ชนิด จาก 2 วงศ์ คือ วงศ์ Merothripidae จำนวน 1 ชนิด คือ *Merothrips* sp. และวงศ์ Thripidae ซึ่งพบทั้งหมดจำนวน 6 ชนิด โดยจำแนกชนิดได้ 3 ชนิดซึ่งอยู่ในวงศ์ย่อย Thripinae ได้แก่เพลี้ยไฟชนิด *Ararothrips* sp. *Scirtothrips dorsalis* Hood และ *Scirtothrips oligocheatus* Karny ส่วนอีก 3 ชนิด ไม่สามารถจำแนกชนิดได้ คือ unknown 4 unknown 5 และ unknown 6 การจำแนกชนิดของเพลี้ยไฟที่พบแสดงในภาพที่ 11

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาณของเพลี้ยไฟชนิดต่างๆ พบว่าเพลี้ยไฟชนิด *S. dorsalis* เป็นชนิดที่สำคัญเนื่องจากพบทุกส่วนของมังคุดและพบในปริมาณมากที่สุด (ตารางที่ 7)



ภาพที่ 11 การจำแนกชนิดของเพลี้ยไฟที่พบในส่วนต่างๆ ของมังคุดจากสวนเกษตรกรอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางที่ 7. ปริมาณเพลี้ยไฟแต่ละชนิดที่พบในส่วนต่างๆ ของมังคุด ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 และระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2549

ชนิดเพลี้ยไฟ	ปริมาณเพลี้ยไฟ (มี.ค.-48)		ปริมาณเพลี้ยไฟในส่วนต่างๆ (พ.ค.-มิ.ย.-49)			
	ใบ		ใบ	ดอกตูม	ดอกบาน	ผลอ่อน
Suborder Tubulifera						
Family Phaeothripidae						
- unknown 1	-		1	-	-	-
- unknown 2	4		-	-	-	11
- unknown 3	-		-	-	-	2
Suborder Terebrantia						
Family Merothripidae						
	1		-	-	-	-
Family Thripidae						
-Subfamily Thripinae						
- <i>Ararothrips</i> sp.	1		-	-	-	-
- <i>Scirtothrips dorsalis</i>	-		160	2	2	12
- <i>Scirtothrips</i>						
<i>oligocheatus</i>	-		39	-	-	6
- unknown 4	-		-	-	-	2
- unknown 5	-		4	-	-	-
- unknown 6	15		6	-	-	-


รูปร่างลักษณะของเพลี้ยไฟที่สำรวจพบในครั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เพลี้ยไฟในอันดับย่อย Tubulifera วงศ์ Phaeothripidae


Unknown 1: เป็นเพลี้ยไฟขนาดใหญ่ที่สุดที่สำรวจพบ ลำตัวสีน้ำตาลเข้ม (ภาพที่ 12A) หนวดมี 8 ปล้อง หนวดปล้องที่ 3 มีลักษณะเด่น คือ มีขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายแก้วไวน์ (ภาพที่ 12B) ปล้องท้องเรียวยาว ปลายสุดของส่วนท้องมีลักษณะเป็นท่อ (tube) (ภาพที่ 12C)

Unknown 2: เป็นเพลี้ยไฟขนาดกลาง ลำตัวเรียวยาว ส่วนท้องสีน้ำตาลเข้ม ส่วนหัว ออก และขา สีดำ (ภาพที่ 13A) หนวดมี 8 ปล้อง ลักษณะเรียวยาว (ภาพที่ 13B) ปล้องท้องเรียวยาว ท้องปล้องที่ 10 มีลักษณะเป็นท่อ (tube) เรียวยาว (ภาพที่ 13C)


Unknown 3: เป็นเพลี้ยไฟขนาดกลาง ลำตัวอ้วนป้อม สีน้ำตาลเข้ม (ภาพที่ 14A) หนวดมี 8 ปล้อง ลักษณะเรียวยาว ปล้องท้องมีลักษณะโค้งมน ท้องปล้องที่ 10 มีลักษณะเป็นท่อเรียวยาว (ภาพที่ 14B)



ภาพที่ 12. เพลี้ยไฟ Unknown 1 ลำตัวสีน้ำตาล (A) หนวดขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายแก้วไวน์ (B) และปลายสุดของส่วนท้องมีลักษณะเป็นท่อ (C)




ภาพที่ 13. เพลี้ยไฟ Unknown 2 ลำตัวเขียวยาวสีน้ำตาล (A) หนวด 8 ปล้องเขียวยาว (B) และปลายสุดของส่วนท้องมีลักษณะเป็นท่อเขียวยาว (C)



ภาพที่ 14. เพลี้ยไฟ Unknown 3 ลำตัวอ้วนป้อม สีน้ำตาลเข้ม (A) ท่อนปล้องที่ 10 มีลักษณะเป็นท่อเรียวยาว (B)

2. เพลี้ยไฟในอันดับย่อย Terebrantia

เพลี้ยไฟในอันดับย่อย Terebrantia ปลายปล้องท่อนปล้องที่ 10 มีลักษณะรูปถ้วย (conical type) (ศิริณี, 2535) อวัยวะวางไข่เพศเมียมีลักษณะคล้ายฟันเลื่อย การเรียงตัวของขนบนปีกคู่หน้าทำให้เกิดเส้นปีกที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดของเพลี้ยไฟ ศิริณี (2544) กล่าวว่า เพลี้ยไฟในอันดับย่อย Terebrantia แบ่งออกเป็น 7 วงศ์ คือ วงศ์ Merothripidae Uzelothripidae Fauriellidae Adiheterothripidae Heterothripidae Aeolothripidae และ Thripidae จากการศึกษาในครั้งนี้พบเพลี้ยไฟในอันดับย่อย ดังกล่าว 7 ชนิด จาก 2 วงศ์ ประกอบด้วยวงศ์ Merothripidae และ Thripidae ในวงศ์ Merothripidae พบจำนวนเพียง 1 ชนิดเท่านั้น คือ เพลี้ยไฟ *Merothrips* sp. ซึ่งมีขนาดเล็ก ลำตัวเปราะบาง มีสีเหลืองอ่อน (ภาพที่ 15A) ลักษณะเด่น คือ มีหนวด 8 ปล้อง ปล้องสุดท้ายมีรูปร่างคล้ายกระสวยยื่นตาย ห้วมีขนาดเล็ก (ภาพที่ 15B) แต่อกปล้องแรกมีขนาดใหญ่และรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู อวัยวะวางไข่ไม่ค่อยพัฒนา (ภาพที่ 15C) มีชื่อเรียกทั่วไปว่า เพลี้ยไฟกินเชื้อรา เพลี้ยไฟชนิดนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเพลี้ยไฟที่พบคือ *Merothrips floridensis* (ศิริณี, 2544)




ภาพที่ 15. เพลี้ยไฟ *Merothrips* sp. ลำตัวเล็กมีสีเหลืองอ่อน (A) ปล้องสุดท้ายมีรูปร่างคล้ายกระสวยบิน
 ด้าย (B) อวัยวะวางไข่ไม่ค่อพัฒนา (C)

ส่วนวงศ์ Thripidae ศิริณี (2544) กล่าวว่าเพลี้ยไฟดังกล่าวทั่วโลกมีประมาณ 260 สกุล 1,700 ชนิด พบได้ในยอดอ่อน ใบอ่อน ตาดอก ผลอ่อน ฯลฯ ทั้งในไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ตลอดจนพืชไร่ ชนิดอื่นๆ มีบางชนิดเป็นตัวทำ ประกอบด้วย 2 วงศ์ย่อย ที่รู้จักกันดี คือ วงศ์ย่อย Panchaethripinae ซึ่งหัว ออกปล้องแรก และขา มีลวดลายคล้ายรอยแกะสลักเป็นร่างแห ส่วนวงศ์ย่อย Thripinae ไม่มีลักษณะดังกล่าวนอกจากนี้ Calder (2001b) กล่าวว่าเพลี้ยไฟในวงศ์ Thripidae เป็นเพลี้ยไฟที่มีจำนวนปล้องหนวด อยู่ระหว่าง 7-8 ปล้อง ปีกคู่หน้าเรียวยาว อวัยวะวางไข่โค้งออกจากท้อง (curved downward) จากการศึกษาค้นคว้าพบเพลี้ยไฟวงศ์ Thripidae ทั้งหมด 6 ชนิด คือ Unknown 4 Unknown 5 Unknown 6 *Ararothrips* sp. *Scirtothrips dorsalis* Hood และ *Scirtothrips oligocheatus* Karny แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


Unknown 4: เป็นเพลี้ยไฟขนาดกลาง มีสีดำเข้มทั้งตัว ลำตัวอ้วนป้อม บริเวณหัว ออก ปล้องท้อง และขา มีลักษณะลวดลายเป็นร่างแหเล็กๆ ต่อกัน (ภาพที่ 16A) อวัยวะวางไข่พัฒนาดี และโค้งออกจากท้อง (ภาพที่ 16B) มีหนวดทั้งหมด 7 ปล้อง หนวดปล้องสุดท้ายมีลักษณะเรียวยาวแหลม (ภาพที่ 16C)

Unknown 5: เป็นเพลี้ยไฟขนาดกลาง มีสีน้ำตาลเข้มทั้งตัว (ภาพที่ 17A) อวัยวะวางไข่พัฒนาดี บริเวณขอบปล้องท้องแต่ละปล้องด้านล่างปรากฏเส้นขนยาว (ภาพที่ 17B) มีหนวดเรียวยาวจำนวน 8 ปล้อง ปล้องสุดท้ายมีขนาดเล็กมาก (ภาพที่ 17C)


Unknown 6: เป็นเพลี้ยไฟที่มีขนาดกลาง ลำตัวมีสีน้ำตาลเข้ม ส่วนหัวมีสีน้ำตาลอ่อน (ภาพที่ 18A) มีหนวดเรียวยาวจำนวน 7 ปล้อง (ภาพที่ 18B) ปล้องท้องด้านล่างปรากฏเส้นขนยาวบริเวณกึ่งกลางและบริเวณขอบปล้องแต่ละปล้อง (ภาพที่ 18C)



ภาพที่ 16. เพลี้ยไฟ Unknown 4 ลำตัวสีดำอ้วนป้อม (A) อวัยวะวางไข่พัฒนาดีและโค้งออกจากท้อง (B) หนวดปล้องสุดท้ายมีลักษณะเรียวยาวแหลม (C)




ภาพที่ 17. เพลี้ยไฟ Unknown 5 มีสีน้ำตาลเข้มทั้งตัว (A) ขอบปล้องท้องแต่ละปล้องด้านล่างปรากฏเส้นขนยาว (B) มีหนวดเรียวยาว 8 ปล้อง ปล้องสุดท้ายมีขนาดเล็กมาก (C)



ภาพที่ 18. เพลี้ยไฟ Unknown 6 ลำตัวสีน้ำตาลเข้ม หัวมีสีน้ำตาลอ่อน (A) หนวดเรียวยาวจำนวน 7 ปล้อง (B) กิ่งกลางและบริเวณขอบปล้องท้องแต่ละปล้องด้านล่างปรากฏเส้นขนยาว (C)

ส่วนเพลี้ยไฟอีก 3 ชนิดที่จำแนกชนิดได้แล้ว คือ *Ararothrips* sp. *Scirtothrips dorsalis* Hood และ *Scirtothrips oligocheatus* Karny จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Thripinae คิริณี (2544) รายงานว่าเพลี้ยไฟในวงศ์ย่อยดังกล่าวมีจำนวนชนิดมากประมาณ 1,500 ชนิดทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วยเพลี้ยไฟศัตรูพืชที่สำคัญ และก่อให้เกิดปัญหาแก่พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับอย่างมาก มีบางชนิดพบเป็นตัวห้ำที่มีประสิทธิภาพ และเพลี้ยไฟชนิดนี้ยังพบในส่วนของดอก บางชนิดอาศัยที่หญ้า แต่พบเพลี้ยไฟจำนวนมากที่บริเวณ ใบอ่อน และตาดอก (Calder, 2001 b) เพลี้ยไฟทั้ง 3 ชนิดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


เพลี้ยไฟ *Ararothrips* sp.: เป็นเพลี้ยไฟขนาดกลาง หัวมีสีดำ อกและปล้องท้องมีสีน้ำตาลเข้ม (ภาพที่ 19A) หัวขนาดเล็กและแหลม femur ของขาคู่หน้าขยายใหญ่ ออกปล้องที่ 1 เป็นรูปสามเหลี่ยม หนวดสั้นป้อมจำนวน 8 ปล้อง หนวดแต่ละปล้องค่อนข้างกลม (ภาพที่ 19B) ปล้องท้องเรียวยาวแหลม อวัยวะวางไข่ขนาดเล็ก (ภาพที่ 19C)



ภาพที่ 19. เพลี้ยไฟ *Ararothrips* sp. หัวมีสีดำ ออกและปล้องท้องมีสีน้ำตาลเข้ม (A) หนวดสั้นป้อมแต่ละปล้องค่อนข้างกลม (B) ปล้องท้องเรียวยแหลม อวัยวะวางไข่ขนาดเล็ก (C)


เพลี้ยไฟ *Scirtothrips dorsalis* Hood: จากรายงานของ Skarlinsky (2004) พบว่าเพลี้ยไฟชนิดนี้มีขนาดเล็ก บริเวณท้องจะพบกลุ่มขน (microtrichia) มากมาย พบรอยปื้นดำบริเวณด้านข้างและด้านบนของปล้องท้อง ปีกคู่หน้ามีลักษณะขอบบางมีขน 2 แถว ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริณี (2544) กล่าวว่า เพลี้ยไฟชนิดนี้เป็นเพลี้ยไฟขนาดเล็ก สีเหลืองอ่อน ท้องปล้องที่ 2-7 ด้านบนมีรอยปื้นเทาดำ และได้รอยปื้นมีรอยขีดสีดำ ส่วนท้องด้านล่างในเพศเมียมีรอยขีดสีดำเท่านั้น แต่ในเพศผู้ไม่ปรากฏรอยปื้นและรอยขีดดังกล่าว ด้านข้างของปล้องท้องด้านบนมีขน 3 เส้น ปรากฏบนกลุ่มขนที่หนาแน่น เพลี้ยไฟชนิดนี้มีชื่อเรียกทั่วไปว่า เพลี้ยไฟพริก หรือ เพลี้ยไฟชาสีเหลือง พบเข้าทำลายพืชเกือบทุกชนิด โดยเข้าทำลายบริเวณส่วนอ่อนๆ ของพืช เช่น ยอดอ่อน ใบอ่อน ตุ่มตาใบและตุ่มตาดอก ตลอดจนผลอ่อน ดังนั้นจึงพบการแพร่กระจายของเพลี้ยไฟชนิดนี้ได้ทั่วประเทศไทย

จากการศึกษาในครั้งนี้พบเพลี้ยไฟชนิดนี้ปริมาณมากที่สุดทั้งเพศเมีย (ภาพที่ 20A) และเพศผู้ (ภาพที่ 20B) โดยสังเกตจากบริเวณส่วนปลายของปล้องท้อง เพศเมียมีลักษณะคล้ายฟันเลื่อยโค้งออกจากส่วนท้อง (ภาพที่ 20C) ส่วนเพศผู้นอกจากจะมีขนาดเล็กแล้วปล้องท้องเรียวยแหลม บริเวณปลายท้องพบอวัยวะ (testis) ลักษณะเหมือนใบพาย (ภาพที่ 20D)



ภาพที่ 20. เพลี้ยไฟ *Scirtothrips dorsalis* Hood เพศเมีย (A) เพศผู้ (B) เพศเมียมีลักษณะส่วนปลายของปล้องท้องคล้ายฟันเลื่อยโค้งออกจากส่วนท้อง (C) อวัยวะลักษณะเหมือนใบพาย (D)

เพลี้ยไฟ *S. oligocheatus* Karny จากการศึกษาคู่เพลี้ยไฟชนิดนี้พบว่า มีลักษณะคล้ายกับเพลี้ยไฟฟริก (*S. dorsalis* Hood) มากทั้งขนาดรูปร่างและสี (ภาพที่ 21A) ต่างกันตรงจำนวนขนบนกลุ่มขน (microtrichia) ที่ด้านข้างปล้องท้องด้านบนที่มีจำนวน 4 เส้น (ภาพที่ 21B) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของศิริณี (2544) กล่าวว่า เพลี้ยไฟ *S. oligocheatus* เป็นเพลี้ยไฟที่มีขนาดตัวและรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับ *S. dorsalis* Hood มากแตกต่างกันตรงไม่มีรอยปื้นและรอยขีดสีดำบริเวณด้านบนและด้านล่างของปล้องท้อง และส่วนด้านข้างของปล้องท้องด้านบนมีขน 4 เส้น ปรากฏอยู่บนกลุ่มขนหนาแน่น เพลี้ยไฟชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า เพลี้ยไฟมั่งคุด



ภาพที่ 21. เพลี้ยไฟ *Scirtothrips oligochaetus* Karny ตัวเต็มวัยเพศเมีย (A) ชนิดด้านข้างปล้องท้อง ด้านบนจำนวน 4 เส้น (ครีซี B)

จำนวนชนิดของเพลี้ยไฟที่เข้าทำลายมังคุดในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวนมากถึง 10 ชนิด ซึ่งมากกว่ารายงานของศิริณี (2535) ที่พบเพลี้ยไฟในมังคุดเพียง 2 ชนิด คือ *Scirtothrips dorsalis* Hood และ *S. oligochaetus* Karny และจากผลการศึกษานี้ให้เห็นว่าแนวทางในการจัดการให้ได้ผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพปราศจากการทำลายของเพลี้ยไฟ จำเป็นต้องหามาตรการควบคุมประชากรตั้งแต่ระยะแตกยอดอ่อน

5.4 อิทธิพลของร่มเงาต่อการระบาดของเพลี้ยไฟในมังคุด

จากการศึกษาการระบาดของเพลี้ยไฟในมังคุดที่ปลูกที่แจ้งและที่ร่ม พบว่าปริมาณของเพลี้ยไฟในมังคุดที่แจ้งสูงกว่ามังคุดที่ร่มที่ปลูกแซมกับพืชอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะผลอ่อนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 พบปริมาณเพลี้ยไฟสูงสุด ปริมาณเพลี้ยไฟเฉลี่ย/กับดักในมังคุดที่แจ้งสูงกว่ามังคุดที่ร่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.01$) ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ปริมาณเพลี้ยไฟในมังคุดที่แจ้งเฉลี่ยเท่ากับ $1,437.7 \pm 139.2$ และ 331.5 ± 35.4 ตัว/กับดัก ตามลำดับ ในขณะที่มังคุดที่ร่มพบปริมาณเพลี้ยไฟเฉลี่ยเท่ากับ 342.1 ± 54.9 และ 176.8 ± 32.2 ตัว/กับดัก ตามลำดับ (ตารางที่ 8) หลังจากนั้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 เมื่อผลมีขนาดโตขึ้นปริมาณเพลี้ยไฟเริ่มลดลง แต่ยังพบปริมาณเพลี้ยไฟในมังคุดที่แจ้งมากกว่ามังคุดที่ร่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) แต่เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ทั้งมังคุดที่แจ้งและที่ร่มเข้าสู่ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรกำจัดวัชพืชบริเวณที่แจ้งโดยฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชและดายหญ้าบริเวณรอบโคนต้น จึงส่งผลให้ประชากรเพลี้ยไฟในมังคุดที่แจ้งมีปริมาณน้อยกว่ามังคุดที่ร่มในเดือนสิงหาคมและกันยายน พบปริมาณเพลี้ยไฟเฉลี่ย/กับดักในมังคุดที่แจ้งสูงกว่าในมังคุดที่ร่มอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ($P < 0.01$) การแตกยอดอ่อนของมังคุดรอบที่ 2 เริ่มแตกยอดอ่อนในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 (ภาพที่ 9) โดยจะเริ่มแตกยอดอ่อนในที่ร่มก่อนที่แจ้ง จึงทำให้ปริมาณเพลี้ยไฟในมังคุดที่ร่มมากกว่ามังคุดที่แจ้ง แต่ไม่แตกต่างทางสถิติในเดือนตุลาคม แต่เมื่อแตกใบอ่อนทั้งใน

ที่แจ้งและที่ร่ม พบปริมาณเปลี้ยไฟในมังคุดที่แจ้งสูงกว่ามังคุดที่ร่มอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ($P < 0.01$) เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 มีฝนตกหนักเกือบทั้งเดือน และเกิดน้ำท่วมในสวนที่ทำการศึกษา ปริมาณเปลี้ยไฟที่พบเฉลี่ย/กับดักทั้งในที่แจ้งและในที่ร่มมีปริมาณน้อยที่สุดคือ 4.9 ± 0.5 และ 3.1 ± 0.4 ตัว/กับดักตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนอื่นๆ และปริมาณเปลี้ยไฟในที่แจ้งและในที่ร่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณเปลี้ยไฟตลอดระยะเวลาการทดลองพบว่าในมังคุดที่แจ้งพบปริมาณเปลี้ยไฟเฉลี่ย 223.5 ± 23.4 ตัว/กับดัก แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.01$) กับปริมาณเปลี้ยไฟในมังคุดที่ร่มซึ่งพบปริมาณเฉลี่ยเพียง 69.1 ± 8.3 ตัว/กับดัก (ตารางที่ 8)

จากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าระบบนิเวศในการปลูกมังคุดที่แตกต่างกัน 2 ระบบดังกล่าวส่งผลต่อการระบาดของเปลี้ยไฟที่ต่างกัน โดยในที่แจ้งพบปริมาณเปลี้ยไฟสูงกว่าในที่ร่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแตกใบอ่อนจนถึงผลอ่อนซึ่งเป็นระยะที่พบปริมาณเปลี้ยไฟสูงสุด ปัจจัยที่ต่างกันชัดเจนระหว่าง 2 ระบบการปลูกดังกล่าว คือ ความเข้มแสงโดยตลอดระยะเวลาทำการทดลอง ความเข้มแสงบริเวณที่แขวนกับดักกาวเหนียวในมังคุดที่แจ้งสูงกว่าในมังคุดที่ร่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$, $P < 0.01$) (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 8. ปริมาณพลัไฟฟ้าในมุ้งคูดที่แจ้งและที่ร่ม ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ที่ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เงื่อนไขการปลูก	จำนวนพลัไฟฟ้า ตัว/กบดัก (Mean±SE ^{1/2})										ค่าเฉลี่ยทั้งหมด (Mean±SE ^{2/})
	เม.ย. 48	พ.ค. 48	มิ.ย. 48	ก.ค. 48	ส.ค. 48	ก.ย. 48	ต.ค. 48	พ.ย. 48	ธ.ค. 48	ม.ค. 49	
บริเวณที่แจ้ง	1437.7	331.5	39.1	49.6	88.6	61.7	41.9	38.42	10.4	4.9	223.5
	±139.2	±35.4	±3.8	±6.0	±21.1	±120.3	±5.7	±7.2	±2.8	±0.5	±23.4
บริเวณที่ร่ม	342.1	176.8	23.8	73.6	17.0	14.8	98.7	3.2	9.9	3.1	69.1
	±54.9	±32.2	±3.8	±20.5	±2.6	±2.7	±47.6	±0.5	±5.2	±0.4	±8.3
T-test	6.94**	3.35**	2.5*	ns	3.40**	3.77**	ns	4.94**	ns	2.79**	6.94**

^{1/} ค่าเฉลี่ยจาก 40 ซ้ำ, ^{2/} ค่าเฉลี่ยจาก 400 ซ้ำ, ** แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 99%, * แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 95%, ns = ไม่แตกต่างทางสถิติ

ตารางที่ 9. ความเข้มแสงในมุ้งคูดที่แจ้งและที่ร่ม ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ถึงมกราคม พ.ศ. 2549 ที่ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เงื่อนไขการปลูก	ความเข้มแสง (LUX 200,000) (Mean±SE ^{1/2})										ค่าเฉลี่ยทั้งหมด (Mean±SE ^{2/})
	เม.ย. 48	พ.ค. 48	มิ.ย. 48	ก.ค. 48	ส.ค. 48	ก.ย. 48	ต.ค. 48	พ.ย. 48	ธ.ค. 48	ม.ค. 49	
บริเวณที่แจ้ง	839.9	732.9	359.7	430.0	733.0	845.8	1134.9	244.9	430.2	496.8	615.5
	±94.8	±27.6	±76.7	±75.7	±95.8	±39.1	±55.4	±37.6	±85.7	±71.6	±33.3
บริเวณที่ร่ม	42.7	41.1	35.9	61.4	48.7	43.4	98.5	70.7	73.4	29.2	54.8
	±8.3	±6.2	±5.9	±5.7	±10.2	±9.4	±17.9	±17.7	±11.5	±4.8	±3.7
T-test	7.90**	22.52**	4.34*	4.74**	7.18**	19.52**	25.45**	4.16*	4.39*	6.49**	17.03**

^{1/} ค่าเฉลี่ยจาก 10 ซ้ำ, ^{2/} ค่าเฉลี่ยจาก 100 ซ้ำ, ** แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 99%, * แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 95%

พืชที่ปลูกในที่ร่มอาจจะส่งผลต่อศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม พืชในที่ร่มสามารถป้องกันแสงแดดส่องถึงทรงพุ่มของพืช ส่งผลให้อุณหภูมิภายในต้นพืชต่ำลง แต่ความชื้นสูงชื้นทำให้แมลงที่หากินกลางวันส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอ่อนของแมลงที่ไม่ทนต่อแสงแดดชอบหลบซ่อนกินอาหารในที่ร่ม เช่น เพลี้ยอ่อนหลายชนิดชอบที่ร่มแต่อากาศร้อน (Anonymous, 1999) นอกจากนี้ Villanueva and Childers (2000) พบว่าในที่ร่มที่ระดับความเข้มแสง 494 lumens พบปริมาณไร้ศัตรูส้ม *Panonychus citri* (McGregor) และ *Eutetranychus banksi* (McGregor) มากกว่าในที่แจ้งที่ระดับความเข้มแสง 903 lumens ถึง 3.2 เท่าตัว อย่างไรก็ตาม มีแมลงบางชนิดที่พบปริมาณในที่แจ้งมากกว่าในที่ร่มเช่นเดียวกับผลการทดลองของเพลี้ยไฟในมังคุด เช่น ปริมาณของด้วงปีกแข็งบนต้นถั่วที่ปลูกร่วมกับข้าวโพดมีน้อยกว่าที่ปลูกถั่วเพียงชนิดเดียว (Risch, 1981 อ้างโดย Anonymous, 1999) นอกจากนี้การปลูกพืชได้ร่มพืชชนิดอื่นอาจส่งผลต่อการค้นหาพืชอาหารของแมลงศัตรูพืชได้ยากกว่าพืชที่ปลูกเดี่ยวๆ (Risch 1981; Yang et al. 1988 อ้างโดย Anonymous, 1999) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่น เช่น อุณหภูมิและความชื้นมีผลต่อการเพิ่มหรือลดประชากรของเพลี้ยไฟ Aslam et al. (2001) พบว่าเพลี้ยไฟ *Rhipiphorothrips cruentatus* Hood ที่เข้าทำลายกุหลาบจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลงแต่ความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิส่งผลให้ประชากรของเพลี้ยไฟ - *Thrips palmi* เพิ่มขึ้น (Murai, n.d.) ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับการทดลองครั้งนี้ที่พบปริมาณเพลี้ยไฟในมังคุดที่แจ้งมากกว่ามังคุดที่ร่ม

จากผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 8 ทั้งในที่ร่มและที่แจ้งพบปริมาณเพลี้ยไฟในช่วงเริ่มต้นการทดลองสูงมาก หลังจากนั้นประชากรลดลง สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากระยะเวลาเจริญเติบโตของพืชมีผลต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ ในช่วงดังกล่าวเป็นระยะผลอ่อนซึ่งเพลี้ยไฟชอบเข้าทำลายมากกว่าในระยะผลแก่ซึ่งมีผิวผลแข็งกว่า นอกจากนี้เกรียงไกร และคณะ (2544) พบว่า เพลี้ยไฟเริ่มเคลื่อนย้ายเข้าแปลงมังคุดในระยะแตกใบอ่อนและพบปริมาณสูงสุดหลังจากแตกใบอ่อน 1-2 สัปดาห์ และยังคงเข้าทำลายในระยะดอกและผลอ่อน ในทำนองเดียวกัน McLaren and Fraser (2000) พบว่า เพลี้ยไฟ *Thrips obscuratus* (Crawford) จะเข้าทำลายดอกและผลอ่อนของต้นเนคทารีน และปริมาณเพลี้ยไฟจะลดลงในระยะกลีบดอกร่วง

5.5 การแพร่กระจายของเพลี้ยไฟในทรงพุ่มมังคุด

จากการศึกษาการแพร่กระจายของเพลี้ยไฟโดยประเมินเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายและผลยางไหลอันเนื่องมาจากการทำลายของเพลี้ยไฟในมังคุดที่แจ้งและที่ร่ม พบมังคุดผิวลายและมังคุดยางไหลในที่แจ้งมากกว่าในที่ร่ม (ตารางที่ 10) ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณของเพลี้ยไฟที่ติดกับดัก (ตารางที่ 8) เปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายของมังคุดที่ปลูกในที่แจ้งสูงกว่าที่ปลูกในที่ร่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.01$) ตลอดระยะเวลาทดลองพบมังคุดที่แจ้งมีเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายเฉลี่ยเท่ากับ 32.2% ในขณะที่มังคุดที่ร่มพบเปอร์เซ็นต์มังคุดผิวลายเฉลี่ย 19.8% (ตารางที่ 10) อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์จำนวนผลมังคุดยางไหลเฉลี่ยตลอดการทดลองไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างมังคุดที่แจ้ง

และมังคุดที่ร้อน แต่พบเปอร์เซ็นต์จำนวนผลมังคุดยางไหลเฉลี่ย 67.8% ในที่แจ้งซึ่งสูงกว่าในที่ร้อนซึ่งมีค่าเฉลี่ย 63.3% (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 10. เปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายและผลยางไหลเนื่องจากเปลือกไฟ ในมังคุดที่แจ้งและมังคุดที่ร้อนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ที่อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระบบการปลูก	การทำลายของเปลือกไฟ (Means±SE) ¹							
	% พื้นที่ผิวผลลาย				% จำนวนผลยางไหล			
	21/5/48	4/6/48	18/6/48	เฉลี่ย ²	21/5/48	4/6/48	18/6/48	เฉลี่ย ²
ที่แจ้ง	35.1±2.0	25.4±1.7	36.0±2.1	32.2±1.2	70.5±3.2	66.0±3.3	67.0±6.2	67.8±2.6
ที่ร้อน	16.2±1.5	18.3±1.6	24.8±1.8	19.8±1.0	61.0±3.4	53.0±3.5	76.0±3.0	63.3±1.9
T-test	7.3**	3.0**	4.1**	8.1**	2.1*	2.6*	ns	ns

¹ เฉลี่ยจาก 200 ผล, ² เฉลี่ยจาก 600 ผล, *แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 95%,

**แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 99%, ns = ไม่แตกต่างทางสถิติ

เมื่อพิจารณาผลมังคุดที่อยู่ด้านบนและด้านล่างทรงพุ่มพบว่า ผลมังคุดที่อยู่ด้านบนถูกทำลายโดยเปลือกไฟมากกว่าผลมังคุดที่อยู่ด้านล่างของทรงพุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05, 0.01$) ทั้งในที่แจ้งและในที่ร้อน ผลมังคุดที่อยู่ทางด้านบนของทรงพุ่มมีเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายเฉลี่ยระหว่าง 30.3-46.6% และ 17.8-33.4% ขณะที่ผลมังคุดที่อยู่ด้านล่างของทรงพุ่มมีค่าดังกล่าวเฉลี่ยระหว่าง 20.4-31.5% และ 14.5-16.1% ในมังคุดที่แจ้งและที่ร้อน ตามลำดับ (ตารางที่ 11) เมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายตลอดระยะเวลาทดลองทั้งในที่ร้อนและที่แจ้งระหว่างด้านบนและด้านล่างของทรงพุ่มพบว่า เปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายของมังคุดที่อยู่ด้านบนสูงกว่าด้านล่างทรงพุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.01$) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.5% และ 20.4% ในผลมังคุดที่อยู่ด้านบนและด้านล่างของทรงพุ่ม ตามลำดับ (ตารางที่ 11)

ในทำนองเดียวกันมังคุดยางไหลเกิดขึ้นในมังคุดที่อยู่ทางด้านบนมากกว่าด้านล่างของทรงพุ่ม ผลมังคุดที่อยู่ทางด้านบนของทรงพุ่มมีเปอร์เซ็นต์จำนวนผลยางไหลเฉลี่ยระหว่าง 67.0-85.0% และ 68.0-78.0% ในมังคุดที่แจ้งและที่ร้อน ตามลำดับ ขณะที่ผลมังคุดที่อยู่ทางด้านล่างของทรงพุ่มมีค่าดังกล่าวเฉลี่ยระหว่าง 49.0-68.0% และ 33.0-74.0% ตามลำดับ (ตารางที่ 12) เมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์จำนวนผลยางไหลตลอดระยะเวลาทดลองทั้งในที่แจ้งและที่ร้อนระหว่างด้านบนและด้านล่างของทรงพุ่มพบว่า เปอร์เซ็นต์จำนวนผลยางไหลที่อยู่ด้านบนสูงกว่าด้านล่างของทรงพุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.01$) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 74.0% และ 57.2% ในผลมังคุดที่อยู่ด้านบนและด้านล่างของทรงพุ่ม ตามลำดับ (ตารางที่ 12)

ตารางที่ 11. เปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายและผลยางไหลของผลมังคุดด้านบนและด้านล่างทรงพุ่ม ในมังคุดที่แจ้งและมังคุดที่ร่ม ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ที่อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทรงพุ่ม	% พื้นที่ผิวผลลาย (Mean \pm SE) ^{1/}						เฉลี่ย ^{2/}
	ที่แจ้ง			ที่ร่ม			
	21/5/48	4/6/48	18/6/48	21/5/48	4/6/48	18/6/48	
ด้านบน	38.7 \pm 3.0	30.3 \pm 2.4	46.6 \pm 3.1	17.8 \pm 2.2	22.2 \pm 2.6	33.4 \pm 2.9	31.5 \pm 1.2
ด้านล่าง	31.5 \pm 2.7	20.4 \pm 2.4	25.4 \pm 2.6	14.5 \pm 2.1	14.5 \pm 1.9	16.1 \pm 1.8	20.4 \pm 1.0
T-test	2.1*	3.5**	6.8**	ns	2.6*	5.8**	8.9**

^{1/} เฉลี่ยจาก 200 ผล; ^{2/} เฉลี่ยจาก 600 ผล; *แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 95%;

**แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 99%; ns = ไม่แตกต่างทางสถิติ

ตารางที่ 12. เปอร์เซ็นต์จำนวนผลยางไหลของผลมังคุดด้านบนและด้านล่างทรงพุ่ม ในมังคุดที่แจ้งและมังคุดที่ร่ม ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ที่อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทรงพุ่ม	% จำนวนผลยางไหล (Mean \pm SE) ^{1/}						เฉลี่ย ^{2/}
	ที่แจ้ง			ที่ร่ม			
	21/5/48	4/6/48	18/6/48	21/5/48	4/6/48	18/6/48	
ด้านบน	73.0 \pm 4.5	67.0 \pm 4.7	85.0 \pm 11.1	68.0 \pm 4.7	73.0 \pm 4.5	78.0 \pm 4.2	74.0 \pm 2.5
ด้านล่าง	68.0 \pm 4.7	65.0 \pm 4.8	49.0 \pm 5.0	54.0 \pm 5.0	33.0 \pm 4.7	74.0 \pm 4.4	57.2 \pm 2.0
T-test	ns	ns	3.1**	2.2*	7.0**	ns	5.6**

^{1/} เฉลี่ยจาก 200 ผล; ^{2/} เฉลี่ยจาก 600 ผล; *แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 95%;

**แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 99%; ns = ไม่แตกต่างทางสถิติ

จากผลการประเมินความเสียหายชี้ให้เห็นว่าการแพร่กระจายของเพลี้ยไฟตามแนวตั้งของทรงพุ่มมังคุดมีความแตกต่างกัน โดยพบความเสียหายของผลมังคุดที่เกิดจากเพลี้ยไฟในผลที่อยู่ด้านบนมากกว่าด้านล่างแสดงว่า ด้านบนพบปริมาณเพลี้ยไฟสูงกว่าด้านล่างของทรงพุ่ม ในทำนองเดียวกันกับรายงานของ Reitz (2002) พบปริมาณตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟ *Frankliniella occidentalis* (Pergande) ในดอกมะเขือเทศที่อยู่ด้านบนมากกว่าดอกที่อยู่ด้านล่างของทรงพุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในทางตรงกันข้ามพบตัวอ่อนในดอกมะเขือเทศที่อยู่ด้านล่างมากกว่าดอกที่อยู่ด้านบนของทรงพุ่ม นอกจากนี้เพลี้ยไฟ *Thrips obscuratus* (Crawford) ที่เข้าทำลายดอกและผลเนคทารีน พบปริมาณเพลี้ยไฟด้านบนมากกว่าด้านล่างของทรงพุ่ม (McLaren and Fraser, n.d.) และได้สรุปว่าการกระจายตัวของเพลี้ยไฟชนิดดังกล่าวภายในทรงพุ่มต้นเนคทารีนแตกต่างกันขึ้นกับระยะการเจริญเติบโตของพืช

ช่วงเวลาในรอบวัน และอุณหภูมิ ส่วนในต้นฝ้ายพบปริมาณเพลิงไฟมากบริเวณกึ่งกลางทรงพุ่ม (Atakan *et al.*, 1996)

เมื่อพิจารณาผลมังคุดที่ถูกทำลายโดยเพลิงไฟในทิศต่างๆ ทั้ง 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ของมังคุดที่ปลูกในที่แจ้งและที่ร่มพบว่า มังคุดที่ปลูกในที่แจ้งมีเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายมากที่สุด ในทิศเหนือของทรงพุ่ม รองลงมาคือทิศตะวันออก ส่วนมังคุดที่ปลูกในที่ร่มพบเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายมากที่สุด ในทิศตะวันออก รองลงมาคือ ทิศเหนือ ส่วนทิศใต้และทิศตะวันตกพบเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายน้อยที่สุดทั้งในที่ร่มและที่แจ้ง (ตารางที่ 13) จากการศึกษานี้ของสาทร และคณะ (2535) พบว่าประชากรเพลิงไฟบนต้นมังคุดที่พบตามทิศต่าง ๆ จะมีโอกาสแตกต่างกันทางสถิติได้ประมาณ 75% โดยที่ทิศใต้มีโอกาสที่ประชากรสูงสุด รองลงมา คือ ทิศตะวันออก การพบเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายทิศตะวันออกมากนั้นน่าจะเกิดมาจากอิทธิพลของความเข้มแสงที่มังคุดได้รับในช่วงเช้าจะมากกว่าทิศอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการระบาดของมังคุดในที่ร่มและที่แจ้งที่เพลิงไฟระบาดรุนแรงในที่แจ้งมากกว่าในที่ร่มดังผลการทดลองในเบื้องต้น

ตารางที่ 13. เปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายของผลมังคุดในทิศต่างๆ ในมังคุดที่แจ้งและมังคุดที่ร่ม ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ที่อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศ	ที่แจ้ง (Mean±SE) ^{1/}			ที่ร่ม (Mean±SE)		
	21/05/48	04/06/48	18/06/48	21/05/48	04/06/48	18/06/48
เหนือ	42.3±4.6	29.3ab ^{2/} ±4.1	39.0±3.9	17.8±3.4	27.3a±4.1	23.2b±3.8
ใต้	33.9±4.0	18.6ab±3.0	37.5±4.4	13.6±2.6	12.6b±2.0	19.5b±3.1
ตะวันออก	34.3±3.9	32.6a±3.7	38.9±4.6	20.6±3.9	18.7ab±3.4	35.4a±4.0
ตะวันตก	31.0±4.1	20.9ab±2.8	28.7±4.2	12.7±2.3	15.4b±3.4	20.6b±3.3
F-test	ns	**	ns	ns	*	**
CV (%)	47.38	52.60	49.48	67.10	64.91	56.95

^{1/} เฉลี่ยจาก 50 ผล; ^{2/} ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยวิธี DMRT; *แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 95%; **แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 99%; ns = ไม่แตกต่างทางสถิติ

5.6 แนวทางการควบคุมเพลิงไฟโดยใช้กับดักกาวเหนียว

จากการศึกษาผลของกับดักกาวเหนียวสีต่างๆ ต่อการดึงดูดเพลิงไฟในมังคุดพบว่า กับดักกาวเหนียวสีต่างๆ สามารถดึงดูดเพลิงไฟในมังคุดได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05, P < 0.01) กับดักกาวเหนียวสีเหลืองดึงดูดเพลิงไฟได้สูงสุด รองลงมาได้แก่กับดักกาวเหนียวสีฟ้า สีใส สีขาว ส่วนสีชมพูดึงดูดเพลิงไฟได้น้อยที่สุด จำนวนเพลิงไฟเฉลี่ย/กับดักของกับดักกาวเหนียวสีเหลือง สีฟ้า สีใส

สีขา และสีชมพูอยู่ระหว่าง 854.0-928.2, 113.2-664.0, 105.0-429.0, 95.5-404.5 และ 81.0-355.5 ตัว/ก้นดัก ตามลำดับ (ตารางที่ 14)

ตารางที่ 14. จำนวนเพลี้ยไฟที่ติดกับดักกาวเหนียวสีต่างๆ ในสวนมังคุด ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง มิถุนายน พ.ศ. 2548 ที่อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สีกับดักกาวเหนียว	จำนวนเพลี้ยไฟ/ก้นดัก (Mean±SE) ^{1/}		
	7/05/48	21/05/48	4/06/48
สีเหลือง	928.2b ^{2/} ±118.8	1081.0b±265.4	854.0b±124.6
สีฟ้า	664.0ab±199.4	443.0a±94.1	113.2a±46.1
สีใส	429.0a±76.8	318.7a±23.5	105.0a±7.8
สีขา	404.5a±55.2	272.5a±15.2	95.5a±12.6
สีชมพู	355.5a±22.6	211.0a±33.3	81.0a±6.0
F-test	*	**	**
CV (%)	42.6	54.0	48.4

^{1/} เฉลี่ยจาก 16 ก้นดัก; ^{2/} ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) โดยวิธี DMRT; *แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 95%; **แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 99%

จากการศึกษาครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่ากับดักกาวเหนียวสีเหลืองให้ผลในการดึงดูดเพลี้ยไฟในสวนมังคุดได้ดีที่สุด ถึงแม้ว่าไม่ได้จำแนกชนิดของเพลี้ยไฟที่ติดกับดักสีต่างๆ แต่จากการทดลองเรื่องปริมาณและชนิดของเพลี้ยไฟที่พบในสวนมังคุดพบว่าเพลี้ยไฟ *S. dorsalis* เป็นชนิดที่พบมากที่สุดและพบทุกระยะทั้งระยะแตกใบอ่อน ระยะออกดอก และระยะผลอ่อน จึงอาจกล่าวได้ว่ากับดักกาวเหนียวสีเหลืองสามารถดึงดูดเพลี้ยไฟชนิดดังกล่าวได้ดีที่สุด จากการศึกษาโดยนักวิจัยอื่นๆ พบว่าความสามารถในการดึงดูดเพลี้ยไฟ *Thrips palmi* Karny โดยกับดักกาวเหนียวสีต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของสีที่ใช้และชนิดของพืชที่ศึกษา ศรีสุดา และ ปิยรัตน์ (2543) ได้ศึกษาในสวนกล้วยไม้สกุลหวายพบว่ากับดักสีฟ้าดึงดูดได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่สีเหลือง สีขาว และสีน้ำเงิน ตามลำดับ และให้ผลดึงดูดมากกว่ากับดักแผ่นใสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่สีเขียวและสีส้ม ดักเพลี้ยไฟได้น้อยและไม่แตกต่างทางสถิติกับกับดักแผ่นใสซึ่งดักเพลี้ยไฟได้น้อยที่สุด ในขณะที่กรรณิการ์ (2543) ได้ทดลองในมันฝรั่งที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่า กับดักกาวเหนียวสีฟ้าดึงดูดเพลี้ยไฟ *T. palmi* ได้ดีที่สุด รองลงมาคือกับดักกาวเหนียวสีเขียว นอกจากนี้ปัจจัยดังกล่าวแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการดึงดูดเพลี้ยไฟโดยกับดักกาวเหนียว เช่น ขนาดและรูปร่างของกับดัก (Cho et al., 1995; Moreno et al., 1984; Coli et al., 1992) ความสูงที่ติดตั้งกับดัก (Gillespie and Vernon, 1990) การวางของสีกับดักเนื่องจากแสงแดด (Childers and Brecht, 1996; Samways, 1986; Grout and Richards, 1990)

จากผลการทดลองในครั้งนี้ กับดักกาเหวีสีเหลืองสามารถดึงดูดเพลี้ยไฟได้ดีที่สุด จึงได้นำไปทดสอบในแปลงทดลองเพื่อควบคุมเพลี้ยไฟโดยใช้ขนาดของกับดักที่ใหญ่ขึ้น ผลการศึกษาพบว่า เปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายของมังคุดที่ติดกับดักกาเหวีสีเหลืองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.01$) กับเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายของมังคุดที่ไม่ติดตั้งกับดักกาเหวีสีเหลือง ตลอดระยะเวลาการทดลองพบว่า เปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายของมังคุดที่ติดตั้งกับดักกาเหวีสีเหลืองมีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ $8.5 \pm 0.8\%$ ในขณะที่ต้นที่ไม่ติดตั้งกับดักกาเหวีสีเหลืองมีเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายเฉลี่ยเท่ากับ $20.4 \pm 1.8\%$ นอกจากนี้ยังพบว่า เปอร์เซ็นต์จำนวนผลยางไหลในต้นที่ติดตั้งกับดักกาเหวีสีเหลืองมีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 26% ซึ่งน้อยกว่าต้นที่ไม่ติดตั้งกับดักกาเหวีสีเหลืองซึ่งมีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 77% นอกจากนี้ต้นที่ไม่ติดตั้งกับดักกาเหวีสีเหลืองมีจำนวนผลที่มีรอยขีดบนกลีบเลี้ยง 100% ในขณะที่ต้นที่ติดกับดักกาเหวีสีเหลืองมีจำนวนผลที่มีรอยขีดบนกลีบเลี้ยงเฉลี่ย 92% ของจำนวนผลทั้ง (ตารางที่ 15)

ตารางที่ 15. เปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลาย ผลยางไหล และรอยขีดบนกลีบเลี้ยงของมังคุดที่ติดตั้งและไม่ติดตั้งกับดักกาเหวีสีเหลือง ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2549 ที่ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีทรมาน	% ผิวผลลาย (Mean \pm SE) ^v	% ผลยางไหล	% รอยขีดบนกลีบเลี้ยง
ติดตั้งกับดักกาเหวีสีเหลือง	8.5 \pm 0.8	26.0	92.0
ไม่ติดตั้งกับดักกาเหวีสีเหลือง	20.4 \pm 1.8	77.0	100.0
T-test	5.79**		

^v เฉลี่ยจาก 100 ผล; ** แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 99%

5.7 แนวทางการควบคุมเพลี้ยไฟโดยใช้ระบบการให้น้ำ

จากการศึกษาแนวทางการควบคุมเพลี้ยไฟโดยการฉีดน้ำบริเวณทรงพุ่มพบว่า ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายของมังคุดที่ฉีดพ่นน้ำบนทรงพุ่มทุกวัน ทุก 2 วัน ทุก 3 วัน และฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง imidacloprid อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ให้ผลแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.01$) กับต้นมังคุดที่ไม่ฉีดพ่นสารใดๆ (ควบคุม) และพบว่า การฉีดพ่นน้ำบนทรงพุ่มทุกวิธีการมีเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายเฉลี่ยไม่แตกต่างทางสถิติกับการฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง imidacloprid ถึงแม้ว่าค่าดังกล่าว น้อยที่สุดเท่ากับ $2.2 \pm 0.3\%$ ในมังคุดที่ฉีดพ่นสารฆ่าแมลง imidacloprid ก็ตาม ส่วนมังคุดที่ใช้น้ำฉีดพ่นบนทรงพุ่มทุกวัน และทุก 2 วัน มีเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายเท่ากับ 3.7 ± 0.1 และ 3.7 ± 0.2 ตามลำดับ ส่วนการใช้น้ำฉีดพ่นบนทรงพุ่มทุก 3 วัน พบเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายเฉลี่ยเท่ากับ 6.3 ± 0.3 ในขณะที่ไม่ฉีดพ่นสารใดๆ มีค่าสูงสุดเท่ากับ $32.8 \pm 3.1\%$ (ตารางที่ 16)

ดังนั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สามารถนำไปใช้ในการควบคุมเพลี้ยไฟภายในสวนมังคุดในช่วงมังคุดออกดอกถึงระยะติดผล คือ การฉีดพ่นน้ำบนทรงพุ่มทุก 2 วัน เนื่องจากจะสามารถลดเปอร์เซ็นต์พื้นที่ผิวผลลายของมังคุดจากการทำลายของเพลี้ยไฟได้ใกล้เคียงกับการฉีดพ่นสารฆ่าแมลง imidacloprid

วิธีการฉีดพ่นน้ำบนทรงพุ่มนอกจากจะมีประโยชน์ในทางตรงที่ช่วยในการควบคุมการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในทางอ้อม คือ เป็นการให้น้ำแก่ต้นมังคุดอีกทางหนึ่ง เนื่องจากในช่วงมังคุดออกดอกถึงระยะติดผล ส่วนมากจะอยู่ในช่วงแล้งหรือมีฝนน้อย มังคุดเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ดังนั้นในช่วงแล้งจึงจำเป็นต้องให้น้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งจึงจะช่วยให้การเจริญเติบโตของมังคุดเป็นไปตามปกติซึ่งกรมวิชาการเกษตร (2547) รายงานว่าหลังจากที่สังเกตพบว่ามังคุดออกดอกแล้วประมาณ 10-15% ของยอดทั้งหมด ต้องให้น้ำในปริมาณมาก

ตารางที่ 16. เปรอร์เซนต์พื้นที่ผิวผลลาย จำนวนผลยางไหล และรอยขีดบนกลีบเลี้ยงของมังคุดที่ฉีดพ่นด้วยน้ำและสารฆ่าแมลง ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2549 ที่อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทรีทเมนต์	% พื้นที่ผิวผลลาย (Mean±SE) ^{1/}	% จำนวนผลยางไหล	% รอยขีดบนกลีบเลี้ยง
ฉีดพ่นน้ำทุกวัน	3.7±0.1b ^{2/}	18	96
ฉีดพ่นน้ำทุก 2 วัน	3.7±0.2b	32	96
ฉีดพ่นน้ำทุก 3 วัน	6.3±0.3b	42	88
ฉีดพ่นสาร imidacloprid	2.2±0.29b	14	76
ควบคุม	32.8±3.1a	62	96
C.V. (%)	31.97		
F-test	**		

^{1/} เฉลี่ยจาก 50 ผล, ^{2/} ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) โดยวิธี DMRT; **แตกต่างทางสถิติที่ระดับ 99%

6. สรุปผล

จากผลการศึกษาการระบาดและการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟในมังคุดในภาคใต้โดยใช้พื้นที่อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ศึกษาหลักนั้นสรุปได้ว่าการผลิตมังคุดของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก เห็นได้จากมังคุดที่วางจำหน่ายในท้องตลาดและมังคุดที่เก็บเกี่ยวจากสวนมีการทำลายของเพลี้ยไฟรุนแรง ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงในการนำเทคโนโลยีหรือแนวทางจัดการผลิตมังคุดให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออกถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด เนื่องจากมังคุดคุณภาพดีมีราคาสูงกว่ามังคุดปกติ 3-4 เท่า มังคุดไม่ได้คุณภาพนอกจากมีขนาดเล็กแล้วคุณภาพผิวผล ผลยางไหล และรอยขีดบนกลีบเลี้ยงเนื่องมาจากการทำลายของเพลี้ยไฟเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มังคุดมีคุณภาพต่ำลง ซึ่งการระบาดและเข้าทำลายของเพลี้ยไฟในมังคุดในภาคใต้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงโดยพบจำนวนเพลี้ยไฟหลายชนิดเข้าทำลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะแตกใบอ่อนจนกระทั่งผลอ่อน สาเหตุหลักเนื่องมาจากขาดการจัดการควบคุมแมลงดังกล่าว เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการควบคุม

โดยธรรมชาติ ดังนั้นหากต้องการผลิตมังคุดที่มีคุณภาพผลดีขึ้น มีการเข้าทำลายผลของเพลี้ยไฟลดลงจึงจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี ซึ่งการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟให้ได้ผลดีนั้นต้องดำเนินการตั้งแต่ระยะเริ่มแตกใบอ่อนเพื่อลดประชากรเริ่มต้นซึ่งส่งผลให้การทำลายผลมังคุดของเพลี้ยไฟลดลง เมื่อพิจารณาฤดูกาลออกดอกและติดผลของมังคุดสรุปได้ว่า ในฤดูกาลปกติคือออกดอกและติดผลในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจำเป็นต้องจัดการควบคุมเพลี้ยไฟเป็นพิเศษหากต้องการผลิตมังคุดที่มีคุณภาพปราศจากการทำลายของเพลี้ยไฟ เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีการระบาดของเพลี้ยไฟอย่างรุนแรงเพราะสภาพอากาศร้อนและฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานจึงเหมาะต่อการเพิ่มประชากรเพลี้ยไฟอย่างรวดเร็ว หากมังคุดออกดอกและติดผลนอกฤดูกาลปกติประมาณเดือนตุลาคม จะพบปัญหาการระบาดของเพลี้ยไฟน้อยลง เนื่องจากช่วงดังกล่าวเริ่มต้นฤดูฝนของภาคใต้ ดังนั้นในการผลิตมังคุดที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออกนอกฤดูกาลปกติจึงมีความเป็นไปได้สูง ประกอบกับราคาของผลผลิตในช่วงดังกล่าวสูงกว่าฤดูกาลปกติเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตน้อย อย่างไรก็ตาม มังคุดที่ออกดอกและติดผลในฤดูกาลปกติก็สามารถผลิตมังคุดที่มีคุณภาพได้เช่นกัน แต่คุณภาพที่ได้อาจจะด้อยกว่าการผลิตมังคุดนอกฤดูกาลด้วยเหตุผลการระบาดที่รุนแรงของเพลี้ยไฟในมังคุดในฤดูกาลปกติมากกว่ามังคุดนอกฤดูกาลนั่นเอง

จากการศึกษาแนวทางในการควบคุมเพลี้ยไฟโดยใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองและการฉีดพ่นทรงพุ่มด้วยน้ำสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากเพลี้ยไฟได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉีดพ่นน้ำในระยะออกดอกจนกระทั่งติดผลอ่อนทุก 2-3 วัน ช่วยลดความเสียหายจากเพลี้ยไฟไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง imidacloprid ซึ่งเป็นสารเคมีที่ให้ประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยไฟสูง และกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ใช้สารเคมีดังกล่าว ดังนั้นในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟเพื่อผลิตมังคุดที่มีคุณภาพสามารถใช้กับดักกาวเหนียวขนาดใหญ่ติดตั้งในสวนมังคุดตั้งแต่มังคุดเริ่มแตกใบอ่อน และในระยะออกดอกจนกระทั่งติดผลอ่อนต้องให้น้ำมังคุดโดยการฉีดพ่นทรงพุ่มทุก 2-3 วัน โดยเน้นฉีดพ่นที่บริเวณดอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกที่อยู่ด้านบนของทรงพุ่มมังคุดซึ่งพบการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟรุนแรงต้องเน้นฉีดพ่นเป็นกรณีพิเศษ การใช้วิธีดังกล่าวนอกจากจะเป็นวิธีการควบคุมโดยไม่ใช่สารเคมีซึ่งให้ผลผลิตที่ปลอดภัยและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแล้วยังเป็นวิธีการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยลดการพึ่งพาสารฆ่าแมลงซึ่งเป็นสารเคมีที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตมังคุดให้มีคุณภาพนั้นนอกจากจะต้องพิจารณาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้วระบบการปลูกมังคุดมีส่วนสำคัญในการผลิตมังคุดที่มีคุณภาพได้เนื่องจากเพลี้ยไฟในมังคุดที่ปลูกมังคุดเดี่ยวๆ ในที่แจ้งมีการระบาดรุนแรงกว่ามังคุดที่ปลูกร่วมกับพืชยืนต้นอื่นๆ ดังนั้นหากต้องการผลิตมังคุดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดเพิ่มสูงขึ้นในภาคใต้นอกจากจะพิจารณาปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้วจำเป็นต้องเลือกระบบการปลูกที่ปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่นอีกด้วย