

## สรุป

1. องค์ประกอบในกล้ามเนื้อส่วนลำตัวของปลาหมึกกระดอง (*Sepia bremana*) จากการทดลอง พนว่า กล้ามเนื้อส่วนลำตัวของปลาหมึกกระดองมีปริมาณความชื้นร้อยละ  $82.02 \pm 0.43$ , ไขมันร้อยละ  $0.57 \pm 0.12$ , เต้าร้อยละ  $0.77 \pm 0.02$ , โปรตีนร้อยละ  $16.56 \pm 0.09$  และเกลือร้อยละ  $1.72 \pm 0.30$  จากการวิเคราะห์ปริมาณคอลลาเจนในกล้ามเนื้อปลาหมึกกระดอง มีค่าร้อยละ  $1.25 \pm 0.98$  โดยที่ด้านผิวของลำตัวมีปริมาณมากกว่า ด้านในลำตัว

2. ผลของโซเดียมคลอไรด์ในกล้ามเนื้อต่อสมบัติทางกล กายภาพ และโครงสร้างจุลภาคของกล้ามเนื้อปลาหมึกกระดอง พนว่า การป่นปลาหมึกกระดองส่วนลำตัวในสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 5 ที่อุณหภูมิ 0 - (-5) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที สามารถทำให้ปลาหมึกกระดองเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 3 ประการ คือ การม้วนตามแนวเส้นรอบวง, การมีความแข็งเพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักภายหลังการป่น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความชื้นในกล้ามเนื้อของปลาหมึก ซึ่งสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของปริมาณเกลือ (Dry basis) ในชิ้นเนื้อที่วิเคราะห์ได้ โดยความชื้นและปริมาณเกลือจะเพิ่มขึ้นจากผิวด้านนอกลำตัวมากกว่าผิวด้านในลำตัว แสดงให้เห็นว่าเกลือสามารถซึมผ่านผิวด้านนอกของลำตัวได้ถ้ากว่าผิวด้านในลำตัว ค่าแรงดึงของกล้ามเนื้อส่วนลำตัวของปลาหมึก พนว่า ค่าแรงดึงในแนววางของลำตัวมีค่าสูงกว่าแรงดึงในแนวยาว และค่าแรงดึงของกล้ามเนื้อลำตัวด้านนอกมีค่าสูงกว่ากล้ามเนื้อลำตัวด้านใน การวัดการเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อสัมผัสด้วยแรงดึงไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างตัวอย่างที่ผ่านการป่นเกลือ และไม่ผ่านการป่นเกลือได้ ( $p>0.05$ ) แต่พนว่า ค่าแรงดึงสามารถบ่งบอกความแตกต่างระหว่างปลาหมึกที่ผ่านและไม่ผ่านการป่นเกลือได้ ( $p<0.05$ ) การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของปลาหมึกที่ผ่านการป่นเกลือ และไม่ผ่านการป่นเกลือ พนว่า ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจุลภาคของกล้ามเนื้อปลาหมึกที่ผ่านการป่นเกลือ

3. ผลของโซเดียมคลอไรด์และโซเดียมไครโพร็อกซ์ฟอสเฟตต่อความสามารถละลายของโปรตีนและคอลลาเจนในกล้ามเนื้อปลาหมึกกระดอง พนว่า โซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นเท่ากันที่วิเคราะห์ได้ในกล้ามเนื้อปลาหมึกกระดองไม่สามารถเพิ่มความสามารถในการละลายของโปรตีนในกล้ามเนื้อได้ และโซเดียมไครโพร็อกซ์ฟอสเฟตความเข้มข้น 25, 50 และ 100 ppm ไม่สามารถเพิ่มความสามารถในการละลายของโปรตีนกล้ามเนื้อได้เช่นกัน

4. ผลของโซเดียมคลอไรด์และโซเดียมไครโพร็อกซ์ฟอสเฟตต่อสมบัติทางกลและกายภาพของปลาหมึกกระดองก่อนและหลังการแช่เยือกแข็ง พนว่า การป่นปลาหมึกในสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 5 ที่อุณหภูมิ 0 – (-5) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที สามารถเพิ่มน้ำหนักของปลาหมึกได้ร้อยละ  $5.83 \pm 0.46$  ( $p<0.05$ ) และเมื่อนำปลาหมึกดังกล่าวไปแช่ในสารละลาย STPP เข้มข้น 25, 50 และ 100 ppm เป็นเวลา 30 นาที อุณหภูมิ 0 – 4 องศาเซลเซียส พนว่า การแช่ปลาหมึกในสารละลาย STPP ที่มีความเข้มข้น

25 และ 50 ppm ทำให้น้ำหนักของตัวอย่างลดลงร้อยละ 75 จากน้ำหนักปลาหมึกกระดองหลังการปั่นในสารละลายนอกจากการนำไปปลาหมึกไปแข็งในสารละลายน้ำ STPP เข้มข้น 100 ppm กลับพบว่า ทำให้น้ำหนักปลาหมึกกระดองทั้งไม่แตกต่างจากชุดที่ไม่ผ่านการแข็งในสารละลาย การปั่นปลาหมึกในสารละลายนอกมีผลให้ค่าแรงเสื่อมสูงสุดของปลาหมึกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ( $p<0.05$ ) ในขณะที่ปลาหมึกที่ผ่านการปั่นในสารละลายนอกมีความต้านทานต่อการแข็งในสารละลายน้ำ STPP ทุกรอบด้วยความเข้มข้น มีผลให้มีค่าแรงเสื่อมลดลงกระแทกทั้งไม่แตกต่างจากชุดตัวอย่างที่ไม่ผ่านการแข็งในสารละลาย ปริมาณฟอสเฟตที่วิเคราะห์ได้ไม่แตกต่างกันในทุกชุดการทดลอง แสดงให้เห็นว่าปริมาณฟอสเฟตที่ใช้ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีและการภาพของปลาหมึกกระดองได้ เมื่อนำปลาหมึกที่ผ่านการปั่นเกลือและแข็งในสารละลายโดยเดิม ไครโพริลฟอสเฟตไปทำการเก็บรักษาโดยการแข็งแข็งเป็นเวลา 3 เดือน พบว่า ปลาหมึกกระดองเกิดการสูญเสียน้ำ มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แน่นแข็งขึ้น และการละลายของโปรตีนลดลง โดยมีปริมาณเกลือและฟอสเฟตเพิ่มขึ้น การสูญเสียน้ำภายในหลังการทำละลายพบว่าชุดตัวอย่างที่ผ่านการปั่นเกลือเกิดการสูญเสียน้ำอย่างกว่าชุดทดลองอื่นๆ ดังนั้น การปั่นปลาหมึกในสารละลายโดยเดิมคลอไรด์เพียงขั้นตอนเดียวจึงมีผลเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตได้

5. ศึกษาผลของการบังชนิดต่อความสามารถในการอุ้มน้ำของกล้ามเนื้อปลาหมึกกระดองแข็งเยื่อกะเข็ง พบว่า การปั่นปลาหมึกในสารละลายนอกมีร่วมกับการแข็งในสารละลายโดยเดิม ไครโพริลฟอสเฟต ร้อยละ 1.0 สามารถเพิ่มน้ำหนักภายหลังการแข็งได้สูงสุด ( $p<0.05$ ) ร้อยละ  $4.96 \pm 0.38$  การแข็งปลาหมึกที่ผ่านการปั่นในสารละลายนอกมีร่วมกับการแข็งในสารละลาย ทริโซโลสไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนกล้ามเนื้อไม่แตกต่างกัน แต่ให้ประสิทธิภาพดีกว่า  $\text{CaCl}_2$  และ  $\text{MgCl}_2$  และสารผสมระหว่าง  $\text{CaCl}_2$  และ  $\text{MgCl}_2$  ไม่สามารถป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนกล้ามเนื้อได้

6. จากการศึกษาผลของการบังชนิดต่อเนื้อสัมผัสและความสามารถในการอุ้มน้ำของปลาหมึกกระดองแข็งเยื่อกะเข็ง พบว่า การเก็บรักษาโดยการแข็งแข็งมีผลให้ปลาหมึกเกิดการสูญเสียคุณภาพที่ดีเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นในทุกชุดการทดลอง แต่ปลาหมึกที่ผ่านการแข็งในสารละลายน้ำ  $\text{NaHCO}_3$  เข้มข้นร้อยละ 6 พบว่า ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนกล้ามเนื้อได้ดีกว่าปลาหมึกที่ผ่านการปั่นเกลือเพียงอย่างเดียว โดยให้ค่าความสามารถในการอุ้มน้ำที่สูงและให้ค่าแรงเสื่อมที่น้อยกว่าชุดทดลองอื่นๆ ส่วนการแข็งปลาหมึกที่ผ่านการปั่นเกลือในสารทางการค้า (SQ-UP) ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติไม่แตกต่างกัน