

ผลของการศึกษา

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มแม่บ้าน (สตรีตั้งครรภ์) อายุเฉลี่ย 25 ปี การศึกษาเฉลี่ย

6.7 ปี มีอาชีพเป็นนักร้องร้อยละ 33.33 (70) ไม่ประกอบอาชีพร้อยละ 43.33 (91) อาชีพ

ของสามีเป็นนักร้องร้อยละ 39 สถานที่พักในปัจจุบันเป็นชนบทร้อยละ 48.95 อยู่ในเขตเมือง

23.33

ตารางที่ 1 การรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ลักษณะการรับรู้	ร้อยละ (ราย)
1. การเคยรับรู้โรคเอดส์	
เคย	96.19 (202)
ไม่เคย	3.81 (8)
2. แหล่งข้อมูลที่ได้รับรู้	
โทรทัศน์	92.38 (194)
เพื่อนบ้าน	30.48 (64)
วิทยุและสิ่งพิมพ์	12.86 (27)
3. รับรู้เกี่ยวกับการติดต่อ	
ทางเพศสัมพันธ์	76.19 (160)
ทางเข็มฉีดยา	32.38 (68)
สัมผัสแผล	7.00 (15)
ไม่ทราบ	21.43 (45)
4. รับรู้ผลกระทบจากโรค	
เคยรับรู้	96.19 (202)
ตาย	39.00 (82)
รักษาไม่หาย	19.05 (40)
5. รับรู้วิธีป้องกันโรค	
5.1 ระบุได้ถูกต้อง	70.00 (147)
1) ใช้ถุงยางอนามัย	39.52 (83)
2) ห้ามสามีสำส่อน	27.60 (58)
3) ห้ามสามีใช้เข็ม	5.71 (12)
ฉีดสารร่วมกัน	
5.2 ระบุผิดพลาด	30.00 (63)

กลุ่มแม่บ้านส่วนมากเคยรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยการรับรู้ทางโทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ 92.38) การรับรู้การติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงสุด (ร้อยละ 76.19) การรับรู้ผลกระทบตายหลังการเจ็บป่วยมากที่สุด (ร้อยละ 39.82) และรับรู้การป้องกันเอดส์โดยการใช้ถุงยางอนามัย (ร้อยละ 39.52) และห้ามสามีสำส่อน เป็นต้น

ตารางที่ 2 กิจกรรมป้องกันโรคเอดส์ในครอบครัว

กิจกรรม	ร้อยละ (ราย)
1. การอภิปรายเอดส์กับสามี	
1.1 อภิปราย :	54.48(145)
1) การติดต่อ	25.71(54)
2) ผลกระทบ	11.90(25)
3) การป้องกัน	11.00(23)
4) จำนวนครั้งของการอภิปราย	
หลายครั้ง	24.30(51)
1-3 ครั้ง	13.33(28)
1.2 ไม่อภิปราย :	45.52(96)
1) สามีไม่สำส่อน	20.00(42)
2) สามีเลิกสำส่อน	03.33(7)
3) สามีรู้จักโรคเอดส์	12.86(27)
4) ไม่กล้าอภิปราย	07.62(16)
2. การเตือนสามี	
2.1 เตือนสามีให้ระวัง	57.14(112)
1) ห้ามเที่ยวโสเภณี	49.52(104)
2) ให้ใช้ถุงยาง	5.24(11)
อนามัยเมื่อเที่ยว	
3) เตือนให้ระวังการใช้มดโกน	1.43(3)
4) จำนวนครั้งที่เตือน	
หลายครั้ง	33.81(71)
1-3 ครั้ง	21.90(46)
2.2 ไม่เตือน	42.86(90)
1) เชื่อสามีไม่เที่ยว	12.38(26)
2) สามีกลัวเอดส์	5.71(12)
3) ไม่สนใจ-ไม่ทราบ	18.57(39)

กิจกรรมป้องกันเอดส์ในครอบครัว มีการอภิปรายเรื่องเอดส์กับสามีร้อยละ

54.48 โดยการอภิปรายการติดต่อสูงสุด (ร้อยละ 25.71) เพื่อนสามีให้ระวังโรคเอดส์ร้อยละ

57.14 โดยการห้ามสามีใช้บริการหญิงบริการทางเพศมากที่สุด(ร้อยละ 49.52) สำหรับกลุ่ม

แม่บ้านที่ไม่ยอมอภิปรายเอดส์ในครอบครัวร้อยละ 45.52 ระบุสามีไม่สำล่อนมากที่สุด(ร้อยละ

20) ไม่ยอมเตือนสามีให้ระวังโรคเอดส์ร้อยละ 42.86

ตารางที่ 3 กิจกรรมป้องกันเอดส์ในชุมชน

กิจกรรม	ร้อยละ (ราย)
1. การอภิปรายกับญาติ-เพื่อน	
1.1 อภิปราย	31.43(66)
1) การติดต่อ	18.57(39)
2) ผลกระทบ	3.33(7)
3) ไม่สามารถระบุ	4.76(10)
4) จำนวนครั้ง	
หลายครั้ง	9.52(20)
1-2 ครั้ง	11.41(24)
1.2 ไม่อภิปราย	68.57(144)
1) ไม่สนใจ	25.24(53)
2) คิดว่าคนข้าง	43.33(91)
บ้านสุขภาพ	
2. การเตือนญาติ-เพื่อน	
2.1 เคยเตือน :	28.09(59)
1) การติดต่อ	28.09(59)
2) ไม่สามารถระบุ	7.14(15)
3) จำนวนครั้ง	
หลายครั้ง	10.95(23)
1-2 ครั้ง	11.43(24)

2.2 ไม่เคยเดือน	71.90(151)
1) คิดว่าตัวใครตัวมัน	9.52(20)
2) เป็นเรื่องที่รู้จักกัน	3.33(7)
3) ไม่ว่าง	1.42(3)
3 การชักชวนการป้องกันเอดส์	
3.1 เคยชักชวน	11.90(25)
1) เดือนให้เลิกสำส่อน	3.81(8)
2) เดือนให้เลิกเสพติด	0.95(2)
3) จำนวนครั้ง	
หลายครั้ง	4.29(9)
1-2 ครั้ง	7.61(16)
3.2 ไม่เคยชักชวน	88.10(185)
1) บอกว่าตัวใครตัวมัน	1.43(3)
2) อาศัยไม่กล้าพูด	0.95(2)
3) ไม่ระบุเหตุผล	85.72(180)

กิจกรรมป้องกันเอดส์ในชุมชน กลุ่มแม่บ้านระบุไม่ยอมอภิปรายร้อยละ 68.57 โดยให้เหตุผลว่า เพื่อนบ้านสุขภาพร้อยละ 43.33 ไม่สนใจร้อยละ 25.24 สำหรับการเดือนระบุไม่เคยเดือนร้อยละ 71.90 ไม่เคยชักชวนให้ป้องกันเอดส์ร้อยละ 88.10 โดยให้เหตุผลตัวใครตัวมันมากที่สุด สำหรับแม่บ้านที่มีการอภิปรายเรื่องเอดส์ในวงศาศาสนาและเพื่อนสนิทมรเพียงร้อยละ 31.43 เท่านั้น และระบุค่าเดือนเรื่องการติดเชื้อมากที่สุด

ตารางที่ 4 ความตั้งใจตรงเคสในชุมชน

กิจกรรม	ร้อยละ (ราย)
1. ความตั้งใจ	
1.1 ตั้งใจชักชวนเพื่อนบ้านให้ป้องกันเคส	21.90 (46)
1) เตือนให้เลิกสูบบุหรี่	3.81 (8)
2) งดการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน	0.95 (2)
3) จำนวนครั้งที่คาดว่าจะเตือน	
หลายครั้ง	4.29 (9)
ไม่ระบุ	17.6 (37)
1.2 ไม่เคยคิดที่จะตรงเคสโรคเอดส์ในชุมชน	71.90 (151)
1) ไม่ยอมระบุเหตุผล	23.81 (50)
2) ระบุตัวใครตัวมัน	22.86 (48)
3) ระบุอายุ-ไม่กล้าพูด	12.38 (26)
4) ไม่มีเวลาว่าง	6.19 (13)

แม่บ้านร้อยละ 71.90 ไม่เคยคิดจะตรงเคสโรคเอดส์ในชุมชน โดยไม่ยอมระบุเหตุผลมากที่สุดร้อยละ 23.81 ระบุตัวใครตัวมันร้อยละ 22.86 สำหรับในรายที่ตั้งใจชักชวนเพื่อนบ้านให้ป้องกันเคสมีเพียงร้อยละ 21.90 โดยการเตือนให้เลิกสูบบุหรี่มากที่สุดร้อยละ 3.81 เท่านั้น