

ตารางที่ 3. เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลระหว่างการศึกษากับการศึกษาก่อนใน
แต่ละระยะ ดังนี้

ตารางที่ 3-1 ก่อนรังสีรักษา

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล/การศึกษาที่สอดคล้อง	จำนวน	อนวัช
แบบแผนที่ 1 การรับรู้สุขภาพและการดูแลสุขภาพ		
1.1 อนามัยส่วนบุคคลไม่ดีสัมพันธ์กับการดูแลตนเอง ได้น้อย		
1.2 ขาดความรู้เกี่ยวกับโรคและรังสีรักษา		
แบบแผนที่ 2 อาหารและการเผาผลาญสารอาหาร		
2.1 มีไข้ต่ำ ๆ		
แบบแผนที่ 3 การขับถ่าย		
3.1 การขับถ่ายเปลี่ยนแปลง		
แบบแผนที่ 4 แบบแผนกิจกรรมและการออกกำลังกาย		
4.1 สามารถทำกิจกรรมได้น้อย เนื่องจาก อ่อนเพลีย จากการเสียเลือด การตรวจที่ ยาวนาน		
แบบแผนที่ 5 การพักผ่อนและการนอนหลับ		
5.1 พักผ่อนไม่เพียงพอ		
แบบแผนที่ 6 สติปัญญาและการรับรู้		
6.1 เจ็บปวด		
6.2 ลังเลต่อการดำเนินชีวิต		
6.3 ลังเลต่อการเข้ารับรังสีภายนอกรักษา		
แบบแผนที่ 7 การรับรู้ตนเองและอัตมโนทัศน์		
7.1 สูญเสียภาพลักษณ์		
7.2 สูญเสียคุณค่าแห่งตน		
7.4 เบื่อหน่ายต่อการตรวจที่ยาวนาน		

แบบแผนที่ 8 บทบาทและสัมพันธภาพ		
8.1 แยกตนจากสังคม-รู้สึกถูกทอดทิ้ง		
8.2 สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น		
8.3 เสร็จไว้สภต่อการสูญเสียบทบาทและหน้าที่		
แบบแผนที่ 10 การปรับตัวและความทนทานต่อ ความเครียด		
10.1 วิตกกังวลต่อผลแทรกซ้อนของรังสีรักษา	*	*
10.2 ซึมเศร้า	*	*
แบบแผนที่ 11 คุณค่าและความเชื่อ		
11.1 ระบบค่านิยมของครอบครัวดีขึ้น		
11.2 ยึดมั่นต่อแผนการรักษาปัจจุบันกับ แผนการรักษาแบบโบราณ		
11.3 เชื่อพิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์ มีผล ต่อจิตใจ		

* ความสอดคล้องกับการศึกษา

ตารางที่ 3-2 เปรียบเทียบการศึกษาระหว่างรังสีรักษา

หัวข้อวิจัยทางการแพทย์/การศึกษาที่สอดคล้อง	เพมพล	จิรพรหม	Woodtis(91)	woodtis(92)
แบบแผนที่ 1 การรับรู้สุขภาพและการดูแลสุขภาพ				
1.1 อนามัยส่วนบุคคลไม่สัมพันธ์กับการดูแลตนเอง ได้น้อยและอ่อนเพลีย				
1.3 ขาดความรู้ในการดูแลตนเอง	*			
แบบแผนที่ 2 อาหารและการเผาผลาญสารอาหาร				
2.1 มีไข้ต่ำ ๆ ไข้สูงและหนาวสั่น	*			
2.2 รับประทานอาหารได้น้อย	*	*	*	*
2.3 เสี่ยงต่อการตกเลือดสัมพันธ์กับเกล็ดเลือดต่ำ สูญเสียเลือดและน้ำเหลืองยาวนาน	*	*	*	*
2.4 เสี่ยงต่อการติดเชื้อสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันโรคร่วม	*	*	*	*
แบบแผนที่ 3 การช้ำดำ				
3.1 การช้ำดำเปลี่ยนแปลง	*		*	
แบบแผนที่ 4 กิจกรรมและการออกกำลังกาย				
4.1 สามารถทำกิจกรรมได้น้อยสัมพันธ์กับอ่อนเพลีย ผลจากการเสียเลือด เห็นอวัยวะต่อ รักษาที่ยาวนาน	*		*	* King, et. al (1985)
4.2 เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสัมพันธ์กับการ วิ่งเร็ว-ปวดเมื่อยที่แขนและขา				
แบบแผนที่ 5 การพักผ่อนและการนอนหลับ				
5.1 พักผ่อนไม่เพียงพอ	*	*	*	*
แบบแผนที่ 6 สติปัญญาและการรับรู้				
6.1 เจ็บปวด	*		*	(1985)
6.2 ลังเลต่อการดำเนินชีวิต				
6.3 ลังเลต่อการเข้ารับรังสีภายนอกรักษา				
6.4 ลังเลต่อการเข้ารับการรักษา				

แบบแผนที่ 7 การรับรู้ตนเองและอัตมโนทัศน์				
7.1 สัญเสียภาพลักษณ์	*	*		
7.2 สัญเสียคุณค่าแห่งตน				
7.3 เหนืออห่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาที่ยาวนาน				
แบบแผนที่ 8 บทบาทและสัมพันธภาพ				
8.1 แยกตนจากสังคม-รู้สึกถูกทอดทิ้ง	*	*	*	*
8.2 สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น				
8.3 สัมพันธภาพในครอบครัวเลวลง		*	*	*
8.4 เสรีวิโสคต่อการสัญเสียบทบาทและหน้าที่	*	*	*	*
แบบแผนที่ 10 การปรับตัวและความทนทานต่อ ความเครียด				
10.1 วิตกกังวลต่อผลแทรกซ้อนของรังสีรักษา	*		*	*
10.2 วิตกกังวลต่ออันตรายจากการใส่แร่				
10.3 ซึมเศร้า		*	*	*
แบบแผนที่ 11 คุณค่าและความเชื่อ				
11.1 ระบบค้ำจุนครอบครัวดีขึ้น				
11.2 ระบบค้ำจุนครอบครัวเลวลง	*	*	*	*
11.3 หึดแย้งต่อแผนการรักษาปัจจุบันกับแผนการ รักษาแบบโบราณ	*			
11.4 เชื่อพิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์ มีผลต่อจิตใจ				

* การสอดคล้องกับการศึกษา

ตารางที่ 3-3 เปรียบเทียบการศึกษาหลังรังสีรักษากับการศึกษาอื่น

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล/การศึกษาสอดคล้อง				
แบบแผนที่ 3 แบบแผนการรับถ่าย				
3.1 การรับถ่ายเปลี่ยนแปลง				
แบบแผนที่ 8 บทบาทและสัมพันธภาพ				
8.1 บทบาทและสัมพันธภาพในครอบครัว				
แบบแผนที่ 10 ความเครียดและความทนทานต่อ ความเครียด				
10.1 วิตกกังวลต่ออันตรายจากการใส่แร่				
แบบแผนที่ 11 คุณค่าและความเชื่อ				
11.1 เชื้อพิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์ มีผลต่อจิตใจ				

ผนวก ข

3.1 ก่อนรังสีรักษา จากกรณีศึกษา 9 ราย

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล / กรณีศึกษาที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
แบบแผนที่ 1 อนามัยส่วนบุคคลไม่ดี สัมพันธ์กับการช่วยตนเองได้น้อยและอ่อนเพลีย	*	*					*			3
แบบแผนที่ 1 ขาดความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษาพยาบาล	*	*	*	*	*	*				6
แบบแผนที่ 2 มีไข้ต่ำ ๆ-ไข้สูง				*	*	*				3
แบบแผนที่ 2 รับประทานอาหารได้น้อย		*								1
แบบแผนที่ 3 การขับถ่ายเปลี่ยนแปลง (ท้องผูก แน่นท้อง ถ่ายเหลว ปัสสาวะเองไม่ได้ ปัสสาวะ บ่อย แสบท่อปัสสาวะ)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9
แบบแผนที่ 4 สามารถทำกิจวัตรลดลงสัมพันธ์กับอ่อนเพลีย ผลจากการเสียเลือดและน้ำเหลือง รับประทานอาหารได้น้อย หรือการตรวจที่ยาวนาน	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9
แบบแผนที่ 5 หักผ่อนไม่เพียงพอ สัมพันธ์กับความเจ็บปวด (ปัสสาวะบ่อย วิตกกังวลต่อการรักษา แปลกที่ และมีเสียงรบกวนเวลานอน	*	*	*	*					*	5
แบบแผนที่ 6 เจ็บปวด(ปากมดลูก ช่องคลอด ปวดมวนท้อง ปวดบั้นเอว ปวดเมื่อยตามตัวและแขน-ขา)	*	*	*	*	*	*		*		7
แบบแผนที่ 6 ดังเลต่อการดำเนินชีวิต			*	*						2
แบบแผนที่ 6 ดังเลต่อการเข้ารับรังสีรักษา			*							1
แบบแผนที่ 7 สูญเสียภาพลักษณ์		*	*							2
แบบแผนที่ 7 เบื่อหน่ายต่อการตรวจที่ยาวนาน	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9
แบบแผนที่ 7 สูญเสียคุณค่าแห่งตน					*			*		2
แบบแผนที่ 8 เสรีวิาศต่อการสูญเสียบทบาทและหน้าที่ (กลัวรักษาไม่หาย กลัวถูกแยก)	*			*	*	*				4
แบบแผนที่ 8 แยกตัวจากสังคม-รู้สึกถูกทอดทิ้ง				*	*					2

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล / การศึกษาที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
แบบแผนที่ 8 สัมผัสเย็บแผลกับครอบครัววัด	*		*	*	*	*	*	*	*	8
แบบแผนที่ 10 วิตกกังวลต่อผลของรังสีรักษา(การใส่แร่ ค่ารักษาพยาบาล แทรกซ้อนของโรค การเป็้เภาวะ รับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว สูญเสียภาพลักษณ์ ผลกระทบจากการวินิจฉัย การละทิ้งงานอาชีพ การตรวจรักษานาน วิตกกังวลต่อความเจ็บป่วย	*	*	*	*	*	*	*		*	8
แบบแผนที่ 10 ซึมเศร้า	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9
แบบแผนที่ 11 ระบบคำจุนในครอบครัววัด	*	*	*		*			*	*	6
แบบแผนที่ 11 ทัศนัยแผนการรักษาปัจจุบันกับแผนการ การรักษาโบราณ	*		*							2
แบบแผนที่ 11 เชื้อพิธีกรรมทางศาสนาต่อจิตใจ	*		*				*			3

3.2 ระหว่างรังสีรักษาระยะ 2 สัปดาห์ จากกรณีศึกษา 9 ราย

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล/ลำดับกรณีศึกษาที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
แบบแผนที่ 1 อนามัยส่วนบุคคลไม่ได้สัมพันธ์กับความ อ่อนเพลีย/ความล้า	*				*	*	*			4
แบบแผนที่ 1 ขาดความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง					*					1
แบบแผนที่ 2 รับประทานอาหาร ได้น้อยสัมพันธ์กับคลื่นไส้ และอาเจียน(แน่นอึดอัดท้อง วิตกกังวล)	*	*	*	*			*	*		6
แบบแผนที่ 2 มีไข้และอาการหนาวสั่น			*	*		*	*			4
แบบแผนที่ 2 ผิวหนังหน้าท้องน้อยแห้งและมีอาการคัน							*	*		2
แบบแผนที่ 3 แบบแผนการหับถ่ายเปลี่ยนแปลง(ท้องผูก ท้องอืด ถ่ายเหลว ปัสสาวะขัด ปัสสาวะบ่อย)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9
แบบแผนที่ 4 ช่วยเหลือตนเองได้น้อยสัมพันธ์กับอ่อนเพลีย ผลจากการเสียเลือดและน้ำเหลือง /การรับประทานอาหาร อาหารได้น้อย เพราะมีอาการคลื่นไส้และอาเจียน	*		*	*		*				4
แบบแผนที่ 4 เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สัมพันธ์กับ อาการวิงเวียนและชาที่แขนและขา		*	*	*						3
แบบแผนที่ 5 นึกนอนไม่เพียงพอสัมพันธ์กับความเจ็บปวด (ปัสสาวะบ่อย วิตกกังวลต่อผลของการรักษา วิตกกังวลต่อการมีโรคแทรก)	*	*	*	*	*	*				6
แบบแผนที่ 6 เจ็บปวดปากมดลูก(ช่องคลอด หัวหน้า ตระโพก หลัง ท้องน้อย คอ ไหล่ น่อง ขาหนีบ)	*	*	*		*		*			5
แบบแผนที่ 6 ลังเลต่อรังสีรักษา					*			*		2
แบบแผนที่ 7 สูญเสียภาพลักษณ์	*		*	*	*	*				5
แบบแผนที่ 7 สูญเสียคุณค่าแห่งตน	*		*					*		3
แบบแผนที่ 7 เหนื่อยหน่ายที่ต้องเข้ารับการรักษานาน					*				*	2

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล / กรณีศึกษาที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
แบบแผนที่ 8 สัมพันธภาพของครอบครัวดี	*		*	*		*	*	*	*	7
แบบแผนที่ 8 เสรีไร้ศรัทธาต่อการเสียบทบาทมารดาและภรรยา*										1
แบบแผนที่ 8 แยกตัวจากสังคม-รู้สึกถูกทอดทิ้ง	*	*			*					1
แบบแผนที่ 10 ซึมเศร้า	*				*	*			*	4
แบบแผนที่ 10 วิตกกังวลต่อการดำเนินชีวิตของบุตร การต้องพ่กรักษาที่โรงพยาบาลนาน สูญเสีย อาชีพ การไร้แล้ว ค่ารักษาพยาบาลเป็นการระ ต่อบุคคลในครอบครัว ผลของรังสีต่อระบบชั้นถ่าย การสูญเสียภาพลักษณ์ สูญเสียสมรรถภาพทางเพศ สุขภาพโดยรวมลดลง สถานที่พิเคราะห์ระหว่างการรักษา การจัดการรักษาของแพทย์ที่อาจก่อความเจ็บปวด เลือดและน้ำเหลืองออกมาก ผลกระทบของรังสีรัก ษา การละทิ้งหน้าที่ การแพ้รังสี การรับประทาน อาหารได้น้อย รูเปิดของทวารตีบตัน เพื่อนบ้านนำ เรื่องราวไปพูด)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9
แบบแผนที่ 11 ขัดแย้งต่อแผนการรักษาปัจจุบันกับแบบโบราณ *	*						*			2
แบบแผนที่ 11 เชื่อต่อพิธีกรรมทางศาสนา มีผลต่อจิตใจ		*	*					*		3

3.4 ระหว่างรังสีรักษาระยะ 4-6 สัปดาห์ จากกรณีศึกษา 7 ราย

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล/ลำดับที่กรณีศึกษา	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
แบบแผนที่ 1 อนามัยส่วนบุคคลไม่ดี สัมพันธ์กับการดูแลตนเองได้น้อยจากการอ่อนเพลีย					*					1
แบบแผนที่ 2 มีไข้ต่ำ ๆ					*					1
แบบแผนที่ 2 เสี่ยงต่อการเสียเลือดและน้ำเหลือง			*					*		2
แบบแผนที่ 2 รับประทานอาหารได้น้อย สัมพันธ์กับคลื่นไส้ อาเจียน			*	*	*			*		4
แบบแผนที่ 2 ผิวหนังที่ง้ำมกันและชาหีบแตกเป็นแผล					*			*		2
แบบแผนที่ 3 การรับถ่ายเปลี่ยนแปลง (แน่นอึดอึดท้องถ่ายเหลว ท้องผูก ถ่ายเป็นเลือด ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะแสบท้อ)			*	*		*		*	*	5
แบบแผนที่ 4 สามารถทำกิจกรรมได้น้อยสัมพันธ์กับการขาดอาหาร เสี่ยงเลือดและน้ำเหลือง					*					1
แบบแผนที่ 5 พักผ่อนไม่เพียงพอ สัมพันธ์กับความเจ็บปวด (ความวิตกกังวล)			*		*					2
แบบแผนที่ 6 เจ็บปวดตามตัว(ช่องคลอด ชาหีบหัวหน้าว ตะโปก ท้องน้อย หลัง สะบัก ต้นคอและมือ)			*		*			*		3
แบบแผนที่ 6 ลังเลต่อการเข้ารับการรักษา					*					1
แบบแผนที่ 7 สูญเสียคุณค่าแห่งตน			*	*						2
แบบแผนที่ 7 รู้สึกมีความหวังจากโรค			*	*				*		3
แบบแผนที่ 7 เปื่อหน้าที่ต้องเข้ารับการรักษา				*					*	2
แบบแผนที่ 7 สูญเสียภาพลักษณ์			*	*	*					3
แบบแผนที่ 8 สัมพันธภาพกับครอบครัวดี			*	*	*			*	*	5

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล / กรณีศึกษาที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
แบบแผนที่ 10 วิตกกังวลต่อการปรับตัวทางเพศหลังการ รักษา(การรับประทานยาได้น้อย/การพักผ่อน ไม่เพียงพอ / ค่ารักษาพยาบาล/ผลลัพธ์จากการ รักษาที่อาจจะเลวลง / การเป็นภาระต่อสามีและ / การแพ้งงส์รักษา การถ่ายเหลว ผื่นที่ผิวหนัง สูญเสียบทบาทในครอบครัวและอาชีพ / การถูกแยก ระหว่างใส่แร่ / ความเจ็บปวดจากการใส่แร่) การปรับตัวทางเพศ กังวลต่อความเจ็บป่วยของ สมาชิกในครอบครัว			*	*				*	*	4
แบบแผนที่ 10 ซึมเศร้า กลัวตาย			*	*	*		*			4
แบบแผนที่ 11 เชื่อในพิธีกรรมทางศาสนามีผลต่อจิตใจ			*							1
แบบแผนที่ 11 ไม่เชื่อในแผนการรักษาโบราณ				*					*	2

3.5 หลังรังสีรักษา 1 เดือน กรณีศึกษา 4 ราย

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล/ลำดับที่กรณีศึกษา	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
แบบแผนที่ 3 การขับถ่ายผิดปกติ(ท้องผูก ถ่ายเหลว)								*	*	2
แบบแผนที่ 8 สัมพันธภาพของครอบครัวดี						*	*	*	*	4
แบบแผนที่ 10 วิตกกังวลต่ออันตรายจากแร่						*	*	*	*	4
แบบแผนที่ 11 เชื่อพิธีกรรมทางศาสนามีผลต่อจิตใจ							*	*	*	3