

ข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการทำเรซินบอนด์บริดจ์ INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS

ข้อบ่งชี้ในการทำเรซินบอนด์บริดจ์ INDICATIONS

- 1) เป็นการใส่ฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันซึ่งสูญหายไปเพียง 1 หรือ 2 ซี่ โดยฟันหลักจะต้องมีสภาพดีไม่มีรอยผุมากนักเพื่อจะได้มีปริมาณเคลือบฟันมากพอสำหรับยึดบริดจ์
- 2) ใช้ในการเข้าเผือกฟันซึ่งโยกจากโรคปริทันต์ เป็นการผูกฟันเหล่านั้นเข้าด้วยกัน อันจะช่วยลดและกระจายแรงที่จะลงมายังฟันซี่ใดซี่หนึ่งให้น้อยลง
- 3) ใช้ภายหลังการจัดฟันเพื่อให้ฟันที่ได้รับการจัดแล้วคงอยู่ในตำแหน่งเดิม
- 4) ใช้ร่วมกับงานครอบและสะพานฟัน ในกรณีที่ฟันหลักซี่ใดซี่หนึ่งจำเป็นต้องทำครอบฟันในขณะที่ฟันหลักซี่อื่นสามารถทำแบบเรซินบอนด์ได้

ข้อห้ามในการทำเรซินบอนด์บริดจ์ CONTRAINDICATIONS

- 1) ในกรณีที่ฟันหลักไม่มีปริมาณเคลือบฟันมากพอสำหรับยึดบริดจ์ ได้แก่ฟันหลักที่ผุหรือสึกกร่อนมากๆ ฟันที่ได้รับการบูรณะด้วยวัสดุอุดเป็นบริเวณกว้าง ฟันเหล่านี้จะไม่มีปริมาณเคลือบฟันมากพอสำหรับขั้นตอนการกัดด้วยกรดเพื่อยึดติดด้วยเรซินซีเมนต์
- 2) ฟันหลักที่ไม่สวยงาม อาจเนื่องมาจากเป็นฟันเปลี่ยนสี เช่น ฟันเตตราไซคลิน (Tetracyclin stain) ฟันที่มีรูปร่างผิดปกติ หรือฟันที่ล้มเก เพราะการทำเรซินบอนด์บริดจ์จะไม่ช่วยแก้ไขสภาพฟันของผู้ป่วยให้สวยงามขึ้นแต่ประการใด
- 3) ในกรณีที่สูญเสียฟันต่อเนื่องกันเป็นจำนวนหลายซี่ไม่ควรทำเรซินบอนด์บริดจ์ มีรายงานว่าเรซินบอนด์บริดจ์ที่ประกอบด้วยฟันหลักหลายซี่ หรือพอนติกหลายซี่จะมีอัตราการทำหลุดสูงกว่าปกติ¹⁹
- 4) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีสุขภาพในช่องปากไม่ดี (Poor oral hygiene) หรือไม่สามารถรักษาสุขภาพในช่องปากให้อยู่ในสภาพดีได้
- 5) ในรายที่มีประวัติแพ้สารจำพวกนิกเกิล (Nickel) หรือสารผสมชนิดอื่นในโครงโลหะของบริดจ์