

## ผลการศึกษา

ผู้ให้สัมภาษณ์จากหมู่บ้าน 7 แห่งในตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 164 คน ในการสำรวจครั้งที่ 1 และ 152 คน ในการสำรวจครั้งที่ 2 (ตารางที่ 1) ส่วนใหญ่เป็นมารดาของทารก (ตารางที่ 2) ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าขยาย (ตารางที่ 3) ครอบครัวที่ต้องดูแลเด็กวัยก่อนเรียนมากกว่า 1 คน มีประมาณร้อยละ 50 และ 60 ในการสำรวจครั้งที่ 1 และ 2 ตามลำดับ (ตารางที่ 4) ในการสำรวจครั้งที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่รู้จักรอคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และโปลิโอ แต่รู้จักวัณโรคคอควร และรู้จักโรคหัดกันแพร่หลาย ผู้ที่รู้จักโรคต่าง ๆ เหล่านี้ (ยกเว้นโรคหัดซึ่งรู้จักกันดี และโรคคอคอตีบซึ่งเป็นที่รู้จักน้อยที่สุด) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการสำรวจครั้งที่ 2 (ตารางที่ 5) และในกลุ่มผู้ที่รู้จักโรคดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่เห็นว่าโรคเหล่านี้ (ยกเว้นโรคหัด) เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากและมีวัคซีนป้องกัน ทั้งในการสำรวจครั้งที่ 1 และ 2 แต่ในการสำรวจครั้งที่ 2 ผู้ที่รู้จักโรคเหล่านี้จัดระดับอันตรายของโรคไว้ระดับปานกลาง ในสัดส่วนที่สูงกว่าการสำรวจครั้งที่ 1 (ตารางที่ 6,7) เกือบทุกคนเชื่อในประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรคทั้งที่ได้รับจากสถานเอนามัยและโรงพยาบาล (ตารางที่ 8,9)

สำหรับวัคซีนที่ให้ในทารก ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทั้งการสำรวจครั้งที่ 1 และ 2 ไม่ทราบชนิดของวัคซีนและโรคที่วัคซีนสามารถป้องกันได้ (ตารางที่ 10,11) แต่ทราบว่าควรพาทารกไปรับวัคซีนที่สถานเอนามัยหรือโรงพยาบาล (ตารางที่ 12) โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้บอกให้ทราบในสัดส่วนสูงสุด อสม. ผล. และเพื่อนมีบทบาทในเรื่องเหล่านี้น้อย (ตารางที่ 13) ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบทั้งหมดยินดีพาทารกไปรับวัคซีนหากเห็นว่าโรคนั้นเป็นอันตรายต่อทารกมาก (ตารางที่ 14) อัตราการเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (ดีพีที) ในการสำรวจครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ 1 ทำให้อัตราผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน ดีพีที ลดลงจากร้อยละ 62.19 เหลือเพียงร้อยละ 39.47 และอัตราผู้ได้รับวัคซีน ดีพีที ครบ 3 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.32 เป็นร้อยละ 14.47 (ตารางที่ 15) เหตุผลสำคัญที่ทำให้ทารกได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 ครั้ง ในการสำรวจครั้งที่ 1 คือ ร้อยละ 52.27 อยู่ในระหว่างการฉีด ร้อยละ 18.18 ไม่ทราบถึงความจำเป็นที่ต้องได้รับครบ 3 ครั้ง และร้อยละ 11.36 ไม่ว่าง ส่วนการสำรวจครั้งที่ 2 ก็ได้ผลคล้ายคลึงกับครั้งที่ 1 แต่เหตุผลว่าไม่ว่างมีอัตราเพิ่มขึ้นและสูงกว่าเหตุผลว่าไม่ทราบ ในขณะที่เหตุผลว่าไม่ทราบและอยู่ในระหว่างการฉีดครั้งต่อไปมีอัตราลดลง (ตารางที่ 16) สำหรับเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทารกไม่เคยได้รับวัคซีนจากการสำรวจครั้งที่ 1 ได้แก่ ทารกอายุยังไม่ครบ 2 เดือน, ไม่ทราบว่าทารกควรได้รับวัคซีน, และเห็นว่าทารกสบายดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.47, 23.53 และ 19.61 ตามลำดับ ในการสำรวจครั้งที่ 2 ปรากฏว่าเหตุผลว่าไม่ว่างมีอัตราเพิ่มขึ้นและสูงกว่าเหตุผลอื่น ๆ รองลงมาได้แก่ ทารกอายุยังไม่ครบ 2 เดือน และไม่ทราบ ตามลำดับ (ตารางที่ 17)

เมื่อพิจารณาเฉพาะทารกที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยที่ควรได้รับวัคซีน ดีพีที ครบ 3 ครั้งแล้วนั้น พบว่า ทารกที่ไม่เคยได้รับวัคซีน ดีพีที ในการสำรวจครั้งที่ 2 เปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งที่ 1 มีอัตราการลดลงจากร้อยละ 40.28 เป็นร้อยละ 24.47 และอัตราการเคยได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอัตราการได้รับครบ 3 ครั้งเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 16.67 เป็นร้อยละ 23.40 (ตารางที่ 18)

หากแยกทารกตามที่อยู่อาศัย จะได้ว่าในการสำรวจครั้งที่ 1 ทารกในหมู่ที่ 7 มีอัตราการเคยได้รับวัคซีน ดีพีที สูงสุด รองลงมาได้แก่ ทารกในหมู่ที่ 1, 2, 5, 3, 4 และ 6 ตามลำดับ แต่อัตราการได้รับวัคซีน ดีพีที ครบ 3 ครั้ง พบในหมู่ที่ 5 มากที่สุด รองลงมาได้แก่ทารกในหมู่ที่ 1, 7, 2, 3 และ 6 ส่วนหมู่ที่ 4 ไม่พบทารกที่ได้รับวัคซีน ดีพีที ครบ 3 ครั้ง และในการสำรวจครั้งที่ 2 พบว่า ทารกในทุกหมู่ (ยกเว้นหมู่ที่ 1) มีอัตราการเคยได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น ซึ่งพบสูงสุดในหมู่ที่ 7 เช่นเดิม รองลงมาได้แก่หมู่ที่ 2, 5, 4, 6, 3 และ 1 ตามลำดับ ส่วนอัตราการได้รับวัคซีน ดีพีที ครบ 3 ครั้ง พบสูงสุดในทารกหมู่ที่ 7 เช่นกัน รองลงมาได้แก่หมู่ที่ 2, 5, 4, 1 และ 6 ตามลำดับ และหมู่ที่ 3 ไม่มีทารกได้รับวัคซีน ดีพีที ครบ 3 ครั้งเลย (ตารางที่ 19)

ตารางที่ 1 จำนวนการรบกแยกตามหมู่บ้าน ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

หมู่บ้านที่	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	18	10.98	12	7.89
2	38	23.17	45	29.61
3	33	20.12	22	14.47
4	14	8.54	11	7.24
5	11	6.71	10	6.58
6	32	19.51	37	24.34
7	18	10.98	15	9.87
รวม	164	100.01	152	100.00

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ปกครองทารกจำแนกตามความสัมพันธ์กับทารก ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

ความสัมพันธ์	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มารดา	138	84.15	134	88.16
บิดา	16	9.76	17	11.18
ยาย/ย่า	7	4.27	1	0.66
ตา/ปู่	1	0.61	-	-
อื่น ๆ เช่น พี่สาว	2	1.22	-	-
รวม	164	100.01	152	100.00

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามลักษณะครอบครัว ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

ลักษณะครอบครัว	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เดี่ยว	92	56.10	122	80.26
ขยาย	72	43.90	30	19.74
รวม	164	100.00	152	100.00

ตารางที่ 4 จำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามจำนวนเด็กก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) ที่อยู่ในความดูแล ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

จำนวนเด็ก	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	81	49.39	59	38.82
2	71	43.29	74	48.68
3	10	6.10	18	11.84
4	2	1.22	1	0.66
รวม	164	100.01	152	100.00

ตารางที่ 5 จำนวนผู้ปกครองทารกจำแนกตามการรู้จักโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในทารก ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

โรค	สำรวจครั้งที่ 1	สำรวจครั้งที่ 2	สำรวจครั้งที่ 3
<u>วัดโรค</u>			
รู้จัก	90	140	53.328
ไม่รู้จัก	74	12	(P = 7.662E-11)
<u>คอฮีน</u>			
รู้จัก	19	30	3.403
ไม่รู้จัก	145	122	(P = .0651)
<u>ไอกรน</u>			
รู้จัก	30	95	62.643
ไม่รู้จัก	134	57	(P = 7.580E-11)
<u>บาดทะยัก</u>			
รู้จัก	42	121	89.940
ไม่รู้จัก	122	31	(P = 7.590E-11)
<u>โปลิโอ</u>			
รู้จัก	26	67	28.916
ไม่รู้จัก	138	85	(P = 7.567E-08)
<u>หัด</u>			
รู้จัก	138	135	1.093
ไม่รู้จัก	26	17	(P = .2958)

ตารางที่ 6 จำนวนผู้ประกอบการที่รู้จัก วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ และหัด  
จำแนกตามการรู้จักวัคซีนป้องกันโรค ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

วัคซีน	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>วัณโรค</u>				
มี	59	65.56	140	100.00
ไม่มี	22	24.44	-	-
ไม่ทราบ	9	10.00	-	-
<u>คอตีบ</u>				
มี	17	89.47	30	100.00
ไม่มี	2	10.53	-	-
ไม่ทราบ	-	-	-	-
<u>ไอกรน</u>				
มี	22	73.33	95	100.00
ไม่มี	7	23.33	-	-
ไม่ทราบ	1	3.33	-	-
<u>บาดทะยัก</u>				
มี	33	78.57	120	99.17
ไม่มี	8	19.05	1	0.83
ไม่ทราบ	1	2.38	-	-
<u>โปลิโอ</u>				
มี	19	73.08	66	98.51
ไม่มี	4	15.38	1	1.49
ไม่ทราบ	3	11.54	-	-
<u>หัด</u>				
มี	53	38.41	132	97.78
ไม่มี	51	36.95	3	2.22
ไม่ทราบ	34	24.64	-	-

ตารางที่ 7 จำนวนผู้ปกครองทารกที่รู้จัก วัณโรค คอติบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ และหัด  
จำนวนกตามการรู้จักอันตรายจากโรค ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

อันตรายจากโรค	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>วัณโรค</u>				
น้อย	1	1.11	1	0.71
ปานกลาง	7	7.78	4	2.86
มาก	77	85.56	135	96.43
ไม่ทราบ	5	5.55	-	-
<u>คอติบ</u>				
น้อย	2	10.53	-	-
ปานกลาง	2	10.53	11	36.67
มาก	15	78.94	19	63.33
ไม่ทราบ	-	-	-	-
<u>ไอกรน</u>				
น้อย	3	10.00	-	-
ปานกลาง	2	6.67	24	25.26
มาก	25	83.33	71	74.74
ไม่ทราบ	-	-	-	-
<u>บาดทะยัก</u>				
น้อย	1	2.38	2	1.65
ปานกลาง	4	9.52	53	43.80
มาก	37	88.10	66	54.55
ไม่ทราบ	-	-	-	-

ตารางที่ 7 (ต่อ)

อันตรายจากโรค	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>โปลิโอ</u>				
น้อย	1	3.85	-	-
ปานกลาง	1	3.85	28	41.79
มาก	23	88.46	39	58.21
ไม่ทราบ	1	3.85	-	-
<u>หัด</u>				
น้อย	70	50.72	41	30.37
ปานกลาง	21	15.22	51	37.78
มาก	38	27.54	43	31.85
ไม่ทราบ	9	6.52	-	-

ตารางที่ 8 จำนวนผู้ปกครองทารก จำแนกตามความเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันโรคของวัดชิน ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

การป้องกันโรคของวัดชิน	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เชื่อ	151	92.07	152	100.00
ไม่เชื่อ	2	1.22	-	-
ไม่แน่ใจ	11	6.71	-	-
รวม	164	100.00	152	100.00



ตารางที่ 9 จำนวนผู้ปกครองทารก จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนที่ได้จากสถานอนามัยและโรงพยาบาล ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

ประสิทธิภาพของวัคซีน	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เท่ากัน	126	76.83	146	96.05
ไม่เท่ากัน	10	6.10	3	1.97
ไม่แน่ใจ	28	17.07	3	1.97
รวม	164	100.00	152	99.99

ตารางที่ 10 จำนวนผู้ปกครองทารก จำแนกตามความรู้เกี่ยวกับชนิดของวัคซีนที่ให้ในทารก ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับชนิดของวัคซีน	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>ชนิดฉีด</b>				
รู้จัก 1 ชนิด	8	4.88	7	4.60
รู้จัก 2 ชนิด	10	6.10	25	16.45
รู้จัก 3 ชนิด	15	9.15	21	13.82
ไม่รู้จัก	131	79.88	99	65.13
<b>ชนิดหยอด</b>				
รู้จัก	7	4.27	47	30.92
ไม่รู้จัก	157	95.73	105	69.08
รวม	164	100.01	152	100.00

ตารางที่ 11 จำนวนผู้ปกครองทารก จำแนกตามการรู้จักชนิดของโรคที่วัคซีนสามารถป้องกันได้ ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

โรค	สำรวจครั้งที่ 1				สำรวจครั้งที่ 2			
	ทราบ		ไม่ทราบ		ทราบ		ไม่ทราบ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
วัณโรค	27	16.46	137	83.54	79	51.97	73	48.03
คอตีบ	43	26.22	121	73.78	55	36.18	97	63.82
ไอกรน	40	24.39	124	75.61	70	46.05	82	53.95
บาดทะยัก	51	31.10	113	68.90	88	57.89	64	42.11
โปลิโอ	18	10.98	146	89.02	52	34.21	100	65.79
หัด	17	10.37	147	89.63	52	34.21	100	65.79

ตารางที่ 12 จำนวนผู้ปกครองทารก จำแนกตามการรู้จักสถานที่ให้บริการภูมิคุ้มกันโรค ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

การรู้จักสถานที่ให้บริการ	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รู้จัก	136	82.93	129	84.87
ไม่รู้จัก	28	17.07	23	15.13
รวม	164	100.00	152	100.00

ตารางที่ 13 จำนวนผู้ปกครองทารก จำแนกตามบุคคลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจหาทารกไปรับวัคซีน ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

ทารกควรได้รับวัคซีน	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ทราบจาก				
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	99	60.37	120	78.95
- เพื่อนบ้าน	8	4.88	9	5.92
- อสม., พสส.	2	1.21	1	0.66
- สมาชิกในครอบครัว (มารดา, สามี)	2	1.21	-	-
- วิทยุและหนังสือ	3	1.83	-	-
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข + ผู้ใหญ่บ้าน + เพื่อนบ้าน	1	0.61	8	5.26
2. ไม่ทราบ	49	29.88	14	9.21
รวม	164	99.99	152	100.00

ตารางที่ 14 จำนวนผู้ปกครองทารก จำแนกตามการยินดียินร้ายการไปรับวัคซีนในกรณีเป็นโรคอันตราย ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

การไปรับวัคซีน	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไป	154	93.90	145	95.39
ไม่ไป	5	3.05	1	0.66
ไม่แน่ใจ	5	3.05	6	3.95
รวม	164	100.00	152	100.00

ตารางที่ 15 จำนวนทารก จำแนกตามการรับบริการวัคซีน ดีพิที้ ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

การรับบริการวัคซีน ดีพิที้	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับ 1 ครั้ง	29	17.68	35	23.03
ได้รับ 2 ครั้ง	15	9.15	29	19.08
ได้รับ 3 ครั้ง	12	7.32	22	14.47
ไม่เคยได้รับ	102	62.19	60	39.47
ไม่ทราบ	6	3.66	6	3.95
รวม	164	100.00	152	100.00

ตารางที่ 16 จำนวนทารก จำแนกตามเหตุผลที่ผู้ปกครองนำไปรับบริการวัคซีน ดีพีที และ โอปวีวี ไม่ครบ 3 ครั้ง ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

เหตุผลที่ผู้ปกครองนำไปรับวัคซีน ดีพีที และ โอปวีวี ไม่ครบ 3 ครั้ง	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
- ไม่ทราบว่าทารกควรได้รับวัคซีนครบ 3 ครั้ง	8	18.18	9	14.06
- ไม่ว่าง	5	11.36	16	25.00
- จำวันนัดไม่ได้	1	2.27	2	3.13
- ยังไม่ถึงวันนัดครั้งต่อไป	23	52.27	25	39.06
- นัดกำหนดแล้วจึงไม่กล้านำทารกไป	4	9.09	-	-
- หมอไม่ได้นัด	3	6.82	-	-
- เด็กไม่สบายหลังฉีด	-	-	3	4.69
- ไม่ว่างและจำวันนัดไม่ได้	-	-	6	9.38
- ไม่ว่างและ เด็กไม่สบายหลังฉีด	-	-	1	1.56
- ไม่ทราบว่าทารกควรได้รับวัคซีนครบ 3 ครั้ง + ไม่ว่าง + นัดกำหนด	-	-	1	1.56
- ไม่ทราบว่าทารกควรได้รับวัคซีนครบ 3 ครั้ง + ไม่ว่าง + จำวันนัดไม่ได้	-	-	1	1.56
รวม	44	99.99	64	100.00

ตารางที่ 17 จำนวนทารก จำแนกตามเหตุผลที่ไม่เคยได้รับวัคซีน ดีพีที และ โอพีวี  
ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

เหตุผลที่ไม่เคยได้รับวัคซีน ดีพีที และ โอพีวี	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
- อายุไม่ครบ 2 เดือน	27	26.47	17	28.33
- ไม่ทราบว่าทารกควรได้รับวัคซีน	24	23.53	12	20.00
- ทารกสบายดี	20	19.61	1	1.67
- ผู้ปกครองไม่ว่างพาไป	8	7.84	18	30.00
- ทารกไม่สบายวันนัด	7	6.86	3	5.00
- กลัวทารกเจ็บ	4	3.92	-	-
- กลัวทารกไม่สบายหลังฉีด	2	1.96	-	-
- เห็นเด็กคนอื่นเขาเบ่หลังฉีด	2	1.96	1	1.67
- ทารกเพิ่งได้รับวัคซีน บีซีจี และยังไม่ถึง วันนัดไปรับวัคซีน ดีพีที และ โอพีวี	2	1.96	1	1.67
- จำวันนัดไม่ได้	1	0.98	-	-
- พันกำหนดแล้วไม่กล้าพาทารกไป	1	0.98	1	1.67
- ไม่ทราบว่าทารกควรได้รับวัคซีน + กลัวทารกเจ็บ และไม่สบายหลังฉีด	1	0.98	-	-
- รอให้ทารกอายุครบ 3 เดือน	1	0.98	-	-
- ระยะทางไกล	1	0.98	-	-
- ไปแล้วเจ้าหน้าที่ไม่อยู่	1	0.98	-	-
- เจ้าหน้าที่ไม่นัด	-	-	2	3.33
- ไม่ว่าง และพันกำหนดแล้วไม่กล้าพาไป	-	-	2	3.33
- ไม่ทราบ + ไม่ว่าง และจำวันนัดไม่ได้	-	-	1	1.67
- ไม่ว่าง และจำวันนัดไม่ได้	-	-	1	1.67
รวม	102	99.99	60	100.01

ตารางที่ 18 จำนวนทารกที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จำแนกตามการได้รับวัคซีน ดีพีที และ โอปวี ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

วัคซีน ดีพีที และ โอปวี	สำรวจครั้งที่ 1		สำรวจครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับ 1 ครั้ง	14	19.44	21	22.34
ได้รับ 2 ครั้ง	12	16.67	23	24.47
ได้รับ 3 ครั้ง	12	16.67	22	23.40
ไม่เคยได้รับ	29	40.28	23	24.47
ไม่ทราบ	5	6.94	5	5.32
รวม	72	100.00	94	100.00

ตารางที่ 19 จำนวนการกักจำแนกตามรายหมู่บ้าน และการได้รับวัคซีน ดีพีที และ โอฟีวี ก่อนและหลังการให้สุศึกษา

หมู่ที่	การได้รับวัคซีน ดีพีที และ โอฟีวี									
	ครบ 3 ครั้ง		ไม่ครบ 3 ครั้ง		ไม่เคยได้รับ		ไม่ทราบ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>สำรวจครั้งที่ 1</u>										
1	3	16.67	8	44.44	7	38.89	-	-	18	100.00
2	3	7.89	15	39.47	17	44.74	3	7.89	38	99.99
3	1	3.03	5	15.15	26	78.79	1	3.03	33	100.00
4	-	-	2	14.29	12	85.71	-	-	14	100.00
5	2	18.18	2	18.18	6	54.55	1	9.09	11	100.00
6	1	3.13	1	3.13	29	90.62	1	3.13	32	100.01
7	2	11.11	11	61.11	5	27.78	-	-	18	100.00
<u>สำรวจครั้งที่ 2</u>										
1	1	8.33	4	33.33	7	58.33	-	-	12	100.00
2	11	24.44	20	44.44	12	26.67	2	4.44	45	99.99
3	-	-	9	40.91	12	54.55	1	4.54	22	100.00
4	1	9.09	5	45.45	5	45.45	-	-	11	99.99
5	2	20.00	4	40.00	2	20.00	2	20.00	10	100.00
6	2	5.41	15	40.54	19	51.35	1	2.70	37	100.00
7	4	26.67	8	53.33	3	20.00	-	-	15	100.00