

สารบัญ

หน้า

กิจกรรมประจำ	I
บทคัดย่อภาษาไทย	III
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	V
สารบัญตาราง	IX
สารบัญรูป	X
 บทที่ 1 บทนำ	1
ที่มาของปัญหาและเหตุผลเบื้องหลังการวิจัย	2
จุดมุ่งหมายของการศึกษา	5
สมมติฐานของการศึกษา	6
ข้อจำกัดในการศึกษา	6
นิยามศัพท์เฉพาะ	8
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการอ่อนแหนความคิด	14
ความหมายและประโยชน์ของการผ่าตัวตาย	14
กระบวนการพฤติกรรมของการผ่าตัวตาย	17
สาเหตุของการผ่าตัวตาย	20
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	34
กรอบแแนวความคิด	37
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย	38
กลุ่มตัวอย่างและขนาด	38
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	38
วิธีการรวบรวมข้อมูล	43
การวิเคราะห์ข้อมูล	44
บทที่ 4 ผลการวิจัย	47
สังเคราะห์และยังรวมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	47
ผลการวิจัยส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป	49
ผลการวิจัยส่วนที่ 2 : ทดสอบสมมติฐาน	55

	หน้า
บทที่ 5 บทวิเคราะห์และการอภิปรายผล	76
ลักษณะเชื่อมูลศ้านบประชากร สังคมจิตวิทยา	76
ความคิดเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ตัวชาย	87
บุคลิกภาพ	88
สุขภาพจิต	93
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและสุขภาพจิต	96
สมมติฐานระหว่างคะแนนจากแบบทดสอบบุคลิกภาพ MPI กับคะแนนจากแบบทดสอบสุขภาพจิต SCL-9	98
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ	99
เอกสารอ้างอิง	102
แนะนำผู้วิจัย	107
ตัวอย่างแบบสอบถามเชื่อมูลทั่วไป	108
ตัวอย่างแบบทดสอบบุคลิกภาพ MPI	114
ตัวอย่างแบบทดสอบสุขภาพจิต SCL-90	116

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 สัดส่วนของการผ่าตัวค่ายศึกษาฯจากการหายจากทุกสาเหตุ ปีพ.ศ.2500-2528	3
2 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามลักษณะประชากร	49
3 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามลักษณะทางสังคมจิตวิทยา	51
4 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามลักษณะทางสังคมจิตวิทยา (ต่อ)	52
5 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามลักษณะทางสังคมจิตวิทยา (ต่อ)	53
6 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามความคิด เกี่ยวกับการพยายามผ่าตัวค่าย	54
7 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยในแบบทดสอบบุคลิกภาพ MPI ของผู้ป่วยกับเกณฑ์มาตรฐานปกติ	55
8 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามชนิดของบุคลิกภาพ	56
9 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามชนิดของบุคลิกภาพ	56
10 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกับลุ่มอาการสุขภาพจิตของผู้ป่วย กับเกณฑ์มาตรฐานปกติ	58
11 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้สร้างเฉลี่ยกับลุ่มอาการสุขภาพจิตสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานปกติ	60
12 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามนิสัยทางประสาทในรักษาเด็ก	62
13 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามอาการแสดงก่อนพยายามผ่าตัวค่าย	64
14 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกับลุ่มอาการสุขภาพจิตของผู้ป่วย เก็บตัวกับเกณฑ์มาตรฐานปกติ	66
15 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกับลุ่มอาการสุขภาพจิตของผู้ป่วย แสดงตัวกับเกณฑ์มาตรฐานปกติ	67
16 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกับลุ่มอาการสุขภาพจิตของผู้ป่วย อารมณ์แปรปรวนหรื้นไหง่ายกับเกณฑ์มาตรฐานปกติ	68
17 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกับลุ่มอาการสุขภาพจิตของผู้ป่วย อารมณ์มึนคงกับเกณฑ์มาตรฐานปกติ	69
18 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกับลุ่มอาการสุขภาพจิตของผู้ป่วย อารมณ์แปรปรวนหรื้นไหง่ายกับผู้ป่วยอารมณ์มึนคง	70
19 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกับลุ่มอาการสุขภาพจิตของผู้ป่วย เก็บตัวกับผู้ป่วยแสดงตัว	72
20 สมมติฐานที่ระห่วงจะแบบในแบบวัดบุคลิกภาพ MPI (มีศักดิ์ความ แปรปรวนทางอารมณ์) กับคะแนนในแบบวัดสุขภาพจิต SCL-90	74
21 สมมติฐานที่ระห่วงจะแบบในแบบวัดบุคลิกภาพ MPI (มีศักดิ์สัมภพ) กับคะแนนในแบบวัดสุขภาพจิต SCL-90	75

สารบัญ

หัวที่	หน้า
1 แผนผังการแสดงกรอบพฤติกรรมของผู้ประกอบอัตลักษณ์บากกรรม	16
2 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามลักษณะทางประชากร	50
3 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามชนิดของบุคลิกภาพ	57
4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนในแบบวัดบุคลิกภาพ MPI ของผู้ป่วย กับเกณฑ์มาตรฐานปกติ	57
5 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกับสูมของการสุขภาพจิตของผู้ป่วย กับเกณฑ์มาตรฐานปกติ	65
6 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับค่าเฉลี่ยกับสูมของการสุขภาพจิตสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานปกติ	69
7 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามนิสัยทางประสาทในร่าย เสือ	61
8 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามอาการแสดงก่อนพยาบาลมีค่าความ	63
9 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกับสูมของการสุขภาพจิตของผู้ป่วย อาการมีเบรนบรานหรื้น ให้ว่าง่ายกับผู้ป่วยอารมณ์เมื่อง	71
10 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกับสูมของการสุขภาพจิตของผู้ป่วย เก็บคัวกับผู้ป่วยแสดงคัว	73