

## บทที่ 4

### ผลการวิจัย

#### ลักษณะและอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย จึงใช้สัญลักษณ์และอักษรย่อต่อไปนี้

- > แทน มากกว่า
- < " น้อยกว่า
- N " จำนวนคนปกติ
- n " จำนวนผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย
- % " ค่าร้อยละ
- $\mu$  " คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มปกติ
- x " คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย
- S " ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มปกติ
- Sd " ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย
- t " ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยสองกลุ่ม
- r " ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
- \* " ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- \*\* " ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
- \*\*\* " ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
- Som " กลุ่มอาการผิดปกติทางร่างกาย
- O - C " กลุ่มอาการยังคิดยังไม่หาย
- IS " กลุ่มอาการความรู้สึกไม่ชอบคิดต่อกับคนอื่น
- D " กลุ่มอาการของอารมณ์เศร้า
- A " กลุ่มอาการและพฤติกรรม ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกกังวลต่าง ๆ
- H " กลุ่มความคิด อารมณ์ หรือการกระทำที่มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง
- PH " กลุ่มอาการกลัว โศก ไม่มีเหตุผล

PAR	"	กลุ่มความวิตกกังวล
Psy	"	กลุ่มอาการทางจิต
Norm	"	กลุ่มคนปกติ
Suicides	"	กลุ่มผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย
Extrovert	"	ผู้ป่วยที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย
Introvert	"	ผู้ป่วยที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว
Neurotic	"	ผู้ป่วยที่มีอารมณ์แปรปรวน หวั่นไหวง่าย
Stable	"	ผู้ป่วยที่มีอารมณ์มั่นคง

### การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 : ทดสอบสมมติฐาน 5 ข้อ คือ

- 2.1 ค่าเฉลี่ยในแบบวัดบุคลิกภาพ MPI ของผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย จะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานปกติ
- 2.2 ค่าเฉลี่ยในแบบวัดสุขภาพจิต SCL-90 ของผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายจะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานปกติ
- 2.3 ค่าเฉลี่ยในแบบวัดสุขภาพจิต SCL-90 ของผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย ที่มีบุคลิกภาพแบบอารมณ์แปรปรวน หวั่นไหวง่าย (Neurotic) จะสูงกว่าผู้ป่วยที่มีบุคลิกภาพแบบอารมณ์มั่นคง (Stability)
- 2.4 ค่าเฉลี่ยในแบบวัดสุขภาพจิต SCL-90 ของผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว (Introvert) จะสูงกว่าผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extrovert)
- 2.5 คะแนนในแบบวัดบุคลิกภาพ MPI กับคะแนนในแบบวัดสุขภาพจิต SCL-90 ในผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย จะมีความสัมพันธ์กันในทางบวก







ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป




ตารางที่ 2 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามลักษณะประชากร


ลักษณะทางสังคมจิตวิทยา	ผู้ป่วย		หมายเหตุ
	จำนวน	ร้อยละ	
1. อายุ			Max=50 Min=12 Median=23
12 - 20	24	36.36	
21 - 45	40	60.61	
46 - 50	3	4.55	
2. เพศ			
หญิง	49	72.24	
ชาย	17	25.76	
3. สถานภาพสมรส			
โสด	36	54.55	
สมรส	29	43.94	
หม้าย, หย่า	1	1.52	
4. การศึกษา			
ไม่ได้เรียน	4	6.06	
ประถมศึกษา	47	71.21	
มัธยมศึกษา	8	12.12	
อุดมศึกษา	7	10.61	
5. อาชีพ			
ทำไร่ทำนา	34	51.52	
รับจ้างทั่วไป	11	16.67	
แม่บ้าน	7	10.61	
นักเรียน นักศึกษา	6	9.07	
ค้าขาย	5	7.58	
ข้าราชการ	3	4.55	
6. ที่อยู่อาศัย			
อำเภอเมือง จ.โคราช	16	24.24	
อำเภออื่น ๆ จ.โคราช	47	71.21	
จังหวัดอื่น ๆ	3	4.53	
รวม	66	100.00	

FIGURE 2

DEMOGRAPHIC DATA


% Graph	1	2	3	4	5	6
	60.61	74.24	54.55	71.21	51.52	53.03
	34.84	25.76	43.94	12.12	16.67	43.94
	4.55		1.52	10.61	10.61	3.03
				6.06	9.07	
					7.58	
					4.55	

-  21-45 years
-  12-21 years
-  46-50 years







1. AGE

-  Female
-  Male








2. SEX

-  Single
-  Married
-  Once Married










3. MARITAL STATUS

-  Primary Sch
-  Secondary Sch
-  Graduate
-  Uneducated






4. EDUCATION

-  Agriculture
-  Labour
-  House Holder
-  Student
-  Merchant
-  Govt. Officer



5. CAREER

-  >5
-  3-5
-  <3



6. NUMBER OF CHILDREN

ตารางที่ 3 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามลักษณะทางสังคมจิตวิทยา

ลักษณะทางสังคมจิตวิทยา	ผู้ป่วย		หมายเหตุ
	จำนวน	ร้อยละ	
<b>7. จำนวนที่น้อง</b>			
< 3 คน	2	3.03	Max=16
3 - 5 คน	29	43.94	Min=2
> 5 คน	35	53.03	Median=6
<b>8. ลำดับที่การเกิด</b>			
คนโต	15	22.73	
คนกลาง	40	60.60	
คนสุดท้อง	11	16.67	
<b>9. บุคคลที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ด้วย</b>			
บิดามารดา	11	16.17	
บิดามารดาและญาติ	21	31.82	
ญาติ	5	7.57	
สามีหรือภรรยา	4	6.06	
สามีหรือภรรยาและบุตร	19	28.78	
เพื่อน	5	7.58	
อยู่คนเดียว	1	1.52	
<b>10. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว</b>			
ทะเลาะเบาะแว้ง เป็นครั้งคราว	27	40.91	
ทะเลาะเบาะแว้ง เป็นประจำ	17	25.76	
รักใคร่กันดี	15	22.73	
เฉย ๆ ต่างคนต่างอยู่	7	10.60	
<b>11. บุคคลที่ผู้ป่วยทะเลาะด้วยก่อนพยายามฆ่าตัวตาย</b>			
สามีหรือภรรยาหรือแฟน	24	36.36	
บิดารดา	19	28.79	
ญาติ	10	15.15	
ลูก	3	4.55	
ไม่ทะเลาะกับใคร	10	15.15	
<b>รวม</b>	<b>66</b>	<b>100.00</b>	

ตารางที่ 4 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามลักษณะทางสังคมจิตวิทยา (ต่อ)

ลักษณะทางสังคมจิตวิทยา	ผู้ป่วย		หมายเหตุ
	จำนวน	ร้อยละ	
12. ปัญหาที่ผู้ป่วยกลุ้มใจ			ผู้ป่วยตอบได้มากกว่า 1 รายการ
ความรัก	26	39.39	
การเงิน	19	28.79	
ครอบครัว	14	21.21	
การป่วยกาย	9	13.64	
การงาน	9	13.64	
การป่วยจิต	4	6.06	
สิ่งเสียด	3	4.55	
ปัญหาทางเพศ	1	1.52	
การเรียน	1	1.52	
เพื่อน	1	1.52	
13. เหตุจูงใจของการพยายามฆ่าตัวตาย			ผู้ป่วยตอบได้มากกว่า 1 รายการ
อยากหนีความทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่	36	54.55	
ต้องการแก้แค้น ประชดประชัน	19	28.79	
มีเสียงและอำนาจลึกลับมาบงการ	10	15.15	
นึกสนุก อยากลอง	6	9.10	
อารมณ์ชั่ววูบ ทำไปโดยไม่รู้ตัว	4	6.06	
เลียนแบบตามคนอื่น	2	3.03	
14. ความรู้สึกของผู้ใกล้ชิดต่อการพยายามฆ่าตัวตายของผู้ป่วย (ตามความนึกคิดของผู้ป่วย)			ผู้ป่วยตอบได้มากกว่า 1 รายการ
ผิดหวัง เสียใจ	38	57.58	
ตั้งใจที่ผู้ป่วยได้รับการทรมาน	18	27.27	
เฉย ๆ	8	12.12	
เกลียดและไม่ให้อภัยผู้ป่วย	4	6.06	
สงสารและตามใจผู้ป่วยมากขึ้น	2	3.03	
ไม่ทราบ	1	1.52	

ตารางที่ 5 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามลักษณะทางสังคมจิตวิทยา (ต่อ)

ลักษณะทางสังคมจิตวิทยา	ผู้ป่วย		หมายเหตุ
	จำนวน	ร้อยละ	
15. ความรู้สึกของผู้ป่วยต่อการพยายามฆ่าตัวตายครั้งนี้			
เสียใจ	33	50.00	
เฉย ๆ	23	34.85	
กลัว	6	9.09	
ดีใจ ภูมิใจ สะใจ	3	4.55	
ไม่ทราบ	1	1.52	
16. การรับตัวของผู้ป่วยเมื่อมีเรื่อง ไม่สบายใจ			
เก็บไปคิดคนเดียว	38	57.58	
ระบายให้คนอื่นฟัง	8	12.12	
หางานอื่นทำ	8	12.12	
อื่น ๆ (ใช้มากกว่า 1 วิธี)	12	18.18	
17. ประสิทธิภาพฆ่าตัวตายของญาติพี่น้อง			
มี	10	15.15	
ไม่มี	56	84.85	
18. ประสิทธิภาพป่วยจิตของญาติพี่น้อง			
มี	18	27.27	
ไม่มี	48	73.73	
รวม	66	100.00	

**ตารางที่ 6** ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพยายามฆ่าตัวตาย

ความคิดเกี่ยวกับการ พยายามฆ่าตัวตาย	ผู้ป่วย		หมายเหตุ
	จำนวน	ร้อยละ	
<b>19. เวลาคิดก่อนตัดสินใจพยายามฆ่าตัวตาย</b>			
< 1 วัน	30	45.45	
1 - 2 วัน	15	22.73	
3 - 7 วัน	9	13.64	
8 - 30 วัน	5	7.58	
> 30 วัน	9	13.64	
<b>20. การแสดงเจตนาให้ทราบก่อนพยายามฆ่าตัวตาย</b>			
เคย	21	31.82	
ไม่เคย	45	68.18	
<b>21. ความถี่ของความคิดที่จะพยายามฆ่าตัวตาย (จากอดีตถึงปัจจุบัน)</b>			
1 ครั้ง	44	66.67	
2 ครั้ง	10	15.15	
3 ครั้ง	3	4.55	
4 ครั้ง	5	7.58	
> 4 ครั้ง	4	6.06	
<b>22. ความถี่ของการกระทำการพยายามฆ่าตัวตายจริง</b>			
1 ครั้ง	59	89.39	
2 ครั้ง	7	10.61	
<b>23. ความคิดจะพยายามฆ่าตัวตายอีกหลังจากออกจาก โรงพยาบาลไปแล้ว</b>			
คิด	1	1.52	
ไม่แน่ใจ	16	24.24	
ไม่คิด	49	72.24	
<b>รวม</b>	<b>66</b>	<b>100.00</b>	



ส่วนที่ 2 : ทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 1 : ค่าเฉลี่ยในแบบวัดบุคลิกภาพ MPI ของผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย จะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานปกติ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยในแบบวัดบุคลิกภาพ MPI ของผู้ป่วยกับเกณฑ์มาตรฐานปกติ

แบบวัดบุคลิกภาพ MPI	เกณฑ์มาตรฐานปกติ			ผู้ป่วย			t
	N	$\mu$	$\sigma$	n	$\bar{x}$	Sd	
Neuroticism Scale	300	24.39	5.40	66	32.59	8.86	7.52****
Extroversion Scale	300	25.50	6.88	66	27.45	7.05	2.24*

\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001


ตารางที่ 8 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามชนิดของบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ	จำนวน	ร้อยละ
Neuroticism Scale		
Neuroticism	50	75.76
Stability	16	24.24
Extraversion		
Introversion	25	37.88
Extroversion	41	62.12
รวม	66	100.00


ตารางที่ 9 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ	จำนวน	ร้อยละ
Extroversion - Neuroticism	34	51.51
Extroversion - Stability	7	10.61
Introversion - Neuroticism	17	25.76
Introversion - Stability	8	12.12
รวม	66	100.00

**Figure 3. Percentage of attempted suicide patients, classified according to personality traits.**



**Figure 4 Comparing mean differences on the MPI between attempted suicide patients and the norm.**




**สมมติฐานข้อที่ 2 :** ค่าเฉลี่ยในแบบวัดสุขภาพจิต SCL-90 ของผู้ป่วยพหุขามฆ่าตัว  
 ภายจะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานปกติ

**ตารางที่ 10** เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการสุขภาพจิตของผู้ป่วย  
 กับเกณฑ์มาตรฐานปกติ

กลุ่มอาการ สุขภาพจิต	เกณฑ์มาตรฐานปกติ			ผู้ป่วย			t
	N	$\mu$	$\sigma$	n	$\bar{x}$	Sd	
SOM	525	0.64	0.66	66	1.26	0.72	8.97***
O - C	525	1.19	0.59	66	1.52	0.65	4.13***
IS	525	1.04	0.56	66	1.41	0.71	4.25***
D	525	0.93	0.51	66	1.74	0.84	8.10***
A	525	0.85	1.10	66	1.48	0.68	7.50***
H	525	0.77	0.61	66	1.07	0.71	3.45***
PH	525	0.70	0.52	66	1.10	0.73	4.44***
PAR	525	0.99	0.71	66	1.34	0.76	3.89***
PSY	525	0.71	0.55	66	1.03	0.58	4.57***

\*\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

FIGURE 5 Comparing mean scores on the SCL-90 distress scales of all the attempted suicide patients with the norm in Thailand





**ตารางที่ 11** ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการสุขภาพจิตสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานปกติ

กลุ่มอาการสุขภาพจิต	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต	14	21.21
มีปัญหาสุขภาพจิต	52	78.78
- D	42	63.64
- SOM	26	39.40
- PH	23	34.85
- PAR	21	31.82
- O - C	19	28.79
- IS	19	28.79
- H	19	28.79
- Psy	19	28.79
- A	18	27.27
รวม	66	100.00

**หมายเหตุ :** ผู้ป่วยบางราย ได้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มอาการสุขภาพจิตสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานปกติมากกว่า 1 รายการ

**FIGURE 6**

**Percentage of attempted suicide patients scored a higher mean on the SCL-90 distress scales than the norm**



**Note: Some cases scored higher than the norm on more than one mental distress scale**

ตารางที่ 12 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามนิสัยทางประสาทในวัยเด็ก



นิสัยทางประสาทในวัยเด็ก	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีนิสัยทางประสาทในวัยเด็ก	30	45.82
มีนิสัยทางประสาทในวัยเด็ก	36	54.18
- บัสสาวะรดที่นอน	19	28.79
- กัดเล็บ	11	16.67
- กูดนิ้วมือ	8	12.12
- โขกศีรษะ เขย่าหัว	8	12.12
- ตีคิ้วอ้อม ผ้าห่ม	8	12.12
- พุคคืดอ่าง	1	1.52
รวม	66	100.00

หมายเหตุ : ผู้ป่วยบางรายมีนิสัยทางประสาทในวัยเด็ก ได้มากกว่า  
1 รายการ



**FIGURE 7**

**Percentage of attempted suicide patients, classified according to the childhood neurotic traits**



**Note: Some cases showed more than one symptom.**



**ตารางที่ 13** ค่าร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามอาการแสดงก่อนพยายามฆ่าตัวตาย

อาการแสดงก่อนพยายามฆ่าตัวตาย	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีอาการแสดง	3	4.55
มีอาการแสดง	63	95.45
- คิดอยากตาย	47	71.21
- หดหู่ เศร้าหมอง	45	68.18
- หงุดหงิด อุนเฉียวง่าย	45	68.18
- รู้สึกสิ้นหวัง ไร้ค่า	44	66.67
- เปื่อหน่ายสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว	44	66.67
- อ่อนเพลีย	37	56.06
- กังวลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	33	50.00
- รังเวียน ใจสั่น แน่นหน้าอก	29	43.91
- นอนไม่หลับ	27	40.91
- รู้สึกว่าตนเองมีความผิดคิดตัว	26	39.37
- ความนึกคิดและการกระทำเชิงซ้ำ	25	37.88
- เบื่ออาหาร	21	31.82
- ความรู้สึกทางเพศลดลง	20	30.30
- น้ำหนักลด	16	24.24
รวม	66	100.00

**หมายเหตุ :** ผู้ป่วยบางรายมีอาการทางประสาทในวัยเด็ก ได้มากกว่า  
1 รายการ

**FIGURE 8**

**Percentage of attempted suicide patients, classified according to presuicidal syndromes.**



**Note: Some cases showed more than one symptom.**

**ตารางที่ 14** เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการสุขภาพจิตของผู้ป่วย  
เก็บตัวกับเกณฑ์มาตรฐานปกติ

กลุ่มอาการ สุขภาพจิต	เกณฑ์มาตรฐานปกติ			ผู้ป่วยเก็บตัว			t
	N	$\mu$	$\sigma$	n	$\bar{x}$	Sd	
SOM	525	0.64	0.66	25	1.27	0.75	4.20***
O - C	525	1.19	0.59	25	1.44	0.59	2.08*
IS	525	1.04	0.56	25	1.43	0.69	2.83**
D	525	0.93	0.51	25	1.97	0.90	5.78***
A	525	0.85	1.10	25	1.50	0.73	4.45***
H	525	0.77	0.61	25	0.93	0.69	1.16
PH	525	0.70	0.52	25	1.13	0.73	2.95**
PAR	525	0.99	0.71	25	1.19	0.73	1.37
Psy	525	0.71	0.55	25	1.00	0.65	1.92

\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

\*\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

**ตารางที่ 15** เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการสุขภาพจิตของผู้ป่วยแสดงตัวกับเกณฑ์มาตรฐานปกติ

กลุ่มอาการสุขภาพจิต	เกณฑ์มาตรฐานปกติ			ผู้ป่วยเก็บตัว			t
	N	$\mu$	$\sigma$	n	$\bar{x}$	Sd	
SOM	525	0.64	0.66	41	1.21	0.64	5.70***
O - C	525	1.19	0.59	41	1.56	0.68	3.49**
IS	525	1.04	0.56	41	1.40	0.72	3.21**
D	525	0.93	0.51	41	1.60	0.78	5.49***
A	525	0.85	1.10	41	1.47	0.65	6.20***
H	525	0.77	0.61	41	1.15	0.71	3.45**
PH	525	0.70	0.52	41	1.09	0.75	3.33**
PAR	525	0.99	0.71	41	1.43	0.76	3.70***
Psy	525	0.71	0.55	41	1.05	0.54	4.05***

\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

\*\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

**ตารางที่ 16** เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการสุขภาพจิตของผู้ป่วยที่มีอาการแปรปรวนหัวใจโตง่ายกับเกณฑ์มาตรฐานปกติ

กลุ่มอาการสุขภาพจิต	เกณฑ์มาตรฐานปกติ			ผู้ป่วยอาการหัวใจโต			t
	N	$\mu$	$\sigma$	n	$\bar{x}$	Sd	
SOM	525	0.64	0.66	50	1.39	0.72	7.50***
O - C	525	1.17	0.59	50	1.64	0.64	5.00***
IS	525	1.04	0.56	50	1.49	0.71	4.50***
D	525	0.93	0.51	50	1.91	0.85	8.17***
A	525	0.85	1.10	50	1.65	0.63	8.99***
H	525	0.77	0.61	50	1.23	0.69	4.74***
PH	525	0.70	0.52	50	1.08	0.75	3.58***
PAR	525	0.99	0.71	50	1.48	0.76	4.58***
Psy	525	0.71	0.51	50	1.12	0.61	4.77***

\*\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

**ตารางที่ 17** เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการสุขภาพจิตของผู้ป่วยที่มีอารมณ์มั่นคงกับเกณฑ์มาตรฐานปกติ

กลุ่มอาการ สุขภาพจิต	เกณฑ์มาตรฐานปกติ			ผู้ป่วยอารมณ์มั่นคง			t
	N	$\mu$	$\sigma$	n	$\bar{x}$	Sd	
SOM	525	0.64	0.66	16	0.85	0.52	1.62
O - C	525	1.19	0.59	16	1.13	0.54	-0.44
IS	525	1.04	0.56	16	1.17	0.66	0.79
D	525	0.93	0.51	16	1.22	0.53	2.18*
A	525	0.85	1.10	16	0.96	0.56	0.79
H	525	0.77	0.61	16	0.55	0.47	-1.89
PH	525	0.70	0.52	16	1.16	0.69	2.66*
PAR	525	0.99	0.71	16	1.91	0.58	-0.55
Psy	525	0.71	0.51	16	0.76	0.37	0.54

\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

**สมมติฐานข้อที่ 3 :** ค่าเฉลี่ยในแบบวัดสุขภาพจิต SCL-90 ของผู้ป่วยฆ่าตัวตายที่มีบุคลิกแบบอารมณ์แปรปรวนหัวรั้นโหว่ง่าย จะสูงกว่าผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายที่มีบุคลิกภาพแบบอารมณ์มั่นคง

**ตารางที่ 18** เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการสุขภาพจิตของผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวนหัวรั้นโหว่ง่ายกับผู้ป่วยอารมณ์มั่นคง


กลุ่มอาการสุขภาพจิต	ผู้ป่วยอารมณ์หัวรั้น โหว่ง่าย			ผู้ป่วยอารมณ์มั่นคง			t
	n	$\bar{x}$	Sd	n	$\bar{x}$	Sd	
SOM	50	1.39	0.72	16	0.85	0.52	3.28***
O - C	50	1.64	0.64	16	1.13	0.54	3.00**
IS	50	1.49	0.71	16	1.17	0.66	1.68
D	50	1.91	0.85	16	1.22	0.53	3.83***
A	50	1.65	0.63	16	0.69	0.56	4.31***
H	50	1.23	0.69	16	0.55	0.47	4.53***
PH	50	1.08	0.75	16	1.16	0.69	-0.40
PAR	50	0.48	0.76	16	0.91	0.58	3.24**
Psy	50	1.12	0.61	16	0.76	0.37	3.00**

\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

\*\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001



Figure 9 Comparing mean scores on the SCL-90 distress scales of attempted suicide patients between neurotic personality and stable personality




**สมมติฐานข้อ 4 :** ค่าเฉลี่ยในแบบวัดสุขภาพจิต SCL-90 ของผู้ป่วยพยายามฆ่าตัว  
 คายที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวจะสูงกว่าผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวคายที่มี  
 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว

**ตารางที่ 19** เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกลุ่มอาการสุขภาพจิตของผู้ป่วย  
 เก็บตัวกับผู้ป่วยแสดงตัว

กลุ่มอาการ สุขภาพจิต	ผู้ป่วยเก็บตัว			ผู้ป่วยแสดงตัว			t
	n	$\bar{x}$	Sd	n	$\bar{x}$	Sd	
SOM	25	1.27	0.75	41	1.21	0.64	0.35
O - C	25	1.44	0.59	41	1.56	0.68	-0.75
IS	25	1.43	0.69	41	1.40	0.72	0.17
D	25	1.97	0.90	41	1.60	0.78	1.76
A	25	1.50	0.73	41	1.47	0.65	0.18
H	25	0.93	0.69	41	1.15	0.71	-1.22
PH	25	1.13	0.73	41	1.09	0.75	0.22
PAR	25	1.19	0.73	41	1.43	0.76	-1.33
Psy	25	1.00	0.65	41	1.05	0.54	-0.31

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Figure 10 Comparing mean scores on the SCL-90 distress scales of attempted suicide patients between extrovert personality and introvert personality



**สมมติฐานที่ 5 :** คะแนนในแบบวัดบุคลิกภาพ MPI กับคะแนนในแบบวัดสุขภาพจิต SCL-90 ในผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย จะมีความสัมพันธ์กันในทางบวก

**ตารางที่ 20** สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนในแบบวัดบุคลิกภาพ MPI (มิติความแปรปรวนทางอารมณ์) กับคะแนนในแบบวัดสุขภาพจิต SCL-90

SCL-90				Neuroticism scale			r
กลุ่มอาการสุขภาพจิต	n	$\bar{x}$	Sd	n	$\bar{x}$	Sd	
SOM	66	1.26	0.72	66	32.29	8.86	0.36**
O - C	66	1.52	0.65	66	32.29	8.86	0.54****
IS	66	1.42	0.71	66	32.29	8.86	0.51****
D	66	1.74	0.84	66	32.29	8.86	0.77****
A	66	1.48	0.64	66	32.29	8.86	0.53****
H	66	1.07	0.71	66	32.29	8.86	0.59****
PH	66	1.10	0.73	66	32.29	8.86	0.26*
PAR	66	1.34	0.76	66	32.29	8.86	0.56****
Psy	66	1.03	0.58	66	32.29	8.86	0.44****

\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

\*\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

**ตารางที่ 21** สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนในแบบวัดบุคลิกภาพ MPI (มิติสังคม) กับคะแนนในแบบวัดสุขภาพจิต SCL-90

SCL - 90				Extraversion scale			r
กลุ่มอาการสุขภาพจิต	n	$\bar{x}$	Sd	n	$\bar{x}$	Sd	
SOM	66	1.26	0.72	66	27.45	7.05	0.10
O - C	66	1.52	0.65	66	27.45	7.05	0.09
IS	66	1.42	0.71	66	27.45	7.05	0.32**
D	66	1.74	0.84	66	27.45	7.05	-0.26*
A	66	1.48	0.64	66	27.45	7.05	-0.11
H	66	1.07	0.71	66	27.45	7.05	-0.07
PH	66	1.10	0.73	66	27.45	7.05	-0.30*
PAR	66	1.34	0.76	66	27.45	7.05	1.10
Psy	66	1.03	0.58	66	27.45	7.05	0.14

\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01