การวิจัยเรื่อง : การแสวงหาข้อมูลและความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ

รังสีรักษา

คณะผู้วิจัย : อังศุมา วิทยวีรศักดิ์

แสงอรูณ สุขเกษม

หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

**1** : 2534 - 2535

## บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความแตกต่างของการแสวงหาข้อมูล และความแตกต่างของความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคมะเร็งขนระหว่างสัปดาห์แรกกับสับดาห์ที่สี่ของ
การได้รับรังสีรักษา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบรทั้งสองขนช่วงสับดาห์แรกและ
สับตาห์ที่สี่ของการรักษา โดยใช้กรอบทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม นอกจากนี้ศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในเรื่องแหล่งข้อมูลของผู้ป่วย และแรงจูงใจในการแสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจานวน 60 ราย ทาการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง คือ
ในสับดาห์แรกและสับตาห์ที่สี่ของการรับรังสีรักษา ใช้แบบสอบถามการแสวงหาข้อมูลของ
ฮอปกั้นส์ หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาได้ 0.83 และแบบวัดความวิตกกังวลขณะเผชิญของ
สไปส์เบอร์เจอร์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.74 ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้คาถาม
ปลายเบิด

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลในสัปดาห์แรกสูงกว่าในสัปดาห์ที่สี่ ของการรับรังสีรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=6.37, p<.001) แต่ไม่พบความ- แตกต่างของการแสวงหาข้อมูลในสองระยะนี้ ในด้านความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า การแสวงหาข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทั้งในสัปดาห์ แรกและสัปดาห์ที่สี่ของการรักษา นอกจากนี้ยังพบว่า การแสวงหาข้อมูลมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับระดับการศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.35,p<.005) ความวิตกกังวล

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาการเงินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( r=.25, p<.05)
การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า แหล่งข้อมูลของผู้ป่วยส่วนใหญ่ คือ แพทย์ รองลงมาคือ
นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อน หรือผู้ป่วยด้วยกัน โดยมีแรงจูงใจจากความเชื่อมั่นว่า แพทย์
เป็นผู้มีความรู้ที่ถูกต้อง และนำเชื่อถือมากที่สุด ส่วนนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ให้กำลังใจ
สำหรับเพื่อนเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้ป่วยจะเลือกเมื่อเห็นว่า เพื่อนผู้นั้นเคยมีประสบการณ์การ
เจ็บป่วยและมีอาการดีขึ้นแล้ว

Research: Information Seeking and Anxiety in Cancer

Patients Receiving Radiation Therapy.

Author : Angsuma Vitayaveerasak

: Sang-arun Sukkasame

epartment : Faculty of Nursing, Prince of Songkla University

Year : 1991-1992

## Abstract

The purposes of this research were to study the differences in information seeking and in anxiety between the first week and the fourth week of radiation therapy as well as to identify whether there were relationships in these variables. Orem's self care theory was used as a frame-work for this study. The resources of information and the motivation to use these resources were qualitative exploration.

The porposive sample were 60 adults suffering from cancer and receiving radiation therapy in Prince of Songkla University Hospital. Data were corrected twice. in and the fourth week of radiation therapy. Information seeking was measured by "Information Preference Questionnaire" developed by Hopkins (Cronbach coefficient alpha = 0.83). The State-Trait Anxiety Inventory form X-1 developed by Spielberger, et al. was used to assess patients'anxiety (Cronbach coefficient alpha = 0.74). Qualitative data was assessed through interview using open ended questionnaire.

of the study indicated that there results significant higher level of anxiety in the first week fourth week of radiation therapy. (t = 6.37, thanin No sinificant difference of information seeking between the first week and the fourth week of radiation The correlation of these variables showed that therapy. significant correlation between information there was no seeking and anxiety either in the first week or in the fourth week of radiation therapy. A significant correlation between economic problem and anxiety was found(r=.35,p<.005). And level of education was sinificantly correlated with information seeking (r=.25,p<.05). Qualitative data revealed that doctors were the most popular resources because they were trusted to give accurat and reliable information. the social worker acted as a psychosupporter, whereas friends, especially those who had experienced cancer and succeeded in radiation therapy, were chosen as information resources.