

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดธรรกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในโรงพยาบาล

The Relationship between Selected Factors and Depression of Hospitalized Elderly

ชัดเจน จันทรพัฒน์ Chantjane Jantarapat

man Millim Walt	: b 15 by	2543 91
Order Key. 28	351	······································
Bib Key 177	677	

วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing
Prince of Songkla University

2543

ชื่อวิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับภาวะซึมเสร้าของผู้สูงอายุ

ในโรงพยาบาล

ผู้เขียน

นางสาวชัคเจน จันทรพัฒน์

สาขาวิชา

การพยาบาลผู้ใหญ่

ปีการศึกษา

2542

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับภาวะซึมเศร้า ของผู้สูงอายุในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลา จำนวน 120 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบ ประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน แบบวัดภาวะซึมเศร้า แบบวัดสัมพันธภาพใน ครอบครัว แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมินการรับรู้ความรุนแรงของความเจ็บป่วย

ผลการวิจัยพบว่า

- ร้อยละ 61.7 ของกลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเสร้า โดยที่ร้อยละ 37.5 อยู่ในระดับเล็กน้อย ร้อยละ 21.7 อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 2.5 อยู่ในระดับรุนแรง
- 2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุดูณแบบขั้นตอน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ได้แก่ ระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล การมีสัมพันธภาพกับครอบครัว การรับรู้ความรุนแรงของความเจ็บป่วย และความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ตัวแปรดังกล่าว สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลได้ร้อยละ 36 ความ สามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน สามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะซึมเศร้าได้ร้อยละ 21 ใน ขณะที่การรับรู้ตวามรุนแรงของความเจ็บป่วย การมีสัมพันธภาพกับครอบครัว และระยะเวลาที่อยู่ใน โรงพยาบาล อธิบายความแปรปรวนของภาวะซึมเศร้าได้ร้อยละ 6.3, 6 และ 3 ตามลำดับ



Thesis Title The Relationship between Selected Factors and Depression of

Hospitalized Elderly

Author Miss Chantjane Jantarapat

Major Program Adult Nursing

Academic Year 1999

Abstract

This study aimed to explore the relationship between selected factors and depression among hospitalized elders. One hundred and twenty subjects were purposively selected from the elders admitted at Songkhla Provincial Hospital. Questionnaires were used to obtain subjects' personal and hospitalization data, activity of daily life (ADL), relationship with family, and perception of illness severity.

The results were:

 Sixty one point seven percent of the subjects were depressed, 37.5 percent were mild, 21.7 percent moderate and 2.5 percent severe.

2. In the stepwise multiple regression model, ADL, relationship with family, perception of illness severity and number of days being hospitalized were associated with depression at the significance level of .05. These four variables together explained 36 percent of the variance of depression score. ADL explained 21 percent whereas relationship with family, perception of illness severity and number of days being hospitalized explained 6.3, 6 and 3 percent respectively. The higher the scores of ADL and relationship with family, the lower the depression score. On the other hand, the more severe the subjects perceived their illness and more days the subjects being hospitalized, the higher the depression score.

The results suggested a high risk group of depression and that nurses should promote as well as support ADL and relationship with family but minimize the number of days in hospitals.