

รูปภาคผนวกที่ 1 ลักษณะอาการขาดแคลเซียมในข้าวโพดอายุ 10 วัน ใบยอดไม่คลี่และมีเมือกเหนียว ขอบใบไหม้



รูปภาคผนวกที่ 2 สภาพทั่วไป และลักษณะการวางตำรับการทดลองต่างๆ



รูปภาคผนวกที่ 3 ข้าวโพดหวานเมื่ออายุ 40 วัน ในตำรับทดลองควบคุม, ใส่ปุ๋ยขาวอย่างเดียว, ใส่ปุ๋ยขาวร่วมกับฟอสฟอริปซัมอัตรา 0.25, 0.5, 0.75 และ 1 เท่า ของแคลเซียมจากปุ๋ยขาว (ดูจากซ้ายไปขวา)



รูปภาคผนวกที่ 4 ข้าวโพดหวานเมื่ออายุ 40 วัน ในตำรับทดลองควบคุม, ใส่ปุ๋ยโดโลไมต์อย่างเดียว, ใส่ปุ๋ยโดโลไมต์ร่วมกับฟอสฟอริปซัมอัตรา 0.25, 0.5, 0.75 และ 1 เท่า ของแคลเซียมจากปุ๋ยโดโลไมต์ (ดูจากซ้ายไปขวา)



รูปภาคผนวกที่ 5 ข้าวโพดหวานเมื่ออายุ 40 วัน ในตำรับทดลองควบคุม, ใส่ปุ๋ยขาวอย่างเดียว, ใส่ปุ๋ยขาวร่วมกับคีเซอไรต์อัตรา 0.25, 0.5, 0.75 และ 1 เท่าของกัมมะถันที่ข้าวโพดต้องการ (ดูจากซ้ายไปขวา)



รูปภาคผนวกที่ 6 ข้าวโพดหวานเมื่ออายุ 40 วัน ในตำรับทดลองควบคุม, ใส่ปุ๋ยโดโลไมต์อย่างเดียว, ใส่ปุ๋ยโดโลไมต์ร่วมกับคีเซอไรต์อัตรา 0.25, 0.5, 0.75 และ 1 เท่าของกัมมะถันที่ข้าวโพดต้องการ (ดูจากซ้ายไปขวา)