

สารบัญ

	หน้า
บทสรุป (Executive summary)	1
บทคัดย่อ	3
Abstract	4
ความเป็นมา	5
วัตถุประสงค์	6
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
ระเบียบวิธีวิจัย	9
ผลการศึกษา	12
อภิปรายผลการศึกษา	19
สรุป	23
เอกสารอ้างอิง	24
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก คำชี้แจงวิธีการเก็บข้อมูล	27
ภาคผนวก ข ใบเก็บข้อมูลในโครงการวิจัยฯ	31
ภาคผนวก ค บทความสำหรับการเผยแพร่	35

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 อุบัติการณ์การให้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคอุจจาระร่วง ในเด็กจากประเทศต่างๆ	7
ตารางที่ 2 จำนวน patient visits จากโรงพยาบาล 10 แห่ง	12
ตารางที่ 3 การกระจายของอายุผู้ป่วย (2,878 patient visits)	12
ตารางที่ 4 ลักษณะทางคลินิกของอุจจาระร่วงฉับพลัน	13
ตารางที่ 5 ประเภทบุคลากรสาธารณสุขที่รักษาผู้ป่วย (patient visits)	15
ตารางที่ 6 การรักษาผู้ป่วยอุจจาระร่วงฉับพลัน (2,882 patient visits)	15
ตารางที่ 7 ชนิดยาปฏิชีวนะที่รักษาผู้ป่วย (1,771 patient visits)	15
ตารางที่ 8 การจ่ายยาปฏิชีวนะจำแนกตามประเภทบุคลากร	16
ตารางที่ 9 ความเหมาะสมในการให้ยาปฏิชีวนะในลักษณะ empirical รักษาผู้ป่วย 2,882 patient visits	16
ตารางที่ 10 ความเหมาะสมในการให้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลจังหวัด เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลชุมชน	17
ตารางที่ 11 ความเหมาะสมในการให้ยาปฏิชีวนะจำแนกตามประเภทบุคลากร ผู้รักษาผู้ป่วย	17
ตารางที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางคลินิกของอุจจาระร่วงและ การจ่ายยาปฏิชีวนะของผู้รักษา	18