

255 10 วิเคราะห์กิจกรรมป้องกันโรคเอดส์ในครอบครัวและชุมชน

ของกลุ่มแม่บ้านที่มาฝากครรภ์ ณ. โรงพยาบาลหาดใหญ่ /c 100

The analysis on housewives' Activities about Aids Prevention in Family and Community : A case study of housewives who attended Antenatal Clinic at Hat Yai hospital.

100 % / ศรึนวล ไอสถเสถียร

keywords: housewife women, family, community , Aids prevention, antenatal clinic , Hat Yai

บทคัดย่อ

แม้ว่าการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ได้มีการดำเนินการมากกว่า 10 ปีก็ตาม แต่เอดส์ก็ยังมี การระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้นการศึกษาจึงได้ ทำการสำรวจกิจกรรมป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มแม่บ้านในครอบครัวและชุมชนของกลุ่มแม่บ้านที่มา ฝากครรภ์ ณ. โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ จำนวน 210 ราย การศึกษาการใช้การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal indept interview) ด้วยแบบสอบถามถึง โครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยประเด็นที่ศึกษา คือ การรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และกิจกรรม ป้องกันโรคเอดส์ในครอบครัวและชุมชน ตลอดจนกิจกรรมแสดงความตั้งใจรณรงค์ป้องกันโรค เอดส์ การวิเคราะห์ได้ทำตั้งแต่ระหว่างเริ่มรวบรวมข้อมูล แล้วจึงทำการบันทึก จัดทำตรรกะนี้ ข้อมูล และสรุปเนื้อหาแสดงความถึนำเสนอ ได้ผลของการศึกษาดังนี้

แม่บ้านร้อยละ 96.19 ระบุเคยรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยการรับรู้จากโทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ 92.38) รองลงมาคือการบอกเล่าจากเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 30.48) ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์น้อยที่สุด การรับรู้เกี่ยวกับการติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด (ร้อยละ 76.19) การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ร้อยละ 32.38 การรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการเป็นเอดส์ คือ การตายและการรักษาไม่หาย ร้อยละ 39 และ 19.05 ตามลำดับ และที่สำคัญอย่างอื่น คือ บอกว่าไม่ทราบร้อยละ 41.95 สำหรับการรับรู้วิธีป้องกันเอดส์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย มีเพียงร้อยละ 39.52 ส่วนการเตือนและห้ามสามีมีส่วนทางเพศกับบุคคลอื่นร้อยละ 27.2 และตอบวิธีป้องกันเอดส์ไม่ได้ ร้อยละ 36.71

สำหรับกิจกรรมป้องกันโรคเอดส์ในครอบครัว แม่บ้านร้อยละ 54.48 เคยอภิปรายโรคเอดส์กับสามี โดยการพูดถึงการติดต่อร้อยละ 25.71 เดือนสามีให้เลิกการสำส่อนทางเพศร้อยละ 49.52 ส่วนการแนะนำสามีให้ใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีการสำส่อนนอกบ้านร้อยละ 5.42 จำนวนครั้งของการเตือนร้อยละ 33.81 ระบุหลายครั้ง การเตือน 1-3 ครั้งร้อยละ 21.9 ส่วนแม่บ้านอีกร้อยละ 45.52 เชื่อว่าสามีไม่สำส่อน มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ดี จึงไม่มีความจำเป็นต้องเตือน

กิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน แม่บ้านระบุมีโอกาสสนทนาเกี่ยวกับโรคเอดส์ในชุมชนน้อยมาก การพูดมีเฉพาะในวงญาติและเพื่อนสนิทร้อยละ 31.43 ประเด็นที่สนทนา คือ การติดเชื้อเอดส์และผลกระทบของการเป็นโรคเอดส์ โดยระบุพูดหลายครั้งร้อยละ 9.52 1-2 ครั้งร้อยละ 11.41 สำหรับการเตือนญาติหรือเพื่อนบ้านให้ระวังโรคเอดส์ มีเพียงร้อยละ 28.09 เดือนโอกาสติดเชื่อเมื่อสำส่อนมากที่สุด ร้อยละ 18.54 โดยมีการเตือนหลายครั้งร้อยละ 10.95 เดือน 1-2 ครั้ง ร้อยละ 11.43 สำหรับในรายที่ระบุไม่เคยอภิปรายร่วมกับผู้ใดร้อยละ 68.57 ระบุไม่ได้ให้ความสนใจ "เพราะคิดว่าตัวใคร ตัวมันมากที่สุดร้อยละ 25.24 และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ระบุว่าไม่เตือนร้อยละ 71.9 โดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ควรไปเกี่ยวข้อง

การชักชวนคนในชุมชนให้ระวังโรคเอดส์มีเพียงร้อยละ 11.90 ส่วนมาก (ร้อยละ 88.10) บอกว่าไม่ทำ โดยไม่ยอมให้เหตุผล ที่ยอมให้เหตุผลระบุว่าตัวใครตัวมัน น่าอาลัยที่จะสนทนาถึงโรคนี้ สำหรับความตั้งใจตรงการป้องกันเอดส์ในชุมชน แม่บ้านส่วนมากไม่เห็นด้วย และระบุว่าตัวใครตัวมัน

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า แม้การรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในแม่บ้านดีก็ตามแต่ แต่กิจกรรมการป้องกันเอดส์ในครอบครัวยังต่ำมาก และแทบจะไม่มีกิจกรรมป้องกันเอดส์ในชุมชน

Abstract

Although The campaign of Aids prevention had done more than 10 year. The severity of Aids spread still high. This study was carried out to explore housewives' perception about aids and activities on Aids prevention. The study was focus on housewives' perceptions and activities on Aids prevention in family and community . Semi structural questionnaires by informal indept interview was carried on 210 housewives, whom attended antenatal clinic at Hat Yai hospital. The data were analyzed by content analysis . The results of this study showed as following :

92.38 percent of housewives had known Aids from television and 30.49 percent from friends. They percieved transmitted through extrasexual contact 76.19 percent, and intravenous needle sharing 32.38 percent. The chief concern about Aids caused death (39 percent) and uncurable (19.05 percent). The ways of Aids prevention were using condom, extrasexual discontacted and using clean needle 39.52 , 27.6 and 5.71 percent . Whereas 36.72 percent reported " They didn't know any".

The activities on Aids prevention in family by discussing and warning the danger about Aids were 54.48 percent and 49.52 percent respectively. Discussing about route of transmission was the most comment (25.71 percent), in addition to inhibit extrasexual contact 49.52 percent and use of condoms during sexaul activities 5.42 percent were also mentioned . Time of talking Aids vary from one to many. Whereas 45.52 percent presented " they prefer to do nothing ".

The activities on Aids prevention in community were low. Discussing and warning the danger on Aids were carried on relatives and closed friends 31.43 and 28.09 percent. The activities were discussing route of transmission, inhibit extrasexual contract , and use of condoms were 18.57, 3.81 percent respectively . Whereas 68.57

percent of housewives did nothing . They mentioned "ones should take care by themselves"

The activities of Aids prevention in community were least. 88.10 percent of housewives did nothing , inspite of they shame to mention it.